



ب

ل

م.ك.م.ش.  
اسکن شد  
تاریخ: ۲۶/۱/۱۳۸۵





م.ك.م.ش.ا  
اسکن شد  
تاریخ: ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۲۶

ف



# لَدْبِيرُ الْأَطْفَالِ

في الصحة والمرض

وهو كتاب يشتمل على اسهل الطرق واحدتها لتدبير الاطفال والاحاديث  
في الصحة ومداواتهم في المرض  
ومن بين بيستة وخمسين رسماً منها ١١ رسماً على صفحة كاملة

معهد

للدكتور

اسكندر جريديني بك

مساعد استاذ الفسيولوجى سابقًا في كلية ماريون سيمز الطبية في سانت لويس اميركا

The

Management of Infancy and Childhood  
in health and in disease

BY

Dr. ALEXANDRE JUREIDINI BEY

Ex-Assistant to the Chair of physiology Marion Sims

College of Medicine St. Louis, Mo. U. S. A.

Ex-Sanitary Inspector of Elbe District Egypt

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

مطبعة الخان بالبغدادية مصر

# مقدمة

الإمام

أراك أيتها السيدة جائحة لدى سرير صغيرك وقد أدمي جفونه البكاء وعيناك تحدجنه بنظراتٍ قد تجسم فيها القلق وقلبك يرفف فوقه كأنه ملاً كه الحارس فلا قلّ يدك هز ذاك السرير ولا يستطيع الكري انحصار جفونك عن ذلك الوجه الجميل . تلك هي لولوة الحب التي أوجدها الله في قلب الام فلا تقدر صفاءها المصائب وان كثرت ولا يحيط من قدرها الفقر وان اشتدا بلاءه . ولست اخالك تجهلين ان هذا الطفل الصغير هو كالزهرة النضرة تنشها نسمة صباح وتذبلها لفحة سرور . بل هو كاساعة الدقيقة يوقف حركتها أصغر ذرات الهواء فلا ألمك اذا رأيتها جزعة عليه خرقاً من ان خطرات النسيم تخرج خديه وليس الحرير يدمي بناته . فاذا فام ذاب قلبك شوقاً اليه واذا بك سالت نفسك لوعة عليه واذا شعب لونه سامرك المهم لظنك انه يتآلم وفي كل هذه الحالات لا أراك الا بين القلق والهواجرس لا يهدأ لك بال ولا يطيب لك قلب . ويزيد الطين بلة انه قاصر عن شكوى آلامه عاجزاً عن الاصلاح عمّا به فلا تستطعين الى تحنيف اوجاعه سبيلاً لأنك تخافين ان انت تداركه بما تعرفينه من الوسائل ان تكوني مخطئة فسيئي اليه من حيث تريدين الاحسان وان أحبت عن ذلك خمنت ان تفوتك الفرصة فتندمين حيث لا ينفع التندم . واني لم تيقن ان ما يقبلك من الحنو لا يدرك الا قلبك الرقيق وما بنفسك من الجزع لا تدركه الا نفسك الظاهرة وان ما تفاسيه من العذاب هو اضعف ما يفاسيه ذلك الطفل الصغير فلا بدع اذا استرخصت في حبه الغالي وبذلت لاجل

راحته كل نفس . على اني وان كنت لم أوث حنوك أيتها الام فقد تكنت بعد طول المزاولة من درس عواطفك الرقيقة وعرفت ما تعانيه في سبيل تربية طفال من مرارة العذاب وسهر الليلي وذلك لاشتغالى سنين كثيرة بفن معالجة الاطفال في أشهر مستشفيات الولايات المتحدة الاميركانية فضلاً عن ممارستي اياه على الخصوص في هذه البلاد حتى وفقت الى اخبارات جامعة لأشتات الفوائد وافية بالغرض المقصود . وقد اضفت اليها آراء كثيرة من نطس الاطباء الذين وقفوا أنفسهم على ممارسة طب الاطفال كالدكتور جريفيث Griffith وروتش وجاكوبى وغيرهم حتى اصبح الكتاب يغنيك عن استشارة الطبيب في كثير من الحوادث لا بل يساعدك على وقاية صحة طفالك مما يمكن ان يطرأ عليه من العلل بسبب الاهال او عدم معرفتك واجبات التربية الصحيحة

وقد أثبتت كل ما أمكنني الوصول اليه سوا كان بطريق الاخبار ام بواسطة الاسترشاد في هذا الكتاب الذي ترينه امامك الآن مربعاً على اسهل الطرق ومزينا بالرسوم الضرورية ووضعته بين يديك ايتها السيدة لعلى اثاب على هذه الخدمة بحسن رضاك عنه وقدرتك تبني في كتابه حق قدره اذ لا يرف الصباية الا من يمانها . واني اشير عليك ان تتصفحه بالاهتمام الذي يستحقه لستوعبي ما اودع من الحقائق وان تسترشدي به حين الحاجة فانه خير مرشد هذه ثمرة ممارستي لصناعة طب الاطفال استهل بها خدمتي في القطرين المصري وال Sovorى املأ ان يحسن القراء الظن بها وان ينفع الوالدون منها وحسي جزاً لخدمتي وانتمي . ان يرضى القوم عني ويقبلوا على كتابي

الدكتور

القاهرة في ٥ اغسطس (آب) سنة ١٩٠٣ اسكندر الجريدي

# القسم الأول

في الصحة

مختصر

## الفصل الأول

قبل الولادة

تدبير صحة الحوامل — امراض الحمل — علامات الخاض

تدبير صحة الحوامل

ثبت الاختبار ان الامراض تتسلط على الحوامل لاسباب ليس لها تأثير عليهم في غير وقت الحمل . ومن المعلوم ان المرض ينتقل من الحامل الى الجنين فكل ما يضر بها يضر به لانه يتغذى بدمها ولذلك كانت الاعتناء بصحة الحوامل امراً واجباً للحصول على نسل صحيح الجسم . والطفل رجل المستقبل فاذا صحي جسمه صحي عقله وكان وجوده نافعاً للبلاد ومفيداً للعمران والمكبس . فان لم تدرك الحامل عنها عاديات الامراض بالوسائل الصحية امداً الضفف منها الى طفليها فسانت صحته وسقم عقله وقصر عن الاعمال التي يتطلبها الارتفاع من الرجال فكان عيالاً على اهل وعيالاً ثقيلاً على كاهل الانسانية

واذا كان الاعتناء بالطفل يتدنى من قبل ولادته أي من ساعة تكوينه في بعض امه وجب على الحامل ان تعرف علامات الحمل نذكر منها ما يأتي :  
اولاً اقطاع الحيض (العادة) وقد لا يعتمد على هذه العلامة لأن الدم ينقطع في اوائل الزبحة امداً طويلاً قبل الملقنة . وقد يأتي دفقات صغيرة تلازم الحامل

مدة الحمل بطولها . وكيف ما كانت الحال فان اقطاع الدم من اظهر الادلة على  
وقوع الحمل  
ثانياً كبر البطن وهو من العلامات الثابتة ومع ذلك فلا يجزم بصحتها قبل  
الشهر الرابع

ثالثاً كبر الثديين يتدنى من الاسبوع الخامس وفي غضون ذلك تفرز الخلية  
سائلة مائية وتحيط بها هالة سمراء اللون تزداد ووضوحاً في الشهر الثاني من الحمل  
رابعاً الشفان وهو ميل دائم للقيء يحدث في الصباح من الشهر الثاني الى  
الثالث وكثيراً ما يرافقه في طول النهار . وفي الحوادث القوية يتواتر اليه فلازم  
الحامل الى نهاية الحمل وهو منها لقوى ومضعف للجسم لعدم اقدار المعدة على  
امساك الطعام وهضمها


خامساً حركة الجنين وهو ارتعاش يشعر به منذ الاسبوع الثامن عشر وزعم  
بعض انه بهذه ظهور الحياة الجنينية مع ان الثابت اليوم ان الحياة تتدنى في  
الاجنة منذ تكوينها واما الحركة فضمنة في الجنين قبل هذا العهد وتزداد بزيادة  
نحوه حتى ولادته

سادساً الوجه وهو اشتهاء انواع مخصوصة من الاطعمة . والظن في ان انتشار  
الحامل عن الطعام الذي تشتهي نفسها يؤثر على جينيتها اعتقاد باطل اثبت العلم  
فساده ولم يبق له اثر سوى في اوهام العجائز والجاهلات

اما يوم الولادة فلم تزل آراء الاطباء مختلفة في تعينه فالبعض يحسبون ٢٧٢  
اليوم ٢٧٥ من تاريخ العقدة . وبما ان هذا الحساب لا يصح في غالب الاوقات  
فيجعلون مدة الحمل كلها عشرة اشهر حيسية أي كل شهر ثمانية وعشرين يوماً  
فككون المجموع ٢٨٠ يوماً مبتدأ من اليوم الاول من آخر حيض والبعض الآخر  
يرجعون الى الوراء ثلاثة اشهر من اليوم الاول من آخر حيض ثم يضيفون ٧ أيام  
هكذا : لفرض ان آخر حيض وقع في الثالث من شهر شباط (فبراير) فاذار وجمانا  
ثلاثة اشهر نصل الى اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ويضافه ٧ ايام

يكون العاشر من الشهر المذكور وهو يوم الولادة  
وعلى كل حال لا تخلو هذه القاعدة من الشذوذ وقد يأتي المخاض قبل ذلك  
او بعده . وقد يحسبون خمسة اشهر من بدء الحركة الجنينية في البوادر (ذوات  
الحمل الاول) و نصف لغيرها وهذه القاعدة شاذة ايضاً

الباس - يجب ان تكون الثياب دافئة لوقاية الحامل من تغيرات التفاس ولا  
تكون ضيقة فتضيق على الصدر وتعرق الدورة الدموية ونمط البطن . وينبغي ان



(ش ١) حزام للبطن


تمنع الحامل عن لبس المشد لان الضغط على  
الاضلاع بولد امراضاً رئوية وكاوية والحوالم في  
خطر شديد منها بسبب ما يطرأ على صحتهن من  
التغير لاستعداد ابدانهن لقبول الامراض في  
وقت الحمل وقد يعيق البطن كبيراً متعددآ بعد  
الولادة ولا سيما في النساء اللواتي يتراقب عليهن الحمل فيشد عندئذ حزام  
(شكل ١) لحفظ شكله ومنع تمدده

الطعام - لا يحسن بالحامل ان تغير جنس الاطعمة التي تعودتها قبل زمان  
الحمل . وينبغي ان تتحمل طعام المساء خصيناً كالبن والمilk فيسهل عليها النوم .  
ويجتنب الاشربة الروحية والتواابل وغير ذلك من المأكولات الثقيلة على المعدة . واذا  
كانت تشتهي ببعضها فلابعنع عنها ولكن لا يسمح لها ان تأكل كثيراً

الاستحمام - النظافة ضرورية في الحمل وخاصة لاعضاء التناسل منعاً لما  
تسببه الوسخة من الاستعداد لقبول الامراض . وتمنع الحمامات الحارة والباردة والساخنة  
في البحر . وما ينفع جداً في هذه الحال الاستحمام بالماء الفاتر في غرفة دفقة مسحأ  
بالاستعنة وهو خير من الانفاس او الرش وعلى كل حال ينبغي ان تراعي الحامل  
أحكام العادة فتتبع من طرق الاستحمام ما يلائمها ويوافق حالها وراحتها  
الرياضة - تقوم الرياضة بركرب العربات في ارض سهلة وسرعة خفيفة وبالمشي  
مسافات قصيرة في الهواء المطلق خارج الابواب وليس في البيت ويجب اجتناب

الرياضات المنفعة كالرقص وركوب الدراجة وحمل الاقفال . والاقامة زمناً طويلاً في الاماكن التي يفسد هواها من ازدحام الناس فيها كالمخالف العامة والتيازات الغر . ولا يجوز ان تقطع الحامل عن اشغال البيت لأن الحركة مفيدة لها جداً فضلاً عن ان البطالة تعلم الكسل ف تكون سبباً في انحطاط قوتها وتثثير آلامها في وقت الولادة بخلاف اللواتي يروضن ابدانهن " فلا يقاسين من الاوجاع ما يقاسيه غيرهن" من تعودن التوانى والكسل

وينبئ ان تحاط الحامل بما يسر الخاطر ويبعج العين من المظاهر الطبيعية في بيتها وخارجها . وتبتعد عن الاسباب التي توجب الانفعالات النفسانية كالغضب والحزن والقصص التي ترك أثراً سيئاً في النفس . ولا يسمح لها بروءة الموى ولا المرضى المصابين بامراض سيئة كالجلدري مثلاً فان هذه جميعها كثيراً ما تسبب الاسقاط والتزف وغير ذلك من العوارض السيئة المعاقبة على الحامل وجنبها وقد يستولي الخوف على اكثر الحوامل ولا سبأ البواكر فيتوهن انهن لا ينجون من الولادة فينبئ صرف هذه الاوهام عنهن" بالرياضات العقلية والجسدية ولا يحسن ان يمر بها يوم بدون ان تصرف منه ساعة بل ساعات بما يسرها ويحوّل افكارها عن الاوهام التي تطأ عليها في الحمل فتخدمها الراحة وحظ الحياة حلة الثدي — يجب ان يحفظ الثدي دافتاً فلا يضغط عليه بالشد او اثبات الصيقه لأن الضغط يمنع نموه وبروز الحلة ويزعزع هذه الاخرية للشقق والتقرح وبذلك يحرم الرضيع لذة غذائه الطبيعي فضلاً عما تعانيه الام من الاوجاع في الرضاع . فاذا كانت الحلة غائرة فيجوز رفعها كل يوم بين السباحة والابهام أو بالآلة ماصة ( شكل ٢ ) وذلك في الشهر الاخير من الحمل وقبل هذا الوقت يخلى على الحامل من الاسقاط . وعما ينفع أيضاً



( ش ٢ ماصة الثدي )

استعمال كلسرين حامض النيك ملحق ( ٧٣ ) تدهن به الحلة مرتين في النهار بقطعة قطن لاجل تقييتها ومنع تشدقها في مدة الرضاع وبعض الاطباء يفضلون

فر كما بالغازلين أو الزيدة وغير ذلك من المواد الملينة وكل العلاجات غاية في الفائدة اما كيفية توليد الذكر والانثى فهي مسألة قد خاض الاطباء عباب البحث فيها وذهبوا مذاهب عديدة وجلة ما نعلمه ان العلم لم يكشف لنا حتى الان عن عوامض هذه السر العظيم وهي في ذلك رأى ابديه في غير هذا الكتاب . ان شاء الله

### أمراض الحمل

القبض ( الامساك ) عرض كثير الحدوث في ايام الحمل وعلاجه الاكلار من اكل الاتهار كالتين والبرقال والتناوح مطبوعاً بالسكر . وان لم يكف ذلك تستعمل الحنة او الادوية الملينة مثل مسحوق سدلزز والمياه المعدنية بجرعات صغيرة قبل فطور الصباح

المثانة ( البولة ) تشعر الحامل بالم في المثانة من ضغط الرحم عليها فتحتفف بالاستقاء على الظهر ويجب ان تتبه الى تغيرها من البول في اوقات معلومة ومتى شعرت بحرقة في اثناء التبوييل بشاور الطيب

ال بواسير — تحدث في الاشهر الاخيرة من الحمل وعلاجها ان تبل قطمة فانلا ناعمة باءة حار وتوضع بعد عصرها على ال بواسير . و تعالج أيضاً بوضع اسفنجه مبلولة بما يارد تكرر مراراً ويدهن على اثرها بترم البوريك والزنك ملحق ( ٧١ ) فيتلافى الالم وقد تجد الحامل بعض الراحة من الاستقاء على ظهرها واذا كانت الفائض ليناً والبراز متطلقاً فلا يكون لل بواسير اثر على الاطلاق

الدوالي — في اواخر الحمل تورم الرجل وتنتفخ اوردة الساق فتحتفف هذه الاعراض بالاضطجاع على الفراش والفرك براحة اليدين مبدأ من الناحية السفلية العليا ومن الوسائل التافعة حزم الرجل عند القيام من النوم بلفاقة من لستينك تضغط عليها ضغطاً خفيفاً . وقد تنتفخ الاوردة حتى تصير في خطير من الانفجار ويورم الوجه من ضغط الرحم على الكافية وهي حالة شديدة تستوجب ارشاد الطبيب واقل تهاون بذلك يزيد العلة خطراً

ومن اضطرابات الحمل :

افراز اللعاب — وعلاج غسل الفم بصبغة المر مع الماء

ألم الاسنان — يعالج بالوضعيات الحارة الجافة ملحق (٥٠) وفي غير ذلك

يشاور الطبيب

سقوط الشعر — من الاعراض الموقعة كوجع الاسنان وان طال امره فالطبيب

اولى بمعالجته وعليه يوصى في جميع الحوادث القوية في اثناء الحمل

في الصباح — من الاعراض المرعجة وعلاجه ان تتناول الحامل باكراً جدًا

في الصباح فنجان شاي او قهوة او مرق او حليب سخن وهي في فراشها منحنية على

الوسادة ثم نام . وقد يتواتر الفي في النهار فتحتفف وطأنه بتناول الطعام كيات

صغريرة في فترات قصيرة . ويجب ان تكون الماكلا خفيفة سهلة الهضم وان تكون

الاعباء سائرة في دفعاتها سيراً فانوينياً

والحرقة (الحمضة) مع غيرها من اعراض سوء الهضم التي تكثر في الحمل تزال

حالاً بشرب ماء الصودا

والسائل الايض يداوى بحقن المبيل بالماء

الفاتر واحسن محقنة لذلك (شكل ٣) وعند استعمالها

ترفع باليد نحو قدم او قدمين عن الارض . وقد (ش ٣) محقنة ذات انبوب طوي

يسكب هذا السائل حكة مزعجة في الاعضاء الخارجيه فتطف حديتها بنسف الموضع

ب محلول البوريك (ملحق ٧٥) واما اذا كان الجلد متسلحاً فيدهن ببرهم الزنك

او برش عليه مسحوق الطلاق

### علامات المخاض

المخاض هو الولادة يعرف بالمتنظم في الظهر والبططن يقى نحوربع دقيقة او

دقيقة واحدة ويأنى كل ساعه مرت ثم تقص هذه الفترة بين الالم والالم كلما

اد وانحصر مركزه في الظهر . وللمخاض علامات كاذبة وهي ألم متقطع وغير منتظم

تشعر به المرأة قبل الولادة باسبوعين . ويجب ان تفرغ الاعباء بالمخافق والثانية بالثالثين<sup>(١)</sup> ويلازمها الطبيب نحو اسبوعين بعد الولادة ومن ذاك الوقت تعمل بوجوب وصايه وارشاداته

سرير الولادة — يوضع السرير منحرفاً عن بخاري الهواء وبعيداً عن جدران الغرفة لكي يسهل الجلوان حوله . والعادة في الشرق ان تلد المرأة على الكرسي وهي عادة مكرهه تumb الولادة والولد والاحسن ان تستقر في الفراش مستلقية على ظهرها ويوضع تحتها خرق على شكل وسادة محشوّة بطبقة رقيقة من القطن وتحت الخرق ملأة من المشمع تقبل الدم وتمنع نفوذه الى الفراش . ومن جملة لوازم الولادة مناشف صغيرة ذات طبقتين من الشاش المطير توسيطها طبقة اخرى من القطن ويحضر الشاش في البيت بتعينه بمذوب حامض البوريك ثم يجفف ويحفظ نظيفاً لمسح الدم عند الولادة وبعد استعمالها تحرق مع سائر الخرق

وعلى اثر خروج الخلاص تنظف الاعباء التالية باسفنجه او منشفة من المناشف المذكورة مبلولة بالماء الفاتر المضاف اليه حامض البوريك نحو ٥ بالمائة وهو افضل المواد المضادة للفساد لشخص ثنه وسلامة استعماله وكثرة شيوعه بين الناس من الخواص والعموم . ويذكر الاغتسال بعض مرات كل يوم منعاً لفساد الدم من تجمّع القدارة في اعضاء الناسل

ويينبغى ان تنقل النساء الى فراش آخر نظيف وتوضع تحتها ملأة من المشمع وفوق الملأة خرق نظيفه تختص الدم وتحمي الفراش من التلوث به والاحسن ان يفصل بين الخرق والمشمع ملاءة اخرى عاديّة وتترك النساء حتى تنام ولا يجوز ان ترضع طفلها الا بعد ثمانى او اثنى عشرة ساعة من ولادته . وفي كل يوم تغير شرافش السرير وفتح نوافذ الغرفة لكي يتجدد هواها ويدخل نور الشمس اليها وذلك مع الاحتراس الكلي على النساء لئلا تبرد من التعرض لبخاري الهواء . ويجب ان يكون الغطاء خفيفاً لان الحر الشديد يؤثر في صحتها وان تحفظ حرارة الغرفة على

(١) انايب كوشوك لنفريخ البول تباع في الاجزائين

درجة ٧٠ في ميزان فهرنهايت و ٢١ سنتكراد . والحصول على هذه الميازين هين جداً واستعمالها اهون وهي رخصة المهن وذات فائدة عظيمة لتعديل حرارة غرفة النساء حسماً تقتضيه حالتها . اما العامة فتقل الشبائك وتضرم النار في الغرفة حتى تصير شبيهة بالحمام وقد هلك بسبب هذه العادة الذمية كثير من الوالدات ولا يجوز ان يدخل غرفة النساء احد غير مرضتها او من قاطط به خدمتها . على ان الشرقيين قلما يعيرون هذا الكلام اذناً صاغية فيجعلون غرفة المريض مجتمعاً للتدخين والحديث واذا نصحتهم قالوا « اذا عرب ولست افزع » ومما نصحت الاطباء ونهوا فليس من يسم ولمن يتبعه

### كلمة الى المولد والمولدة

النظافة حياة والوساخة موت . وربما يظن البعض اني اقصد المجاز في هذا الوصف مع ان الحقيقة هي ما اقصد في كلامي . قلت ان الوساخة موت لأن يد المولد ان لم تكن مطهرة من الجراثيم المرضية العالقة عليها انتقل البلا ، منها الى النساء واقوها في مرض عossal يصعب برووه ولا سيما اذا كانت الام نحيفة الجسم ضعيفة البنية فصیرها ولا شك الى الملائكة . فالنظافة الطبية هي ان تقل اخافرك وتنظفها من الاوساخ الحشوة فيها ثم تغسل يديك لحد الكوع بالصابون والفرشاة مدة لا تقل عن عشر دقائق وتفسها نحو دقيقة او دقيقتين في محلول مضاد للفساد مؤلف من جزء واحد من السليماني الى ١٠٠٠ او ٢٠٠٠ جزء من الماء . وبهذه الطريقة تقتل الميكروبات الموجودة على الاصابع بالملاليين وتضمن السلامة للنساء وفي الصيدليات اقراص من السليماني سهلة الدو邦ان في الماء . فيحضر منها المحلول في أي نسبة ومقدار اردت

ولا يجوز ان يمس المولد يديه غير المكان انمازج منه الطفل واذا لمس شيئاً او وجده او شعره الخ فليرجع وينسل ويظهر ثانية على نحو ما سبق ذكره . ولعلم المولدون والمولدات انهم اذا اغفلوا هذه الوصية فانما هم يرتكبون جريمة القتل


## القسم الثاني

في تدبير صحة الاطفال والاحاديث

### الفصل الاول

في دلائل الصحة

(تمهيد) تقسم حياة الاطفال والاحاديث الى طورين طور الطفولة يبتدىء من الولادة الى السنة الثانية وهو نهاية طور التسنين تقريباً والثاني طور الحداة يبتدىء من السنة ٢١ الى ١٣ أو ١٥ من العمر دلائل الوجه - من علامات الصحة ان ينام الطفل ويفمض عينيه تماماً ويطبق شفتيه الا قليلاً جداً . ويتنفس تنفساً هادئاً متظناً لا مضطرباً كا هي الحال في امراض الصدر الجلد - يختلف لونه في المولود حديثاً من احمر غامق الى احمر فاتح . وبعد الاسبوع الاول يتحول الى ابيض ضارب الى الصفرة واحياناً يكتنر الاصفار فتشتبس الحالة باليرقان لو لا ان ياض العينين يبقى طبيعياً فيدفع الشبيهة في التشخيص وبعد ايام قليلة يصير لون الجلد طبيعياً وتكتسب الوجنتان وراحة اليدين واحضن القدمين لوناً وردياً خفيناً الرأس - كبير بالنسبة الى جسم الطفل وشكله في حال الصحة مستدير أو يضووي وفيه يافوخان الاول في مقدمة الرأس فوق الجبهة قليلاً والثاني في مؤخره (ش : ) واليافوخ شق صغير في الججمة مؤلف من جلد الرأس وغشاء دقيق يغطيان الدماغ



صورة (١)



(صورة طفل عمره بضعة اسابيع)  
و فيها يظهر انحناء الساقين والقدمين الطبيعي

في حفظاته من الطوارئ الخارجية الى ان يمكن نمو العظام . وعند النظر اليه او وضع اليد عليه يشعر بتضليل متظم برافق حركة القلب فيستمان به على معرفة النبض في الاحوال التي يصعب فيها جسمه في الرسم (١) وذلك في الايام الاولى من الحياة كاسائني ذكره في دلائل المرض . ويجب انت يكون اليافوخ على مساواة سطح الرأس لا مرتفعاً ولا منخفضاً عنه . وقد يولد الطفل ورأسه مكسوباً بالشعر لكنه في النالب يسقط وينبت في مكانه (ش ٤) ججمة طفل شعر جديد وهذا التغير طبيعي لا يحدث عن مرض اليافوخ الامامي في الاعلى والخلفي في الاسفل أو انحراف في الصحة

اللسان — في الاسبوع الاول يكون اللسان مبيضاً من جفاف الفم ويقع على هذه الحال الى ان يظهر الداء نحو الشهر الخامس فيزول اليافوخ ويصير منظر الانسان طبيعياً وبعد ذلك لا يبيض الا في امراض المعدة والمعوي الصدر والبطن — يكونان في الطفل الاول صغيراً ضيقاً والثاني كبيراً بارزاً بسبب زيادة حجم الكبد عند الولادة وبعدها بقليل من الزمان

الاطراف السفلية — في اوائل الطفولة يقوس الطفل ساقيه فتقرب قدماء كما ترى في صورة (١) وهذا التقوس الطبيعي لا يدوم طويلاً . وفي ما سوى ذلك فالساق تقوس من مرض في العظام كما سبأني في الكلام على الكساح العينان — ليس للعينين لون معروف في اوائل العمر وكثيراً ما تضارب الاقوال في لونها فيزعم هذا انهما يشبهان عيني الام وذلك الاب وآخر العم او اخال الى غير ذلك من ضروب الحدس والتخيين . وفي الواقع ان العيون لا تستقر على لون واحد حتى الاسبوع الخامس أو الثامن

(١) ما بين الكف والساعد

الصراخ والبكاء - يكى الطفل حلاً يخرج من بطن أمه وسبب ذلك ان الهواء يدخل المسالك الهوائية في الرئتين فيوله ويهيج فيه البكاء وبعد ذلك لا يكى الا لسبب آخر . ومن دلائل الصحة ان يكون الصراخ صافياً راققاً لا تراقه خفة ولا بحة . وقبل الشهر الثالث أو الرابع يكى الطفل بدون ان تدمع عيناه وإنما بعد ذلك حين فلا يمتنع الدموع الا في الامراض الخطيرة

النفس - يتم التنفس في الذكور بالبالغين بواسطة حركة عضلات البطن والاضلاع السفلية فيقال له النفس البطني أو الصامي السفلي . وفي النساء بحركة الاضلاع العليا فيقال له النوع الصامي العلوي

اما التنفس في الاطفال فمن النوع الصامي السفلي في الذكور والاثاث مما وافق بلغت الانثى سن البلوغ يصير من النوع الصامي العلوي وتختلف مرارة النفس باختلاف السن كما ترى في الجدول الآتي الدكتور كوفيت الاميركي

عدد التنفسات في الدقيقة

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| ٥٠ - ٣٥ | من الولادة الى الاسبوع الثالث    |
| ٣٥ - ٢٥ | الى نهاية السنة الاولى .....     |
| ٢٨      | من الاولى الى الثانية ..... نحو  |
| ٢٥      | من الثانية الى الرابعة ..... نحو |
| ٢٥ - ٢٠ | من الرابعة الى الخامسة عشرة      |

على ان هذا الجدول قابل للزيادة والنقصان فقد يزيد التنفس على اثر الحموض وينقص نحو الربع او الثلث في وقت النوم من الولادة الى السنة الرابعة .  
ا. الطريقة التي تدبها النفس في الدقيقة وهي ان تفتح الساعة وتراقب حركة البطن في صعوده وهبوطه او ان تصعد يدك عليه فتشعر بحركته . وينبغي عندئذ ان تحاشي الاسباب التي تهيج عواطف الطفل ثلاثة بزداد النفس كما سبق القول . والاحسن ان يفحص وهو نائم ولا سيما اذا كان الذي يتهدده غريباً عنه . ويجب ان يكون النفس في الصحة من الاف ويعرف ذلك بوضع الاذن على مقربة من

اف الطفل فيسمع الصوت خارجاً منه . ولا ينفس الولاد من الفم الا في امراض الانف والحلق

النبض - مثل النفس لا يستقر على حال واحدة في سيره وما يطرأ على ذلك من التقلب يطراً ايضاً على النبض وخصوصاً في اوائل الطفولية فانه يهبط الى ١٠ - ٣٠ واحياناً الى ٢٠ نبضة في الدقيقة ومع ذلك فلا يكون في هذا التغيير شيء من الخطر على الحياة . واحسن موضع جس النبض هو الرسغ على مساواة ابهام اليد وقد لا يشعر به في هذا المكان ولا سيما في الاسابيع الاولى من العمر فيجس اما فوق مركز القلب تحت الثدي الايسر بالحراشف قليل الى الداخل او بمرأفة نبضان النافوخ فان جميع هذه المواقع تأتي بالغرض المقصود . اما عدد ضربات النبض في الدقيقة فهو كالتالي :

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| عند الولادة .....             | ١٣٥ - ١٥٠ |
| الشهر الاول .....             | ١٤٠ - ١٢٠ |
| من الشهر ١ - ٦ .....          | ١٣٥ نحو   |
| من الشهر ٦ السنة الاولى ..... | ١٢٠ نحو   |
| من السنة ١ - ٢ .....          | ١١٥ - ١٢٥ |
| من السنة ١ - ١ .....          | ١١٠       |
| من السنة ٢ - ٤ .....          | ١١٠       |
| السنة ٦ .....                 | ١٠٠       |
| السنة ٨ .....                 | ٨٨        |
| السنة ١٤ .....                | ٨٧        |
| سن البلوغ .....               | ٧٢        |

هذا معدل ضربات النبض في اليقطة وينبئ ان يكون الطفل عندئذ هادئاً لا مضطرباً وخالقاً . وفي وقت النوم يقل عدد النبضات قليلاً ففي الطفولية الى السنة التاسعة ينقص من ١٦ - ٢٠ نبضة في الدقيقة ومن التاسعة الى الثانية عشرة

٨ نبضات ومن الثانية عشرة الى الخامسة عشرة نبضتين . والنبض في البنات اسرع منه في الصبيان في السن الواحد والفرق بينها قليل جداً  
والاحسن ان يجسس النبض والطفل نائم واذا لم يتيسر ذلك ففي وقت الاكل او اللعب او غير ذلك من الملاهي التي تصرف نظر الطفل الى وجهة اخرى الاماء - يغوط المولود حديثاً مرتين أو ثلاث مرات في اليوم في اوائل عمره وكل ما يغوطه في الثلاثة ايام الاولى مادة كثيفة لزجة لا رائحة لها مسودة او سوداء ضاربة الى الحضرة تسمى الميكوبنيوم وهو الغائط الجنيني الذي يتكون في امعاء الطفل قبل ولادته  
وحياناً ينتظم ادرار البول من الثدي يتحول لون البراز الى اصفر كاوف الكناري له رائحة خفيفة واحياناً ترافقه مواد غير منضمة تدل على ارتفاع الطفل أكثر من حاجته ومن السنة الثانية وصاعداً يصير في قوامه ولونه مثل غائط الكبار اما قانون دفع الاماء فمن ٢ - ٤ في اليوم الواحد ومن週اً من الاسبوع السادس الى نهاية السنة الثانية يتناقض عدد الدفعات الى ١ في اليوم كما في البالغين . وقد يغوط الاولاً مرتين أو اكثر الى ٤ او ٥ على اثر اكله ثقيلة على المعدة ولا يدل هذا البراز على المرض الا اذا رافقته اعراض معوية  
البول - منظر البول في الاطفال الاصحاء يقرب جداً من منظر الماء وليس له رائحة قوية ولا لون يصعب الفحص او الثواب اما مقدار البول الذي يفرزه الطفل في اليوم الواحد فيختلف باختلاف التغذية وحرارة الطقس ورطوبته . فتارة لا تتجاوز الفوط (١) سوى مرة واحدة في النهار وطوراً تتغير من ٣ - ٤ مرات في الليل واحياناً تبقى الفوط نحو ٦ - ٨ - ١٠ ساعات ناشفة وهو كثير الحدوث في الصحة واما اذا مر على الطفل ١٢ ساعة ولم يبل فيشاور الطبيب وكلما تقدم الطفل في العمر يزيد مقدار البول كما يتضح من الجدول الآتي

للدكتور كريست الامير كاتبي

(١) الحفاض

## (جدول افراز البول في اليوم الواحد)

|                              |             |    |
|------------------------------|-------------|----|
| من الولادة الى السنة الثانية | ٣٩٠ - ٢٤٠   | كم |
| من السنة الثانية الى الخامسة | ٤٥٠ - ٧٥٠   | د  |
| من السنة ٥ - ١٠ ..... ١٠     | ١٠٥٠ - ٧٥٠  | د  |
| من السنة ١٠ - ١٥ ..... ١٥    | ١٢٠٠ - ١٠٥٠ | د  |
| سن البلوغ ..... ١٥٦٠         | .....       | د  |

حرارة الجسم - تعرف حرارة الجسم من لمس الجبهة او اي مكان آخر في البدن بقنا اليد . قلنا بقنا اليد لأن اعصاب الحس هنالك سطحية فيشعر بواسطتها بالحرارة اكثر مما لو استعملت لذلك راحة اليد

في الامراض الشديدة التي تخطى القوى يبرد الانف والرجلين واليدين وفي الحالات يسخن مؤخر الرأس . على ان هذه الطريقة وان تكون مفيدة في بعض الاحوال فليس لها مفعول عليه في قياس حرارة الجسم وضيئله على التام . والاحسن ان يكون في كل بيت ميزان حرارة الجسم (شكل ٥) والعامية تسميه ميزان



## (شكل ٥) ميزان الحرارة (فرنهيت)

الرذق وهو قلم دقيق من زجاج مقسوم الى درجات والدرجات الى اخواتها ومن ذلك يعبر عنها بالخطوط العرضية الكبيرة والارقام الهندية على جنبها والثانية بالخطوط العرضية الصغيرة . وفي طرف الميزان فتحاً أو بصلة مملوءة رذقاً فإذا وضعها في مكان سخن صعد الرذق على هيئة خط دقيق لام ووقف عند احدى الدرجات المذكورة أو اجزائها والمكان الذي يقف الخط عليه ولا يتعداه هو درجة حرارة الجسم وهذا الميزان على نوعين ميزان فرنهايت وميزان سنتيمتر فالاول درجة الحرارة الطبيعية فيه ٣٧ و الثاني ٩٨ . والدرجة في الاول مقسمة الى خمسة اقسام وفي الثاني الى عشرة اقسام

اما الموضع المستعملة لقياس الحرارة فهي الابط والقم والمستقيم . فالاول فلما يأتي بالفائدة المطلوبة بعد امكان حفظ الميزان محبباً عن الهواء تحت الابط . والثاني اي القم يستعمل للارولاد الذين عرهم من خمس سنين فما فوق . وطريقة العمل هي ان تأخذ الميزان اولاً بين السبابه والابهام وتفضه بشدة لكي ينزل الرذق الى قاع البصيلة ثم تضعه تحت لسان الولد وهو ثائم على ظهره وتتركه نحو اربع دقائق . ويلزم ان تعلم الولد ان يطبق شفتيه على الميزان ولا يضغط عليه باست انه فيكسره . وافضل من الكل ان تضعه تحت لسانه وتقول له ان يمسكه يده ويعصمه كاميصه كاميصه او قطعة من الحلويات وبهذه الواسطة يثبت الميزان تحت اللسان بدون ان يلحظه عطبه من است انه

أما صغار الاطفال والمتقلون بالمرض من الكبار فقياس الحرارة فيهم بواسطة المستقيم . وذلك بان تضع الطفل أو العليل على ظهره وتطوي ساقيه على خذيه ثم تدخل الميزان في المستقيم نحو قيراط أو قيراطين بحركة لوبية وتتركه اربع دقائق او اكثر الى ست دقائق

وبعد استعمال الميزان يغسل بالماء البارد والصابون ويغمس في محلول حامض البوريك (ملحق ٧٥) ثم ينزل الرذق الى البصيلة على نحو ما سبق ذكره ولا يخفى ان الحرارة في週ا الاول ليست قانونية في سيرها ومن ذلك الوقت فصادعاً تردد بين ٩٨ - ٩٩ ف وقد ترتفع عند أقل اضطراب يطرأ على الطفل في اثناء وضع الميزان فيه فضلاً عن انها تقلب في اليوم الواحد على درجات مختلفة في الصباح ترتفع قليلاً عن درجتها القانونية وعند الغروب تهبط شيئاً قليلاً ويزداد هبوطاً في الليل . وفي بعض الاحيان يلغ الفرق بين حرارة الصباح وحرارة الليل من درجة الى درجهتين او اكثر الى ثلاث درجات وقد نبهنا الى هذا الفرق دفماً لما يحدثه هذا التغير من الخوف . وزنيد على ذلك ان حرارة الصباح قد تبلغ ٩٩ - ٩٧ وحرارة المساء ٩٨ - ٩٩ في مقاييس فرنهايت . ولا تعتبر الحرارة غير طبيعية الا متى بلغت درجة ١٠٠ ف كما هو مذكور في

الكلام على دلائل المرض في القسم الثاني من هذا الكتاب  
على ان ما اوردناه من دلائل الصحة لا ينطبق الا على صغار الاطفال وكل  
قدم الطفل في الايام تغير دلائله الصحيحة كما سيأتي تفصيله في الفصل الثاني

## الفصل الثاني

### في نمو الاطفال والاحاديث

القوة - الحواس - العقل - الاصوات والتكلم - تسلط الطفل على وظائف  
جسمه - الوزن - الطول - الصدر والرأس - اليافوخ - الدمع - الاسنان

يولد الطفل ويبيق جنباً من الزمن لا يسمع ولا يصر الا ما يفرق به الظلة  
من النور ولا يشم ولا يذوق الا قليلاً واما اذا تبسم او حرك يديه ورجليه او شفتيه  
في وقت الرضاع فكل هذه الحركات غريزية غير خاضعة للارادة وعليه فالطفل  
لا يتأثر في اوائل حياته عن الحيوان الاعجم ولكن لا يلبث زماناً يسيراً حتى تنمو  
حواسه ويترقب عقله فبصبح الخام المطلق على ارادته يدبّر اعضاء جسمه كيما شاء  
نحوه في القوة - في الشهر الثالث يمسك الطفل كل ما يقدم له يديه الا انه  
لا يميز بعد من القرب فكلامها عنده في ذلك الوقت على السوأة ولذلك اذا رأى  
شيئاً بعيداً حاول ان يقبض عليه خاناً انه قد يبـ منه

وفي الشهر الثاني تقوى عضلات عنقه فيرفع رأسه عن المخدة وبعد شهر او  
اثنين يستطيع أن يضبط رأسه بدون مساعدة امه . وفي الشهر الثالث او الرابع  
فصاعداً بمحاول ان يبعد وفي الغالب لا يستطيع قبل الشهر السادس ومع ذلك فان  
قدوده يبيق مضطراً ولا يستطيع الى الشهر السابع من العمر  
وفي الشهر السادس يظهر ميله الى الوقوف واذا امسكته امه يديها من تحت

ابطيه ووقفته على حضنها فيبذل جهده ان يتصرف على رجليه ويضع القدم الواحدة  
امام الاخر كأنه يحاول ان يمشي

ومن السابع الى الثامن يجبون في ارض البيت وبعد ذلك شهر أو شهرين  
يلقي يديه على حافة الديوان أو شيء آخر كالكراسي فيتصرف على قدميه ويمشي  
خطوات قليلة . وفي نهاية السنة الاولى ينهض الطفل الصحيح الجسم على رجليه  
ويمشي بدون مساعد

على ان كل ما اوردناه في هذا الصدد لا يطرد في جميع الاطفال على السوأة  
فإن بعضهم يتأخر مشيهم ولا سيما اذا كان الطفل خفيفاً في الحبو فيبذل له او يبراه  
 شيئاً عليه لقضاء حاجته فلا يفهم بالمشي . والبعض الآخر يمشون قبل الحبو .  
وكثيرون لا يعشون الى الشهر الخامس عشر أو الثامن عشر واجاناً يتاخرون الى  
نهاية السنة الثانية وما بعد ذلك فإذا لم يعش الطفل فيخشى ان يكون في جسمه  
مرض يمنع نموه

نمو الحواس - يتندى نمو حاسة البصر في الطفل نحو الاسبوع السابع  
فيشخص يصره الى الاشباح القريبة منه ويطرف جفنيه اذا تحرك شيء امامها .  
وفي نهاية الشهر الثاني يتكمّل بصره ومع ذلك فلا يميز الالوان بعضها من بعض  
الا عند نهاية السنة الاولى من العمر

ويتندى نمو حاسة السمع في الاسبوع الاول فيستيقظ الطفل النائم من  
الصوت العالي ولكنه لا يميز الجهة الوارد منها الصوت الى الشهر الثالث من العذر  
ولا الاخذ الموسيقية الا بين السنة الثانية وثالثة . وقد يفضل الطفل لحناً على آخر  
وهو ابن ستين أو أقل على ان القوة التي يميز بها الاحذاف بعضها من بعض لا  
يتكمّل نوها في الغالب حتى يبلغ طور الرشد وكثيراً ما تكون مفقودة بعدها  
بقي ان الطفل يتبع في الشهر الاول من عمره ولكنه لا يضحك حتى يبلغ  
الشهر الخامس أو السادس . والتبع قبل الشهر الاول ليس له معنى في ذاته فهو  
من الافعال الغريزية الفير الخاضعة للعقل

نحو العقل — تبتدئي قوة التمييز في الشهر الثالث فيظهر الطفل بعض الحركات التي تدل على فهمه واستعداده للتعبير عن أفكاره . وفي هذه السنة أو بعدها بقليل يعرف امه من باقي النساء فيهش لقدمها ويكتف عن البكاء اذا كان يكفي عن جوع ورآها تهيءه ، الثدي لارضاعه

وفي الوقت نفسه يلذّ بمشاهدة الماناظر اللامعة البراقة ولا سيما ما يتحرك منها امامه . وفي الشهر الرابع يميل ان يمسكها بيده مظہراً اعجابه بها او نفوره منها . وفي الشهر التاسع يعد بيده الى من يطلبها . وفي نهاية السنة الاولى يشير برأسه او بيده الى ما يحبه او يبغضه . وبين الاولى والثانية يميز الاعداد الاصوات والتكلم — في الشهر الاول والثاني يتبعي ، الطفل باستعمال صوته فيخرج من فمه نغمات خصوصية وهذه النغمات ليست سوى اصوات غير ارادية ولكنها تدل على راحة الطفل وسروره

وفي الشهر السادس ينطق باصوات ساذجة مثل « آآ » وبعد ذلك بقليل يضيف اليها بعض الحروف القطعية كالميم والياء ، والدال فيكر لفظة ما . ما فاذا سمعت الام ذلك منه تظن انه يعنيها مع انه لا يقصد بهذه الاصوات معنى خصوصياً ولكنها مناغيات تدل على ما يتجده في نفسه من الارتباط والسرور وانما تجري هذه الالفاظ على السنة الاطفال دون غيرها لسهولة لفظها عليهم وكلا غا عقل الطفل تنمو معه قوة تقليد الاصوات فيلفظ في الشهر الثامن أو العاشر مقاطع عديدة بوضوح تام وعندما يبلغ السنة يقول ماما . بابا . وربما لفظ بعض كات اخري وهو يتعقل ما يقول وفي الغالب لا يتم ان يقول الكلمة حتى يفهم معناها قبلها . وفي الشهر الثامن عشر يعبر عن افكاره ببعض كمات قليلة ويستعين على بعض التعبير بالاشارة بيده ولا يتأنى له على الغالب ان يأتى بجمل قصيرة الا متى بلغ السنين تساطع الطفل على وظائف جسده . تقصد بذلك اطلاق الفضلات بارادته وكثيراً ما يتوقف هذا الامر على التدريب والتعليم فإذا بال أو غاط فينبه الى ذلك الوزن — مختلف وزن المولود حديثاً من ستة الى سبعة ارطال مصرية

( الرطل ٤٤ درهماً ) وفي الثلاثة ايام الاولى يقل وزنه بعض الشيء لقلة المواد المفدية اذ ذاك في الثدي ولكنها يعود في نهاية الاسبوع الى ما كان عليه حين الولادة ثم يأخذ في الزيادة . فاذا فرضنا وزنه عند الولادة ٧ ارطال كان معدله الى نهاية السنة الاولى على ما يأتي :


|        |                |          |
|--------|----------------|----------|
| ١٦ رطا | في الشهر الاول | ٢٣ ارطال |
| ١٢     | » » الثاني     | ٩٢       |
| ١٨     | » » الثالث     | ١١ رطا   |
| ١٩     | » » الرابع     | ١٢٢      |
| »      | » » الخامس     | ١٤       |
| »      | » » السادس     | ١٥       |

ومن السنة الاولى الى العاشرة يزداد الطفل في الوزن من ٤ — ٥ ارطال في السنة ومن العاشرة الى السادسة عشرة نحو ٨ ارطال الطول — يختلف طول المولود حديثاً من ١٦ — ٢٢ قيراطاً وفي السنة الاولى يزداد طوله نحو ٧ قواريط و اكثر ما تكون الزيادة في الاسبوع الاول ثم تنحط في الاسبوع الثاني وتتجري في انخفاضها على نسبة واحدة الى الشهر الخامس ثم تنحط ايضاً وتستمر كذلك على معدل واحد الى الشهر الثاني عشر . فاذا فرضنا طوله عند الولادة  $\frac{1}{2}$  قيراطاً كان في الاشهر التالية على ما يأتي :

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| ٢٤ قيراطاً | في الشهر الاول | ٢٠ قيراطاً |
| ٢٥         | » » الثاني     | ٢١         |
| ٢٥         | » » الثالث     | ٢٢         |
| ٢٦         | » » الرابع     | ٢٣         |
| »          | » » الخامس     | ٢٣٢        |
| »          | » » السادس     | ٢٤         |

وفي اثناء السنة الثانية تبلغ الزيادة من ٣ — ٥ قواريط وفي الثالثة من ٢ — ٣

وفي الرابعة من ٢ - ٣ ومن ذلك الوقت الى السنة السادسة عشرة يبلغ معدل الزيادة من ١٢ - ٢ في السنة  
وعندما تبلغ الآمني السنة الثانية عشرة تسبق الذكر في الطول دون الوزن ومن  
السنة الخامسة عشرة فما فوق تتأخر عنه فيسبقها الذكر في الطول والوزن جيماً .  
وعلى كل حال لا يطرد النمو في جميع الارواح على وتيرة واحدة ولكن ما اورده  
هنا اما هو المعدل بعد اخذ الوزن والقياس في عدة اطفال في اعمار مختلفة فجعل  
مقاييساً تعتبر به حالة الطفل في الصحة



(ش ٦)

فيستفاد مما تقدم ان الانسان لا ينمو في زمن الحداة بنفس السرعة التي ينمو  
بها في اثناء الطفولة بل يقل معدل الزيادة كل سنة عن التي قبلها . نعم ان اعضاء  
الجسم تتفاوت في النمو فيسبق العضو الواحد العضو الآخر كما يتضح ذلك مما سيجيء  
ترى في الشكل (٦) رسماماً تمثل ستة اشخاص في اعمار مختلفة . فالرسم  
الاول يمثل ابن سنة والثاني ابن ٥ سنين والثالث ابن ٩ والرابع ابن ١٣ والخامس  
ابن ١٧ والسادس ابن ٢١ في حين الواحد والآخر اربع سنين وكل رسم مقسوم  
إلى اربعة اقسام تدل عليها الخطوط المقطعة وهذه الخطوط منحنية اي متقوسة غير  
مستقيمة ومن امثالها يتبين ان معدل النمو يقل كل سنة عن الآخر ولو كانت  
الانسان ينمو في السنين الاخيرة بالسرعة التي ينمو بها في السنين الأولى من الحياة لكان

الخطوط المقطعة مستقيمة لا منحنية وبالتالي كانت قامة الانسان اطول مما هي عليه الان  
ثم يظهر ان النمو لا يكون على نسبة واحدة في جميع الجسم كا قدمناه وذلك  
ولا ان طول رأس الطفل الذي عمره سنة واحدة يساوي ربع جسمه كله وبعبارة  
اخري يكون طول جسمه طول اربعة اروش مخالف الذي عمره ٢١ سنة فان  
طول رأسه يساوي  $\frac{1}{6}$  من جسمه اي نحو السادس . وعليه فيكون رأس الطفل  
بالقياس الى جسمه اكبر من رأس البالغ بالقياس الى جسمه مما يدل على ان الرأس  
يقصر عن باقي اعضاء الجسم في النمو

وثانياً ان متصف جسم الطفل عند السرة ومتتصف جسم الشاب عند  
الحرقتين أي عظمي الوركين وذلك ان ساقي الشاب اطول من ساق الطفل بالقياس  
إلى جسم كل منها . وهذا النمو في الساقين يقتدى من السنة التاسعة ويستمر الى  
السادسة عشرة من العمر وهو الطور الذي ينموا فيه الاولاد بسرعة وسبيه الساقان  
الصدر والرأس - هذا في النمو الطولي للجسم واما النمو المرضي فيعتبر فيه  
الصدر والرأس والابو يقايس عند الشذوذين الى ما يحيط بها من الظاهر والثاني يقايس  
من وسط الجبهة الى ما يحيط بها من قفا الرأس ولكل منها قياس مخصوص في اعمار  
مختلفة من الولادة الى سن البلوغ على ما ترى في هذا الجدول

| قياس الصدر | قياس الرأس | عند الولادة     | $\frac{1}{2} ١٣$ قيراطاً |
|------------|------------|-----------------|--------------------------|
| ١٣         |            | في الشهر السادس | $\frac{1}{2} ١٦$ >       |
| ١٥         | »          | « السنة الاولى  | ١٨ >                     |
| ١٧         | »          | « الثانية       | $\frac{1}{2} ١٨$ >       |
| ١٧         | »          | « الثالثة       | ١٩ >                     |
| ١٩         | »          | « السادسة       | $\frac{1}{2} ١٩$ >       |
| ٢٠         | »          | « الثانية عشرة  | ٢٠ >                     |
| ٢٣         | »          | « سن البلوغ     | $\frac{1}{2} ٢١$ >       |
| ٣٩         |            |                 |                          |

ومن هذه الارقام يتبين ان الصدر يسبق الرأس في النمو . على ان هذا اتفا هو القياس المعدل كما سبقت الاشارة اليه وقد يختلف في بعض الناس قليلاً ولكن اذا كان الصدر أضيق مما ذكر كثيراً أو حجم الرأس زائداً كثيراً فهو دليل المرض أو حالة أخرى غير صحيحة

الياقوخ — في الرأس يأفوخان الواحد في موضعه والآخر في مقدمه فالاول ينبع باكراً . والثاني لا يكمل نموه الى الشهر الثامن عشر تقريباً ولذلك يجب على الام ان تلاحظه بانتباه تام لان الياقوخ كاً قيل في فصل دلائل الصحة مؤلف من جلد الرأس وغشاء رقيق يقيّن الدماغ من العوارض الخارجية الى ان يتكمّل عظم الجمجمة (انظر شكل ٤ في صفحة ١٢)

نحو الفدد الدمعية — يمكى الطفل في اوائل الطفولة بكاء جافاً فلا تدمع عيناه الى الشهر الثالث او الرابع وهو الزمن الذي يظهر فيه الدمع وقبل ذلك لا ترى امراً للدموع على خديه

شعر الرأس — يسقط شعر الولادة في اواخر الاسبوع الاول وينبت في مكانة شعر جديد ناعم كالاول ولكن لونه اصفر . وأما الزمن الذي يتكمّل فيه نموه فيختلف باختلاف الاشخاص وأحياناً يتأخر الى الشهر الخامس وقد لا يسقط شعر الولادة باكراً فيتأخر الشعر الجديد اكثر من ذلك

نحو الجهاز المضيي — نعني بالجهاز المضيي الفم والمعدة والبنكرياس والامعاء وظيفة هذه الاعضاء هضم الطعام وكما زاد نموها مع الايام زادت ايضاً قوة الهضم فيها . فالجسم يفرز اللعاب الذي يهضم المواد النشائية في الطعام ويحولها الى مادة سكرية صالحة للهضم المعدى كما اسلفنا ذكره في فصل الرضاع . في اوائل الطفولة لا يفرز الطفل الا ما يكفي لترطيب فمه ولكنه يكثر من الشهر الرابع فصاعداً حتى تضطر الام ان تضع على صدره فوطة تستقبل اللعاب وتعتني بفوده الى ثيابه

والبعض يظنون انت اللعاب انا يكثُر في ذلك الوقت بسبب اقتراب نبت

الاسنان وليس في ذلك شيء من الواقع لأن كثرته حاصلة من اكتئال نمو الفدد التي تفرزه ولا علاقة له بالاسنان . ولو كان الامر كذلك لكان افراز الاعاب يشتهد عند نبت الاسنام الذي هو أصعب كثيراً من نبت الاسنان والمعدة تفرز سائلاً خاصاً بها يقال له العصارة المعدية وهي في الاطفال قليلة جداً ومثل ذلك عصارة البنكرياس والامعاء . كل هذه تنمو تدريجياً حتى تبلغ معظم القوة


﴿نحو الاسنان﴾ — نبت الاسنان حالة طبيعية لا مرضية وما يظنه البعض من انه هو السبب في الاعراض التي تصحبه خطأً كبيراً فان كثيرين من الاطفال تظهر اسنانهم بدون عارض مزعج ينتبه اليه او انهم يتذمرون شيئاً قليلاً لا يذكر . والاسنان نوعان وقية (لبنية) وزمرة (تابعة)

(أولاً) الاسنان الوقية ويقال لها اللبنية أيضاً وهي عشرة في كل ذك قاطعان أوسطان وقاطعان جانبيان ونابان وضرسان صغيران وضرسان كبيران على نحو ما ترى في (الشكل ٧)

وتطهر الاسنان الوقية أزواجاً منتظمة في أوقات معينة وبين الفوج الواحد والآخر فترة من ازمان يستريح بها الطفل مما عسى ان يرافق (١) قاطعان أوسطان (٢) قاطعان جانبيان (٣) نابان (٤) ضرسان طور التسنين من الاضطرابات المرضية كما يتضح صغيران (٥) ضرسان كبيران من الجدول الآتي :


(جدول مواعيد نبت الاسنان الوقية وترتيبها بوجه التقارب )

|                 |                            |                        |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| الفوج الاول ..  | القاطعان الاوسطان السفليان | الشهر ٧                |
| الفوج الثاني .. | القواعد الاربعة العليا     | الفترة من ٣ — ٧ أسابيع |
| الشهر ٨ —       | الفترة من شهر — ٣ أشهر     |                        |



الاطفال بعد مشاورة الطبيب


وإذا تأخرت نبت الاسنان الى ما وراء السنة الاولى من العمر فذلك دليل على مرض في الجسم ينبع منها وقلما تتعوق بدون علة . وتظل الاسنان الموقته راسخة في مكانها الى ان تنبت الاسنان الثابتة من تحتها فتتقلقل جذورها وتسقط واحياناً تبقى الموقته في مكانها وتظهر الثابتة من موضع آخر عوجاء قبيحة المنظر . وبناه على ذلك يجب ان تدارك الام طفلها من أول ظهور اسنانه فتأخذه الى طبيب الاسنان من وقت الى آخر لاجل مراقبة اسنانه واجراء ما يمكن عمله قبل فوات الفرصة والا بقيت اسنانه عوجاء .



(ش ٨)

(٢) قاطعان اوسطان (٢) قاطعان جانبيان (٣) نابان (٤) ضرسان مقدمان صغيران (٥) ضرسان مؤخران صغيران (٦) ضرسان مقدمان كبار (٧) ضرسان كبار نابان (٨) ضرسان كبار نابان

وقد يكون الفك ضيقاً فيسبب بروز القواطع الثابتة الى الامام فمن الواجب ان يتدارك هذا الحال باكرًا قبل ان يقوس عظم الفك ويتعدى تدبره وهذا أيضًا من واجبات طبيب الاسنان



الفوج الثالث •• اربعة اضراس صغيرة  
وقاطعان جانبيان سفليان { من الشهر ١٢ - ١٥

الفوج الرابع •• اربعة اسنان ثابتة  
من شهر ١٨ - ٢٤ الفترة من شهرين - ٣

الفوج الخامس •• اربعة اضراس كبيرة  
(ثانية) « الاسنان الدائمة يتدنى » ظهورها من السنة السادسة فصاعدًا

وهي ست عشرة في كل فك اربعة قواطع ونابان وأربعة اضراس صغيرة مقدمة  
ومؤخرة وستة اضراس كبيرة كما ترى في (الشكل ٨)

|   |         |
|---|---------|
| أما ظهور الاسنان الثابتة فهو على النحو الآتي :- | السنة   |
| اربعة اضراس كبيرة مقدمة                         | ٦       |
| « قواطع وسطى                                    | ٧       |
| « جانبية  | ٨       |
| « اضراس صغائر مقدمة                             | ٩ - ١٠  |
| « صغائر مؤخرة                                   | ١٠ - ١١ |
| « اسنان كبار ثوان                               | ١١ - ١٣ |
| « اسنان كبار ثوان                               | ١٢ - ١٥ |
| « كبار ثوان                                     | ١٧ - ٣٥ |

ونبت الاسنان على هذا الترتيب ينطبق على جميع الاطفال تقريبًا . الا انه في بعض الاحيان يظهر القاطعان العلويان قبل السفليين في الاسنان الموقته . وكثيراً ما تنبت قبل الشهر الرابع او يتأخر نبتها الى ما بعد الشهر الثامن والتاسع وأحياناً يولد الطفل وفيه أحد القواطع السفلية او العلوية لكن لا يثبت زمام طويلاً حتى يسقط وينبت في مكانه قاطع آخر من الاسنان الموقته وقد يبقى الى الى التسنين الثاني أي الاسنان الثابتة وكثيرون من الناس يتخذونه دليلاً على العافية وقوة الجسم وليس هذا بصحيح والافضل ان ن詁م الاسنان التي تولد مع

## الفصل الثالث

### في الاستحمام والنظافة

حرارة الماء — كيفية الاستحمام بالماء السخن — الحمام والمغطس — الاستحمام بالماء البارد وماء البحر الملح — نظافة الفم — نظافة الالدين والالخذين — نظافة الرأس — نظافة الاسنان

الاستحمام اما ان يكون بالماء السخن لترى الاوساخ المضرة عن البدن او بالماء البارد لنبيه القوى المختحة من فعل الحر في أشهر الصيف ونبسط الكلام على ذلك فيما يأتي :-


﴿ حرارة الماء ﴾ — يجب ان تكون حرارة الماء الذي يغسل فيه الطفل المولود حديثاً على درجة ١٠٠ ميزان فهرنهايت ثم تخفض كل يوم عن الآخر حتى تستقر من بعد الشهر السادس فصاعداً على درجة ٩٥ - ٩٠ في الشتاء و ٨٥ - ٨٠ في الصيف ويستدل على حرارة الماء بتغميس الكوع فيه حتى يشعر بأنه أعلى من درجة حرارة الجسم بقليل . والافضل ان تقام حرارة الماء بالميزان (شكل ٩) وهو قلم من زجاج موضوع في علبة خشب مستطيلة وفي طرفه نفخة أو بصلة مملوءة زبقاً فإذا وضع في الماء بضم دقائق صعد الزبق على هيئة خط لامع كما تقدم شرحه في الكلام على ميزان حرارة الجسم (صفحة ١٦) فليراجع بمحله

ويحسن ان يمد قليل من الماء السخن وقليل من الماء البارد (ش ٩) لتعديل حرارة ماء الحمام قبل وضع الطفل فيه ميزان حرارة الماء

﴿ كيفية الاستحمام بالماء السخن ﴾ — متى ولد الطفل وبعد الاهتمامات الالزمه وربط الحبل السري تأخذه القابلة محل ملأة نظيفة ناعمة وتضع اناه الماء بقرب يدها اليمنى وكذلك اسفنجية ناعمة او قطعة شاش جديد خال من النشاء وقطعة صابون وقطن مطهر ومنشفة عثية ذات خل ناعم وثياب الطفل فبتدي اولاً بدهن بدنه بالفالسلين او بزيت الزيتون النقي حتى يسمى في اثناء غسله ذو بان المادة المخاطية اللاصقة تجسم الطفل المولود حديثاً . ثم تغسل رأسه ووجهه بالاسفنجية او بقطعة الشاش والماء من غير صابون وتفتح عينيه فتفسلها بقطعة قطن مطهر تبليها بالماء وتنصرها بالعين حتى تنطف جيداً ثم تمسح الاوساخ اللاصقة بالاهداب بالقطن ايضاً . واذا كان في الفم او الاذف او الاذين شيء من ازتعنه بقطعة من القطن المذكور . واحياناً يدخل الفم مواد مخاطية ورغوية فنزل بغسلها بالماء ومتى تم غسل الرأس يفرك البدن باسفنجية او قطعة شاش مرغى عليها بالصابون ثم يضع الطفل في مقطس الماء نحو دقيقة او دقيقتين حتى يزول ما على جسمه من الصابون . ويخترس من احتمامه في غرفة نوافذها مفتوحة . واذا كان المخل بارداً فلا بأس من ابقاء النار فيه ثلاثة يبرد فيكون ضرر الاستحمام اكثر من فعنه وبعد احمام الطفل على هذه الطريقة ينبغي ان ينشف جسمه سريعاً ويداك دلّاك اطيفاً براحة اليد بعد دهنها باليزيت او الفالسلين ثم يذرّ عليه مسحوق النشاء او الارز الناعم جداً وخصوصاً وراء الاذين وعلى مغابن العنق وتحت الابطين وما بين الالذين والالخذين لمنع الاحتكاك وتسلخ الجلد ويحظر استعمال الاسيدراج وغيره من المركبات التي تباع في الاسواق فانها كثيراً ما تهيج الجلد وتكون سبباً لحدوث امراض جلدية وخيمة العاقبة وبعد غسل الطفل بكل سرعة على نحو ما اسلفنا بيانه يجب ان يلبس ثيابه بعد تدفئتها قليلاً على النار ثم يوضع على فراشه اكي بنام ويستريح وينبغي ان يكون الماء الذي يغسل به الطفل تقبلاً صافياً والصابون خالياً من

الماء الحرارة التي تهيج الجلد وتسبب تسلخه وأفضل الصابون البدني الذي يصنع في سوريا ومصر من زيت الزيتون النقي ويمايله في الجودة صابون كاستيل والصابون الجرماني المعروف باسم بازيس سيف Basis Seife

«المغطس» — يستعمل للاستحمام الاناء المعروفة بالمغطس او حمام الزنك وهو الذي ترى صورته في (شكل ١٠) واذا تعذر الوصول اليه فيستعمل الطشت او الرجل (الحلة) او الدست على انه كثيراً ما ينفر الطفل من الماء فيحسن اذ ذاك ان يغطى المغطس علامة ويفصل الطفل من فوقها شيئاً فشيئاً وأفضل من ذلك ان يوثقى بالمغطس فارغاً فيدفأ قعره بالماء السخن ثم يوضع فيه الطفل ويسكب حوله الماء المعد لاستحمامه قليلاً قليلاً فيهش اليه ويلعب فيه وهكذا يأنقه ولا يعود ينفر منه وعلى كل حال فهذا الامر موكول الى حكمة الام وحسن تدبيرها



(ش ١٠) مغطس أو حمام

اما وقت الاستحمام فيمكن ان يكون مرة واحدة يومياً في الصباح قبل الاكل او بعده بساعتين او ثلاث ساعات ولا يجوز الاستحمام في المساء الا اذا كان الغرض من منع الارق الذي يكثر في الاطفال ولا سيما في الاشهر الاولى من الطفولة

على انه يجوز ان يغسل الطفل اكثر من مرة واحدة في النهار وذلك في زمن الحر الشديد فيلطف الماء السخن حرارة الجسم خلافاً لما تعتقد العادة . ومتى

بلغ الولد السنة الثالثة فلا يتأس ان يتنصر في استحمامه على ثلاثة مرات في الاسبوع وأفضل الاوقات التي تختار لغسله وقت المساء قبل طعام العشاء مع المداومة على مسح البدن بالاسفنجة والماء الفاتر في كل يوم صباحاً . ومن الضروري ان يكون الرأس مبلولاً قبل غسل الجسم اثقاً المضار التي تنشأ عنه . واما مدة المكث في الماء فتختلف من دقيقة واحدة الى دقيقتين في الاشهر الاولى من الطفولة ثم تزداد شيئاً فشيئاً بحسب تحمل بنية الطفل وعمره حتى تبلغ العشرين دقيقة في سن الحادىة

﴿الاستحمام بالماء البارد﴾ — يختلف الماء الذي يستحم به بين ان يكون من ماء البحر او ماء الينابيع والانهر وانفعه ماء البحر الملح لانه يتضمن بعض العناصر الطبيعية فيمتص الجلد شيئاً منها وتقييد الجسم قوة ونشاطاً . في اول الامر يجب ان يغسل الطفل بماء البحر الملح في البيت ومتى كبر وبلغ السنة الخامسة يدرّب على السباحة فيزداد انتقاماً بحركة عضلاته . ومحظوظ تقطيس الاولاد في الماء البارد قبل السنة الثالثة من العمر لثلاثة يكون علة لضررهم . واذا شعر المستحم بالبرد بعد تنشيف بدنها أستدل على عدم انتقامه بالماء البارد فيجب ان يعدل عنه الى الماء الفاتر او يقلل الاستحمام تبعاً لافتراض الحال

هذه هي طرق الاستحمام العام للاطفال والاحاديث في الصحة واما في المرض فترى شرحـاً كافياً في (ما يحق ٣٦ - ٥٠) في آخر هذا الكتاب . وعلاوة على ما

ذكر في هذا الموضع يجب ان تنظف اجزاء البدن كما يأتي

﴿نظافة الفم﴾ — ينظف داخل الفم بعد كل رضاعة حتى لا تخمر فيه بقايا الابن ف تكون سبباً لحدوث التهابات فية تذهب الطفل وتحمره لذلة الغذاء . ومتى تم ايدار اللعاب فلا يتأس ان يقتصر على تنظيفه دفعة واحدة في اليوم . اما طريقة غسله فهي ان تلف على طرف الاصبع قطعة قطن مطهور تبل قليلاً بالماء الفاتر ويمسح بها باطن الفم . ويجوز مسحه أيضاً بقطعة شاش بشرط ان تكون جديدة خالية من النشاء

﴿نظافة الاليتين والفحذين﴾ — يجب ان يغسل ماءين اليتي الطفل وفحذيه بالماء الفاتر بعد كل براز وتبول ثم ينشف جيداً ويرش عليه مسحوق التلك أو الشاء الناعم جداً منعاً للتسخنات الجلدية التي تحدث من بقاء البراز والبول على الجلد

﴿نظافة الرأس﴾ — كثيراً ما يتكون بعد الولادة قشور سمراء على جلد المجمدة يقال لها (خبرة الرأس) ولكنها تزول بالمدامنة على النظافة وان بقيت مانعة بجلد الرأس فلا بأس من دهنها بزيت الزيتون او الفاسلين النقي حتى تلين وتتفصل ويجب ان يشط الشعر بمشط ذي اسنان غليظة ويفرشى بفرشاة ناعمة من وبر الجمل فتزيل جلد الرأس نقوية ويكتفى تكون القشور عليه . ويحرص الاحتراس دائم من استعمال اسنان المشط الدقيقة والفرشاة القاسية لئلا تخدش فروة الرأس وينتهي الحال بامراض جلدية بطيئة الشفاء

﴿نظافة اليدى﴾ — هي من القوانين الواجب اتباعها لما ينشأ عن تراكم الاوساخ في اليد من الامراض الوبيلة وكذلك تقليل الاظافر كلام طالت فانه كثيراً ما يحدث بسببها تسخنات في الوجه والفم غير محمودة العاقبة

﴿نظافة الاسنان﴾ — يجب ان لا يغفل عن تنظيف الاسنان ولا سيا الاسنان المؤقتة (التسنين الاول) فانه اهمالها يكون سبباً لفسادها وتسوسها فتعجز عن مضغ الطعام وطحنه جيداً فينزل الى المعدة حلاً ثقيلاً يصعب عليها هضمه فيصاب الولد بعسر الهضم فضلاً عن ان اهمالها يفضي الى اوجاع عصبية واعوجاج الاسنان المزمنة في الطور الثاني من التسنين

وتنظف الاسنان المؤقتة بفرشة بقطعة نسيج ناعم صباحاً ومساءً ويستمر على ذلك الى ان يكمل نبت الاسنان الزمنية فتنظف عندئذ بفرشاة ناعمة بعد بها بالماء الفاتر ويجب ان يشاور الطبيب عند اقل تسوس يظهر في الاسنان

## الفصل الرابع

### ـ في ثياب الاطفال ـ

كلام عام على انواع الانسجة وازياء الثياب — حزام البطن — الحفاظ — الجوارب القميص — التدوره والسلطة — الكبوت — ثياب النوم — الطافية — كيفية الباس الطفل ثيابه — الثياب القصيرة — سروال بفحذين — حالة الحفاظ — الحذاء او الجزمة — صدرة لاستقبال اللعب — مريول للبدبة او الحبو — الوان الثياب — تغير الملابس من السنة الثالثة فصاعداً — حذاء كبار الاولاد

ـ مـ مـ مـ مـ ـ

### كلام عام على انواع الثياب وأزيائها

خير الثياب للاطفال ما كان واقياً لا بد انهم من مس البرد والحر لأن جلود الاطفال سريعة الحس و فعل البرد شديد الخطر عليهم سواء كان في الشتاء أو في الصيف ولا سيما في الاشهر الاولى من الطفولة ولذلك يجب أن تكون ثيابهم من الصوف في جميع فصول السنة وخصوصاً ما يلبس منها مباشرة على الجلد بشرط ان يكون الصوف ناعماً لين النسيج لا يؤثر منه على جلود الاطفال البضة لأن الثياب التي هذه صفتها تحافظ لحرارة البدن الغريزية وأوقى لاجسام الصغار من قوارض البرد وتغيرات الجو الفجائية

واذا كان جلد الطفل لا يتحمل من الصوف ولا سيما في فصل الصيف فلا بأس ان يكون القميص الذي يلبسه على بدن من الحرير او الشاش الناعم وفرقه قيس الصوف . ومع ذلك فقد يكون لبس الصوف في أيام الحر باعثاً على ازدياد حرارة الجسم وحدوث طفحات جلدية مضرة بالصحة وعندئذ يجب ان يعدل عنه ويمول على لبس القطن ملائمة البدن لانه الين مساً وأنعم وهو لذلك أكر

ملائمة لجلود الاطفال البضة في زمن الحر  
على ان ثياب الصوف لا تثبت زمناً قصيراً حتى تُضيق وتفسو فتضيق الفائدة  
المقصودة منها . وسبب ذلك عدم الاعتناء بغسلها فانه يجب ان يكون الماء الذي  
تُغسل به سخناً بقدر ما تتحمل اليد حرارته ثم يذاب الصابون في الماء وتغسل الثياب  
بتحريرها فيه مراراً من غير قرص او فرك بلوح الصابون وبعد غسلها على هذه  
الصورة يجب ان تُفتوح بالماء السخن الصرف حتى يزال ماعليها من الصابون ثم  
تعصر بالضغط عليها بين الكفين وليس بقفلها أو ابرامها باليدين وتنشر في الهواء  
لافي الشمس بعد جذبها من أطرافها خوفاً من ان تنكمش وتُضيق . وقبل ان  
تشف تماماً تُكبس بعكوه حامية قليلاً

وقد يقل انكسار الانسجة الصوفية اذا كانت خيوطها مخلولة أي غير مفتوحة  
او كانت من الصوف والقطن معًا بشرط ان يكون الاخير أكثر من الاول  
بنحو الثالث تقريباً والا فيجب ان يمول على القطن ويختار منه ما يلائم الطفل  
في جميع فصول السنة

ومن القوانين الصحية التي يجب مراعاتها ان تكون الثياب واسعة لاضيقة للثلا  
تضفط الصدر وتعيق دورة الدم وحركة التنفس . وثم عادة سجدة في بلادنا وهي  
انهم يلفون الطفل بالقمط من رأسه الى اخره قدميه واحياناً يبلغ الجهل من الام  
او الداية فتشد القاط طحت حتى ينقطع تنفس الطفل ويموت ضحية العادة والجهل  
والافضل ان يكون نسيج الثياب وزيهما في غاية ما يكون من البساطة بحيث  
تغسل كلما ما انسخت غير مأسوف على جدها ورونقها . واذا كانت الثياب من  
الانسجة الفالية الثمينة ومفصلة بحسب الزي الذي يشقق ان يكون هو الزي الدارج  
فقد يخشى ان تكون مثل هذه الملابس موضع اعجاب الام فتبالغ في الحرث  
عليها ولا تغسلها خوفاً من ان تفقد بهجتها او تفوتها لذلة النظر اليها على ولدها  
فتتبدل الاوساخ عليها طاقاً فوق طاق وربما كان الوسخ باعثاً على تولد الجراثيم  
او المكتروبات المرضية وحدوث امراض شديدة الخطرا على حياة الطفل

قلنا انه يجب ان تكون جميع ثياب الاطفال صيفاً وشتاءً من الصوف . على انه  
يجوز من بعد الشهر السادس ولا سيما في زمن الحر ان يكون الباس الخارجي من  
الكتان او المصلينا والباس الملافق للجلد من القطن اللين النسيج . وعلى الام ان  
 تستعين بالطبيب في مثل هذه الاحوال فينتهي من الانسجة ما يوافق الطفل في  
جميع فصول السنة

### ازداء الثياب وأسماؤها

﴿حزام البطن﴾ - يحزم بطن المولود حدثاً بحزام من الصوف الناعم  
اللين النسيج ويداوم عليه الى ان يصدر عمره ستة أشهر . واذا كان الطفل صيفاً  
فلا يأس من بقاء الحزام عليه الى نهاية السنة الاولى من العمر . والغرض من  
الحزام المذكور حفظ البطن دافئاً ووقاية السرة من الحركة الى ان تجف وتسقط  
في اليوم الرابع او الخامس من الولادة




ويجب ان يكون الحزام عريضاً يغطي البطن وأسفل  
الصدر وان يكون مقصوصاً بالورب حتى يصدرلينا  
ومطاطاً يتبع حركة البطن في الصعود والهبوط . ويخترس  
من شد الحزام كثيراً لثلاثة توليد بسبب ذلك غازات معوية  
تكون علة لحدوث المغص أو انتقام الامعاء الذي يفتقى  
إلى الموت . ويكتفى ان يكون مشدوداً قليلاً بحيث تدخل  
الكافلينه وبين البطن . واذا كان الحزام شغل الصنارة  
(شكل ١١) فهو أسلم عافية للاطفال وقد لا يصعب على  
الام الحاذقة بالاشغال اليدوية ان تقلده والا فتدبر من  
حزام بطن شغل  
يشتغل بها مثله . وهذا الحزام يعلق بالكتفين على ما ترى  
الصنارة  
في الشكل وله من الطرف الاسفل علاقه صغيرة لربط الحفاظ بها وهو لين  
مطاط يرافق البطن في حركته صعوداً وهبوطاً

(ش ١١)

**(الحافظ)** - هو الذي يستقبل المبرزات والفضلات ويتخذ من المكتان أو القطن وغير ذلك من الانسجة التي تدفع الحرارة عن الجلد وتحفظه بارداً بشرط أن يكون النسيج عتيقاً ليناً لا جديداً أخشننا يسلخ الجلد ويُحتجب استعمال الحفاظ من المشمع ثلاثة يكون سبباً لتولد الحرارة وحدوث طفحات جلدية ما بين الآيتين والمخذدين وهذه الطفحات تعرف عند العامة بالتسميط ومن أيسر مضارها أنها تزعج الطفل وتؤلمه وأحياناً تحول إلى مرض جلدي يعطى شفاوه

اما طريقة عمل الحفاظ فهي ان تطوى قطعة النسيج على زواياها حتى تصير في الهيئة التي تراها في (شكل ١٢) ثم يشد طرفاها العلويان إلى وسط الطفل



(ش ١٢) حفاظ مزدوج

ويقرب الطرف الأسفل اليهما من بين المخذدين ويثبت الجميع بدبوس افرنكي (مبشك) والأفضل ان تترك حواشي الحفاظ على قصتها من غير ان تكفي ثلاثة تضيق على الجلد فو لم الطفل

والبعض يستعملون في وسط الحفاظ حفاظاً آخر صغيراً مربعاً لمنع نفوذ المواد الفضلية الى الثياب كما ترى في الشكل والاولى تركه لانه يجعل الحفاظ سميكاً فيولد الحرارة على نحو ما نقدم شرحه في الكلام على حفاظ المشمع ويجب ان يغسل الحفاظ بالماء والصابون حلاً يتلوث بالفضلات وينشر في

الشمس والهواء طول النهار واذا كان نسيج الحفاظ جديداً فيجب ان يغسل مراراً حتى يلين ويسهل على جلد الاطفال البضة تحمله

**(الجوارب - الكلاست)** - خير الجوارب للاطفال ما كان شغل الصنارة من الحرير او الصوف الناعم الاين النسيج بحسب الهيئة التي تراها في (شكل ١٣) ومن الضروري ان تكون ساق الجوارب واصلة على الاقل الى نصف قبة الرجل ويربط من عند الخالخل بشرط حرير قليل العرض او بخيط صوف يعمل بالصنارة على هيئة جديلة دقيقة فيحفظ الجوارب من السقوط من قدمي الطفل



ونفس جوارب الصوف بالماء السخن بمد (ش ١٣)

تدوير الصابون فيه وعند نشرها تدخل قبها قطعة جورب شغل الصنارة خشب على شكلها وتترك حتى تشف فتخرج كأنها جديدة

**(القميص)** - في (شكل ١٤) صورة القميص الذي يلبسه الطفل على الجلد ويأخذ من الصوف أو القطن على نحو ما اسلفنا ذكره في الكلام على أنواع الانسجة التي توافق الاطفال في جميع فصول السنة . وينبغي أن يكون



(ش ١٤)

قميص تختاني فانا

القميص طويلاً يغطي الورك ومفتوحاً من الامام بحيث يمكن الاباسه للطفل من غير تقليله . ويجب ان تكون ازراره مسطحة وقبته عالية وكه طويلاً ينطبق على الرسم اي مفصل اليد . واذا كان القميص يضيق بعد غسله كا هي الحال في الانسجة الصوفية فيجب ان يغسل اوسع وأطول من القياس المطلوب ويكتفى ان تكون سعة الصدر

(القسم الاعلى من القميص) نحو ١٥ قيراطاً من حين الولادة الى الشهر اذئث من العمر ثم يزداد عرضه وطوله تباعاً لتفتضي الحال . وقد بسطنا الكلام على غسل الانسجة الصوفية في أوائل هذا الفصل فليراجع في محله

﴿التنورة والسلطة﴾ - تُخَذِّ الأولى من الغانلاً البيضاء الناعمة في الشتاء ومن الملصينا في الصيف من غير أكمام ويكون لها من الوراء فتحة صغيرة وزران أو عروة لاجل ربطها حول العنق

واما الساطه فتُخَذِّ من الكبرك او نسيج اخر صيفي حسب ذوق الام وتكون ذات اكمام طويلة ومفتوحة من الوراء على طولها لترتبط بالعرى

ويجب ان لا يزيد طول التنورة والسلطة على قدmi الطفل اكثر من ٦ - ١٠ قراريط وما زاد على ذلك فهو مضر بالصحة لانه يعيق الطفل عن الحركة حسماً بهوى . ويسعد من باب الاقتصاد ان تُغَيَّبَ التنورة من جانبها وطرفها الاسفل وكذلك السلطة حتى يُسْلَمَ توسيعها وتطويها عندما يكبر الطفل

﴿الكبوت والشال﴾ - الكبوت هو اللباس الذي يلبسه الطفل فوق الثياب كله ولا يجوز استعماله الا خارج البيت في أيام البرد . ويكون في الشتاء من الصوف الايض الناعم وفي الصيف من الكتان اي التيل . وأما الشال فيكون من الكشمير او الصوف وبلقى على الطفل عند خروجه من البيت

وبلبس الطفل القميص لصف البدن واذا كان جلدء لا يتحمل مس الصوف فيليس تحته قيس شاش او حرير على نحو ما اسلفنا ذكره في اول هذا الفصل ثم بلبس التنورة وفوقها الساطة وفوق الساطة الكبوت

﴿ثياب النوم﴾ - تتألف ثياب النوم من حزام وحافظة وقميص تهاناني وفوق الكل قيس النوم يلبسه الطفل في الليل عوضاً عن ثياب النهار ويندل كلما لحقه شيء من الطوبه والمواد الفضليه . وينبغي ان يكون قيس النوم من الصوف في الشتاء او نسيج الملصينا في الصيف ويكون مفتوحاً من الخلف على زي التنورة ولكن أطول منها بحيث يمكن ان يربط من طرفه من غير ان يمنع الطفل




(١٥ ش)

من تحر يركب رجليه على نحو مانرى في (شكل ١٥) ﴿الطاقة﴾ - او الفنسوة تُخَذِّ من الصوف في الشتاء وال الكبرك او الحرير في الصيف . ويجب ان تغطي الاذنين من جانبيها في أيام البرد ويكون زناها من الحرير الناعم الذين حذر من ان يحيث بجلد العنق في سلمنه والافضل ان لا يعود الطفل ليس الطاقة في البيت ولا سيما اذا كان رأسه مكسواً بالشعر فإنه يقوم مقامها في دفع البرد والرطوبة . واذا عوًد لبسها ف تكون من نسيج خفيف كالكبرك او الشاش وما أشبه ذلك . ومن اللازم اذا كان الطفل يصاب بالزكام من تعرضه للهواء ان يغطى وجهه بمنديل حرير او شاش رقيق عند خروجه من البيت

﴿كيفية الباس الطفل ثيابه﴾ - بعد استحمام المولود حدثاً وتنشيف بدنه يضع على ظهره في حضن الداية او المرأة التي تشهده وعلى حضنها الحفاظ وحزام البطن بحيث يكون الاول ممدوداً تحت مقعدته واثناني تحت ظهره حتى يسهل لهما من غير ثقل . وفي أول الامر تلف السرة بقطن مطهر بالسائليك يطلب من أية الاجزاخات الاصولية وترتبط بخط حرير نظيف وتوضع على الجانب الايسر من البطن . ثم يلف الحزام حول وسط الطفل ويكون بدبوس افرينيكي ويمثل ذلك الحفاظ واذا كان الحزام شغل التصارة فيدخل من عند القدمين . ويتلو ذلك لبس الجوارب ثم القميص فالتنورة فالسلطة ويجوز ان تدخل اكمام التنورة والسلطة بعضها في بعض وتلبساً لالطفل دفة واحدة وذلك في أسرع ما يمكن من الوقت ويجب ان تنزع لفافة السرة قبل الاستحمام واذا وجدت مرطبة او كريهة الرائحة فترش بعد نهاية الاستحمام وتنشيف البدن بسحوق حاضن البوريك ويذار على ذلك الى ان تجف السرة وتسقط في اليوم الرابع او الخامس بعد الولادة . واذا كان الطفل يغسل يمسح بدنـه بالاسفتحة عوضاً عن التغطيس في الماء تركـ


السرة حتى تجف وتسقط ولا تغير لغافتها الا اذا ترطبت او اوكرحت رائتها وكل ملابزم للطفل من الملابس الطويلة ستة قصان وأربع تنورات فانلا وأربع تنورات كبيرة وثانية ساطات وستة جوارب وأربع دزينات حفاظات وستة قصان نوم وشلان كشمير وبكتوت وغطا للوجه وما زاد عن ذلك فهو سراف وعندما يصير عمر الطفل ستة أشهر فلا بأس ان تستبدل اثياب الطويلة بثياب قصيرة لا يزيد طولها على الكعبين (الكاحلين) وتستبدل الجوارب القصيرة أيضاً بجوارب أخرى طويلة تغطي الركبة وترتبط بالقميص او بشريط حرير ناعم (سروال الفخذين) - يجوز ان يستعاض عن الجوارب الطويلة بسروال من الصوف الفانلا او نسيج الفصلنيا يفضل بفخذين منفصلين على نحو ما ترى في (شكل ١٦) ومن الضروري ان يكون السروال طويلاً ينطبق على الكعبين (الكاحلين) ويربط بطرف القميص بالعرى وهو أفضل من الجوارب الطويلة لانه أدق وابقى على الدمع والفصل الا انه لا يغنى الطفل عن الجوارب القصيرة ولا سيما في الشتاء



(ش ١٦) سروال بفخذين

«حالة الحفاظ» - قلنا ان الحفاظ يجب ان يمكن حول وسط الطفل بدبوس افرنكي . على انه من بعد الشهر السادس تكثر حركة الطفل وهو الزمن الذي يشرع فيه بالعبو والوقوف فيقلق الحفاظ ويسقط من وسطه وبناء على ذلك يجب ان يربط بالحالة التي صورتها في (شكل ١٧) يلبسها الطفل فوق القميص الملافق للبدن ولا يجوز ابسها على الجلد مباشرة لئلا تحدث به فتلخمه وهذه الحالة مؤلفة من زرار او حزام من المصلينا عرضه نحو ثلاثة قراريط وله زر وعروة من الامام لاجل ربطه حول وسط الطفل . وعلاقتان كبيرتان من شريط حرير مطاط (استك) لاجل تعليقه بها بالكتفين . وله أيضاً علاقتان

صغيرتان الواحدة خلف الزر من الامام والثانية في وسطه من الخلف لاجل ربط الحفاظ بها بدبوس افرنكي او بالعرى . وهذه الحالة رخيصة الثمن ولا يصعب عملها او تقليدها على من كان عندها اقل المام بالاشغال اليدوية




(ش ١٧) حالة الحفاظ

«الحذاء او الجزمة» - تترن الطفل على لبس الحذاء حالاً يتدبر بليس الثياب القصيرة او يصير قادرًا على الحبو او الوقوف على قدميه . ومن الضروري ان يكون الحذاء كله في بدء الامر أبي بده ونعمله من السخنيان الایض الماعم ولا بأس ان يكون النعل بعد ذلك من السخنيان السميكة بشرط ان لا يكون قاسياً وتفيلاً يعيق الطفل عن الجري

ويجب ان يكون الحذاء من غير كعب وعريضاً من رأسه لئلا يضغط الاصابع ويعصرها وان يكون متوافتاً للقدم لواسعاً ولا ضيقاً يغطي الكعبين (الكاحلين) ويربط بطرف القميص بالعرى والشريط من غير ازار . وعندما يصير الولد قادرًا على الجري في الطرقات العمومية فيجب ان يزاد سماك النعل لوقاية القدمين مما عسى ان تسببه خشونة الطريق من الفسر لها بقى أمر مهم جداً يجب ان لا تغفل ذكره وهو ان يكون الحذاء ميناً ويساراً . ومن الغرابة انك لا ترى في أحذية الاطفال التي تباع في الاسواق فرقاً بين حذاء الرجل اليمنى والجل اليسرى كا هي الحال في أحذية الرجال مع ان الفرق واضح بين قدمي الطفل اليمنى واليسرى كما ترى في (شكل ١٨) فإنه يمثل اخْصَ القدم اليمنى من طفل عمره ٣ أشهر وقد اخذت الصورة في ثلاثة ارباع حجم القدم الطبيعي .

ولها خصرة تيزّها عن القدم اليسرى الا ان اقدام الاطفال تكون في الغالب سميكة ومتلئة ولذلك فلا تظهر الخصرة فيها واضحة بجلاء تام . وامل هذا هو السبب الذي يجعل صانعي الاخذية يغفلون هذا الامر المهم الذي توقف عليه راحة الاطفال في الجري وسلامة اقدامهم من التشوه




(ش ١٩) أخص القدم اليمني  
في ثلاثة أرباع حجمها الطبيعي  
محيط القدم لقياس التعل

اما الطريقة التي أخذت بها الصورة المذكورة فهي ان يدهن اخص القدم بسود المدخنة او القنديل بعد تدويبه بالتربيتنيا وزيت الزيتون ثم تطبعها على قطعة ورق نشاف (عباد الشمس) وهي ملصقة على قطعة خشب أو كرتون سميك والصورة التي بجانبها (شكل ١٩) تثل محيط اخص القدم او القیام الذي يجب ان يفصل عليه نعل الحذاء حتى يوافق القدم . وعلى الوالدين ان يوصوا عاملی الاخذية ببراعة القوانین التي تقدم شرحها لكي يكون الحذاء موافقاً للقدم لأن في ذلك راحة للطفل وسلامة لقدميه من البواعث التي تنشأ عن استعمال الحذاء الغير المواقف

وكثيراً ما تبرد اقدام الاطفال على اثر استعمال الحذاء والجوارب فتعالج بفركها براحة اليدين وتوسيع الحذاء قليلاً من عند الكعبين (الكاحلين) وأخص القدمين

«صدرة لاستقبال اللعب» .. تُخذل من الكتان وتبطن بنسج الشمع منها لغود اللعب الى الثياب وهي على هيئة قطعة مستديرة تغطي القسم الاعلى من الصدر وترتبط حول العنق لاستقبال اللعب . ويحسن ان يكون للطفل منشفة اطول من الصدرة المذكورة يستعملها في وقت الطعام حالما يصير قادرًا على الجلوس الى المائدة مع والديه



«مريل الحبو» - ترى في (شكل ٢)  
صورة مريل على شكل كيس نفريما يلبس للطفل فوق ثيابه لوقايته من التبرع والتعرق في أثناء الحبو . وهذا المريل مسدود من قاعدته وله فتحتان لقدمين تبعد الواحدة عن الأخرى نحو ١٥ قيراطاً واسلام طوله وفتحة صغيرة من الخلف وصدرة متصلة به عند وسط الطفل . وفي زمن الحر يجب ان

تفصل الصدرة المذكورة عن المريل ويعلق بالكتفين بالحالة (شكل ١٧)

ومن قوانین الصحة ان تغطي الثياب جميع أجزاء البدن ماعدا الوجه واطراف اليدين . وفي بلاد الافرنج عادة سجدة سرى سماها الى بلادنا وهي تعرية ذراعي الولد وساقيه بحججة ان تعرى هذه الاعضاء للهواء يقويها وهي حجة واهنة ومن ايسير مضارها ان البرد اذا مس ذراعي الولد امتد تأثيره الى صدره فكان في خطر من الامراض الصدرية . وهكذا يقال عن الساقين فلن البرد يسرى منها الى البطن فبسبب الاسهال

على انه اذا كان الحر شديداً فلا بأس ان يكون لباس الذراعين من نسيج

الامراض العصبية وكثيراً ما يسرى تأثير البرد من السافين الى البطن فيحدث  
الاسهال كما تقدم ولا فرق في ذلك ان كان الوقت شتاء او صيفاً لان البرد يؤثر  
في أجسام الاولاد في أي زمان اتفق

﴿ حذاء كبار الاولاد ﴾ - خير الاخذية اكبار الاولاد ما كانت نعماها من الجلد الثخين وكما يهابها متوسطة في علوها ودرؤوها محكمة الالتصاق ولا سيا في الشتاء حتى لا تفند لها الرطوبة . وبما ان الاولاد يميلون بالطبع الى اللعب في المياه والجري على الشاطئ والجليد فيجب ان تكون أحذيةهم من الكوتتشوك لوقاية اقدامهم من مضار الرطوبة والبرد وما بقي من التدابير الصحيحة للاطفال والولاد تتركه الى حذافة الام وذوقها

لُفْصَلُ الْخَامِسُ

غذاء الاطفال وطعامهم وتدبير صحة المرض

بن الام — ترتيب اوقات الرضاعة — كيفية الارضاع — تدبير صحة المرض  
تدبير الشדי وحلمه — الفطام القانوني — الفطام الفجائي — الفطام الباكر  
العلم الاصطناعي — تعطير حليب البقر — الحلمة الصناعية — الحليب الجمد —  
الطعام الحلالاني — ماء زلال البيض — شاي لم العجل — الطعام الممضوم — الطعام  
الثاني — الطعام بعد الفطام — الاطعمة الممنوعة

لبن الام ) - غذاء الاطفال المابن وأفضله لبن الام ويتلوه في الفائدة  
لبن المرضع ثم لبن الحيوان وهو التغذية الصناعية . ولبن الام لا يقوم مقامه غذاء  
آخر لا طبيعي ولا اصطناعي وهو أفضل غذاء للاطفال ويكتفي ومحده لشکوين  
اعضائهم وإنما أبدانهم  
وقد تبين من الاحصاءات العديدة ان الموت بين الاطفال الذين يغذون

رقيق ومع ذلك فإنه يجب الاحتراس التام من مس البرد لأنه يضر بالصحة في اي زمان اتفق . وفي الجملة علينا ان نراعي قوانين الصحة في الصغار كافى الكبار فندفع البرد عنهم بالياب الدافئة والحر بها يلائم أجسامهم من الانسجة اللينة الباردة كا لفقط واتيل وما شاكل ذلك مما نقدم ذكره

﴿الوان الشاب﴾ - جرت عادة اكثرا الناس ان يلبسوا أولادهم ثياباً بيضاء اللون في الصيف والشتاء الى السنة الثانية او الثالثة من العمر . على انه اذا أرادت الام ان تلبس طفلها حسب ذوقها فالافضل ان يكون لون الشاب أبيض في الفصول الحارة سواء كان نسيجها من الصوف الخفيف أو الكتان والقطن والحرير لأن اللون الاييض يدفع الحرارة عن الجسم فهو أفضل الألوان في زمن الحر . ولا ينافي ان لكل لون من الألوان مزية من هذا القبيل فرقه عن الآخر . فان اللون الاسود مثلاً اكثرا حرارة من اللون الاييض بـرتين . وحرارة الازرق مثل حرارة الاسود . وأما الاحمر فتوسط بين الاسود والاييض وهو أقل حرارة من الاخضر وأكثر من الاصفر أي ان حرارة الاخضر أشد وحرارة الاصفر أخف من حرارة اللون الاحمر فيجب ان تكون الام على بصيرة من انتقاء الالوان الملائمة لا يدان اطفالها بمحبس الفصول

﴿ تغيير اللباس ﴾ - لا بد أخيراً من تغيير لباس الاولاد في الزي وهذا التغيير يبتدئ من السنة الثالثة والرابعة فصاعداً فتتغير الاشياء على اللباس الذي رسمناه للأطفال وأما الذكر فيليس طربوشأ وسررواً وقفطاناً على الزي الشرقي القديم او قبعة وبنطلوناً قصيرأ وجوارب طويلة نفطي الركبة بحسب الزي الحديث . وثم عادة سمعجة اقتبسها الشرقيون عن الافرنج . وهي انهم يلبسون الاولاد جوارب قصيرة لا يتتجاوز طولها متصف ساق الرجل ويتركون الركبة عارية لما لا نعلم له سبباً شوئي حب الزي وتقليد الافرنج في عاداتهم وأخلاقهم وهو ما لا يخلو في غالب الاحيان من الفخر على الصنعة فان الولد اذا سقط وكانت ركبته عارية من اللباس تسخن جلدته وأنسجت بشرته فضلاً عن ان تعرض الساقين للهواء مما يسبب

بالصناعة يزيد كثيراً جداً على الذين يغدون بابن الثدي . ولذلك يطلب من الام ان ترضع ولدها من ثديها عشرة اشهر على الاقل ولا يجوز ان تختلف عن ارضاعه الا مانع في صحتها وبنيتها . ولا يخفى ان الرضاع يعين على افراز الابن من الثدي فلا يصاب بالاحتقان الذي يفضي احياناً الى تكثيف الحراريم ومعالجتها بالجراحة . وكذلك يعين على رد الرحم الى أصلها وقوتها فلا يداهمها الحمل على ضعف يوقيها في علل يصعب شفاؤها وهذا السبب تكثر الامراض في النساء الواتي لا يرضعن اطفالهن

وفي الغالب ينزل الرضيع في الثلاثاء أيام الاولى من ولادته لان كل ما يرضعه في ذلك الوقت هو مقدار صغير من سائل مائي قليل الفداء يسمى الصمع ولتكن يسترد ما خسره عند اليوم السابع . وهذا الصمع ضروري للمولود حديثاً لانه يلين الامعاء وينظفها من القانط الجنيني

وأحياناً يمنع الطفل عن الرضاع في بدء الامر فتسقيه أممه ماء محلى . بالسكر أو خبرضاً منقوعاً بماء الزهر يوضع في قطعة شاش ويصها كاملاً حلة الثدي وهذا الاصطلاح مصر جدعاً بصحبة الرضيع لانه يجلب القيء والاسهال . على انه لا يأس اذا دهنت الحلة في مثل هذه الاحوال بادرة حلوة لترغيب الطفل في الرضاع واذا لم تقدر هذه الواسطة فيغذى بلبن البقر ممزوجاً بقدر ما فاترها ومحلى بسكر اللبن (انظر الطعام الاصطناعي) بتناوله الرضيع بالملعقة او برضعه من الزجاجة نحو ثلاثة مرات في اليوم الى ان يتمرن على الرضاع من الثدي فيستغنى عنده عن الطعام الاصطناعي

﴿ترتيب أوقات الطعام﴾ - يبدأ برضاع الطفل بعد ان تستريح الام من عناه الخاض نحو ٨ - ١٢ ساعة . ولا بد من ارضاعه في أوقات مخصوصة فيرضع في السنة الأولى كل ساعتين ونصف مرة واحدة في اليوم ومن ذلك الوقت الى الطعام كل ٣ - ٤ ساعات مرة وقد جرت عادة الامهات ان يرضعن الطفل كلما بكي ظناً منها انه يبكي عن

جوع مع ان البكاء لا يدل دائمًا على الجوع وحده لان الطفل يبكي عن عطش أو مغص أو وجع في المعدة . ولكل من ذلك دلائل نذكر منها ما يأتي : -  
أولاً : (الجوع) يدل عليه البكاء بعد قيام الطفل من نوم هادي وسكته حالما يقع نظره على الثدي أو يشعر بالحملة في فمه  
ثانياً : (العطش) من الواضح ان الطفل الذي يرضع كل خمس دقائق ولا يزال يبكي لا يد من أن يكون محتاجاً الى شيء آخر غير اللبن . ولا يأس اذا كان يسقي عندئذ ملعقة صغيرة من الماء الفاتر على سبيل التجربة فان افادته تكرر من حين الى آخر

ثالثاً : (المغص) من علاماته ان الطفل يصرخ بخفة صراخاً حاداً في فترات متقطعة . ويزرق وجهه ويتتفتح بطنه وتبرد رجلاه ويداه ويطوي ساقيه فوق بطنه ويرفس بهما . ثم تزول هذه الاعراض كما جاءت بخفة على اثر التجشؤ أو البراز أو الارياح المعوية

رابعاً : (وجع المعدة) يدل عليه القرف وسخونة الجلد ورائحة التنفس الكريهة . وهذه الاعراض تهيج البكاء في الطفل فتظن امه انه يبكي عن جوع فترضعه فيسكن لان ابن اثدي فاتر فيلطف وجع المعدة موتنماً ولكن لا يليث ان يعود الى البكاء ثانية فتحاول الام استكانة بالرضاع ايضاً وهو خطأ عظيم لان ادخال الطعام على الطعام يزيد الاجاع والصراخ ويفضي بالطفل الى سوء الهضم المعدي والمعوي فضلاً عن ان كثرة الرضاع تهيج حلة الثدي وتشققها وربما أفضت الحال الى تكثيف الحراريم ومعالجتها بالجراحة

﴿كيفية ارضاع الطفل﴾ - ترضع الام طفلها في مدة النفاس وهي نائمة او مائلة على جنبها قليلاً وداعمة ظهرها بالوسائل من غير ان تتعني الى الامام . وبعد انتهاء طور النفاس ترضعه وهي قاعدة ومنحنية قليلاً الى الامام بطريقة تتجه بها الحلة ناحية فم الرضيع . وفي اثناء الرضاع يجب ان تفصل الثدي بأصبعيها (السبابة والوسطى) عن أنف الطفل ولا ترضعه أكثر من ١٠ - ١٥ دقيقة كل

مرة . ويخترس من ترك الحلمة في فه وهو نائم

وقد يدر الثدي بكثرة في أثناء الرضاع فيزوج الرضع في الباع . في مثل هذه الاحوال يجب ان يضغط على قاعدة الحلمة ضغطاً خفيناً بين اصبعي المرضع حتى لا ينزل منه الى فم الرضيع الا بقدر ما يوافق الحالة . واذا كان الادرار شحيحة او بطيئة فيزيد بعصر الثدي من قاعدة

ويغلب ان يكون اللبن غزيرآ في أول الامر فيتتص منه الطفل اكثراً من حاجته فتضيق عنه المعدة فيستفرغه الا ان هذا النوع من الاستفراغ أو القيء هو طبيعي لا يدل على مرض ولا يجب القلق بسببه الا اذا كانت كريمه الرائحة وظهرت على وجه الطفل علامات الضعف والانحطاط . يعالج بتقليل الرضاع وترتيب أوقاته على نحو ما أسلفنا بيانه

» تدبير صحة المرضع « - على الام المرضع ان تعتني بصحتها لحفظ صحة طفلها فتجعل طعامها في مدة النفاس وفقاً لارشاد الطبيب . وعندما يتضمن طور النفاس وتصير قادرة على القيام بأشغال البيت فلا يأس من ان تأكل ما تشاء بشرط ان يكون الاكل مغذيآ وسهل الهضم . ويخترس من اكل البصل والكرنب (الملغوف) والقرنبيط لأنها تؤثر في اللبن فينفر الرضيع من طعمها . وكذلك يجب الاحتراس التام من ارضاخ الطفل في ساعة الخوف والغم وسائل الانفعالات النفسانية لثلاً بنقطع افراز اللبن او يتغير تغيراً يجلب الضرر على صحة الطفل ان لم يكن سبباً لهلاكه

في ساعة الحزن يجب ان يفرغ لبن الثدي بالاصاصه (شكل ٢) ويغذى الرضيع بالزجاجة الى ان تزول تلك الانفعالات النفسانية فيرد الى الرضاع من الثدي

» تدبير حلمة الثدي « - تكلمنا في القسم الاول من هذا الكتاب على تدبير حلمة الثدي قبل الولادة ومع كل ما ثقمن ذكره من وسائل الوقاية فإنه كثيراً ما تبقى الحلمة غائبة فيصعب على الطفل ان يتناولها بين شفتيه

ولذلك يجب ان تترك عليها الحلمة الصناعية (شكل ٢١) وهي أفضل الحلمات وأصلحها للرضاعة . وقد يخشى ان تتشقق حلمة الثدي ولا سيما في الباكر (ذوات الولد الاول) فيتدبرك تتشققها جيداً بقطعة نسيج ناعم بعد كل ارضاع ودهنهما بزيت الزيتون نحو أسبوعين . واذا تسلخت وخيف عليها من التشقق والتقرح فتعالج برم الباروموت (ملحق ٧٤) تدهن به الحلمة وتلف بقطعة شاش بوربكي أي مطهر بمحامض البوريك حتى لا تتحتك بالثياب فتشريح ويبيطي شفاوها . وقبل ارضاع الطفل ينزع المرهم عن الحلمة واذا بقي شيء فلا خوف منه على الرضيع . وأحياناً تتألم المرضع من الاضارع بتشعین بالحلمة (شكل ٢١) كما نقدم

وكثيراً ما يختنقن البن في الثدي وعندئذ يفرغ بالآلية الماصة (شكل ٢ صفحة ٦) واذا تعذر وجودها فيرضم الثدي أحد الناس ثم يعالجه بدنهه بزيت الزيتون سخناً مبتدئاً من القاعدة الى الحلمة وبشرب السوائل كالبن والرق والماء والشاي وبالسائل الحقيقة كسترات المناز يا والمياه المعدنية يؤخذ من الاول اي المناز يا نحو سجراماً ومن الثاني ملء كابة صغيرة في الصباح قبل الطعام . ومن جملة الوسائل النافعة ان يرفع الثدي برباط عريض يعلق بالعنق واذا افضلت الحال الى الانتهاب يشاور الطبيب

» الفطام القانوني « - هو انفصال الطفل عن ثدي امه وتغذيته بالصناعة ويجب قبل الفطام بأربعة أسابيع ان يتدرج الطفل على الرضاع من الزجاجة على الطريقة الآتية : -

في الأسبوع الاول يغذى مرة واحدة بالصناعة وست مرات بلبن الثدي وفي الأسبوع الثاني ٢ و٣ والثالث ٤ و٥ والرابع ٦ و٧ الى ان تتحصر التغذية كلها بالطعام الصناعي

وقد يصاب القطط بانفاس والاسهال بسبب تغير الطعام فيرد عند ذلك الى الثدي ولا يغذى بالصناعة الا مرة واحدة أو أكثر تبعاً لمتضي الحال حتى اذا تحسن حاله يعود بالتدرج الى الرضاع من الزجاجة (انظر الطعام الاصطناعي) اما المدة التي يجب ان يرضع الطفل بها من الثدي فتختلف من ثانية الى عشرة اشهر او سنة اذا كانت الام مرضع قوية الجسم وطفلها آخذها في التغذية . وأما بعد السنة فلا يفيد لبن الثدي شيئاً لانه يصير بعد ذلك الميعاد قليل الغذاء فتسوء صحة الطفل من التغذية به كما هي الحال في الاطفال الذين يرضعون من امهاتهم اكثر من سنة في هذه البلاد

وينبغي ان يكون الزمان موافقاً للفطام فيمنع في طور التسنين وخصوصاً في فصل الصيف لأن الحرارة تفسد لبن الزجاجة فيصاب الطفل بالاسهال . على انه اذا كان لا بد من الفطام لسبب تفضيه حالة المرضع او رضيعها فالاولى ان يذهب به الى الاماكن الباردة في الجبال والحقول الندية الهواء والماء

**»(الفطام البجائي)** - لا يجوز ان ينقطع الطفل بفترة أى قبل ان يتدرج على التغذية بالصناعة لأن الانتقال من طعام الى طعام آخر دفعه واحدة يؤثر على هضم الرضيع تأثيراً مضرياً بصحبه ولا سيما اذا كانت المعدة لم تبلغ قام القوة . وزد على ذلك انه يخشى على الثدي من الاحتقان لتجمع اللبن فيه وربما تنتهي الحال بالحراريج كما تقدم

**»(الفطام الباكر)** - هو انفصال الطفل عن ثدي امه قبل الميعاد القانوني ولا يجوز الا في الاحوال الآتية :-

**أولاً :** (المرض) كالسل والزهري والحيثنة والخمرة وغيرها من العلل الناهكة

**ثانياً :** (الحيض) مع كونه يغير صفات اللبن ويولد في نفس الرضيع كراهة له فلا يؤخذ دليلاً على وجوب الفطام قبل او انه لأن الديم قد يظهر في طوز الرضاع مرة واحدة ثم ينقطع او يعود مرة أخرى أو أكثر بعد مدة طويلة

ولا يخشى منه على صحة الرضيع الا متى صار قابويناً وعند ذلك فقط يجب الاقطاع عن الرضاع  
**ثالثاً :** (الحمل) وان يكن الاطباء على خلاف من حيث تأثيره على الطفل فالمشهور ان الحمل يغير صفات اللبن تغيراً يجلب الضرر على صحة الرضيع فضلاً عن انه يقل جداً في أثناء الحمل فتفسر الام عن تغذية الجنين والطفل معاً في وقت واحد . وكثيراً ما ينقطع افراز اللبن في مدة الحمل  
**رابعاً :** (حالة الرضيع) وهي من الاسباب التي تدعوا الى الفطام الباكر فان كانت المرضع صحية الجسم لا مرض فيها ولا علة تهددها وكان الرضيع ضعيفاً مخط القوى وبطيء النمو ثبت للحال ان لبن امه ناقص فلا يواافقه ولذلك يجب ان ينقطم باكراً ويغذى بالصناعة او ان يسد النقص الموجود في اللبن ليصدر صالحاً للرضاع . وهذا النقص اما ان يكون في كمية اللبن او في مواده المغذية . وزراعة الاياصح نذكر شيئاً عن مرکبات اللبن لكي يعرف القارئ ماذا تعنى بكلمة اللبن ومواده المغذية فنقول

ان لبن الثدي مؤلف من مواد مائية ومواد أخرى جامدة يقال لها المواد المغذية كالملح والسكر والزلال الخ (انظر جدول مرکبات اللبن في الطعام الاصطناعي فيما يلي من هذا الفصل) ويجب ان تكون المواد المائية بنسبة ٨٧ - ٨٨ بالمائة والمواد المغذية بنسبة ١٢ - ١٣ بالمائة . فان زادت أو نقصت هذه النسبة فالبن لا يواافق الرضيع . وقد يمكننا ان نعرف ذلك من العلامات الآتية وهي : اذا كان الماء في اللبن قليلاً والمواد المغذية كاملة فيدل عليه رضاع الطفل من الثدي بشوق زائد واجتهاده في مص الحلمة ثم لا يلبث ان يتركها ويصرخ صراخ الغضب وعدم القناعة والرضي . والعلاج في هذه الحال هو ان تتناول المرضع من الاطعمة السائلة كالمilk والبن والشوكولاتة والشوربة والشاي بكثرة وأما اذا كان الماء في اللبن كثيراً والمواد المغذية قليلة أي ناقصة في مثل هذه الحال يعص الطفل من الثدي ببرودة ثم لا يلبث قليلاً حتى ينام . والعلاج


في هذه الحال يقوم بقصير فسحات الرضاع وتقليل الاطعمة المائة وكل الحم والبيض وسائر المغذيات الجامدة في هذه الاحوال فقط اي اذا كانت المرض مصابة بأحد الامراض التي ذكرناها او كانت في حالة الحم او في حالة الحمل او كان لبنتها غير صالح لتغذية الرضيع وجب الانقطاع عن الرضاعة من الثدي والتغول على الفطام الباكر اذا لم يكن في لوس الاسعنة بمرض مؤجرة . وفي ما خلا ذلك يجب على الام ان ترضع ولدها من ثديها لان الرضاع وظيفة طبيعية وابطال هذه الوظيفة بالوسائل الجبرية قد يحدث في الاعضاء التناسلية ضرراً جسرياً فتجني المرأة التعب والمشقة من حيث حاوالت ان تطلب الصحة والراحة . وعلى كل حال يجب ان يعتمد على العلیب في هذا الامر ومن واجباته ان يدقن ولا يتسرع بالحكم قبل ان يقف على الموضع الموجبة للنفطام الباكر سواه كانت هذه الموضع من الام او من الطفل « الطعام الاصطناعي » -- ابنا فيما سلف من الكلام الفوائد الناشئة عن الرضاع من الشدي والمضار التي تحدث من تركه والاعتداد على غيره من انواع الغذاء . على انه من بعد الشهر العاشر او أكثر الى قام السنة الاولى من العمر تقل فائدة لبن الثدي وذاك لتناقص المواد المغذية فيه من ذلك الوقت فصاعداً . ولهذا السبب تصبح التغذية بالصناعة أمر اوجباً لا غنى عنه لاغاثة الطفل وتنمية جسمه . والبعض من النساء يرضعن الطفل نحو سنتين او ثلاث سنين ولا يغاظنه حتى « يشبع من حليب امه » وهو اصلاح فاسد لان الاعتداد على لبن الثدي اكثر من سنة واحدة يفضي الى سوء التغذية ويمد الطفل الى مرض الكساح . ومن علامات سوء التغذية الاسهال وتأخر نبت الاسنان

ينبغي ان يكون الطعام الاصطناعي سهل الانهضام لان التغذية لا تقوم بما يأكله الطفل من الطعام بل بما يهضم منه في معدته ويتحول الى دم يتغذى به جسمه . وبناء على ذلك يجب ان يكون الطعام موافقاً لعمر الطفل وقوته معدته على الهضم حتى تتم التغذية وينمو وينتعم وبالتألي ينجو من الامراض التي

تهدد الاطفال على اثر انفصالهم عن اثداء امهاتهم وتركمهم وشأنهم با تكون ما تصل اليه ابدائهم من الاطعمة الثقيلة على المعدة . على ان البعض منهم با تكون ما يقدم لهم من الاطعمة ولا يلحق بصحتهم ضرر . والبعض الآخر لا تصح أجسامهم ولا تستقيم صحتهم مالم يكن طعامهم ملائماً لهم . وهذا الاختلاف بين الاطفال يستوجب مزيد الاهتمام بانتقاء الغذاء الموافق لعمر الفطيم وحالة معدته من القوة والاستعداد لهضم الطعام وذلك ببراءة القوانين الآتية :

اولاً : كمية الطعام . ثانياً : انتقاء الطعام الموافق . ثالثاً : مميزات الاطفال  
اولاً : كمية الطعام

تختلف كمية الطعام التي يحتاج اليها الفطيم باختلاف سنها وشهيتها وعلى كل حال يجب ان لا يطعم اكثر مما تسع معدته ثلاثة ينقياً او ينزل الى الاماء غير منهضم ويبدل عليه البراز المتقطع ( مفرقط ) وهو علامة سوء الهضم الذي يجلب الاسهال والهزال



(ش ٢٢) معدة الطفل عند الولادة بحجمها الطبيعي

ولا يخفى ان معدة الطفل المولود حديثاً لاتسع اكثر من ملعقتين كبيرتين وفي ( شكل ٢٢ ) رسم المعدة عند الولادة فمن المعاقة اذ ان يسمح للطفل بأن يرضع من الزجاجة او من ثدي امه اكثر مما تحمله معدته . وقد بحث الاطباء

عن حجم المعدة في اطوار مختلفة من الحياة فعرفوا مقدار اللبن الذي تسعه في كل طور من اطوار العمر وجعلوا للرضاعة قانوناً لصيانته الرضيع من مضار التغذية غير المرتبة كالتالي ذلك في الجدول الآتي للدكتور روش الامير كاني نقاشه من كتاب له في أمراض الاطفال وهو يتضمن عدد نوبات الرضاع والمقدار اللازم في كل نوبة واجمال ما يتناوله الرضيع في اليوم الواحد

### قانون الرضاع العام

| العمر                     | فسيحات الرضاع | عدد نوبات الرضاع في كل نوبة | المقدار الذي يرضعه في ٢٤ ساعة | المقدار الذي يرضعه الطفل في ٢٤ ساعة |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| الاسبوع الاول             | ساعتان        | ١٠                          | فتحان صغير                    | ١٠ فناجين                           |
| من الاسبوع ٦ - ١          | ساعتان ونصف   | ٨                           | فتحان ونصف الى فنجانين        | ١٢ - ١٦ فنجان                       |
| من الاسبوع ٦ - ٥ من الشهر | ٧ - ٦ ساعات   | ٧ - ٦                       | ٣ فناجين                      | ٢٤ - ١٨ *                           |
| الشهر السادس              | ٦             | ٦                           | ٣                             | ٣٦                                  |
| العاشر                    | ٥ - ٤ ساعات   | ٥                           | ٨                             | ٤٠                                  |

وهذا القانون يوافق الرضاع من الثدي والزجاجة على السواء . ويزداد وينقص حسب استعداد الطفل لقبول الغذاء واحتياجه اليه بشرط ان كل ما يأكله يجب ان ينهمم بقائه والطعام غير المنضم يدل عليه البراز المنقطع ( المقرقط ) وفي الجدول التالي بيان ساعات الطعام للاطفال الذين دون السنة من العمر سواء كانت تغذيتهم من الثدي أو من الزجاجة وهو خرتب أحسن ترتيب يوافق الطفل ولا يمحف بأوقات النوم في الصباح وبعد الظهر


### ترتيب ساعات الرضاع من السنة فما دون

| من الشهر | من الشهر | من الاسبوع | من الاسبوع | من الاسبوع    | من الاسبوع |
|----------|----------|------------|------------|---------------|------------|
| ١٢ - ٨   | ٨ - ٤    | ٦ - ١      | ٥ - الاول  | ٤ - قبل الظهر | ٣ - ق. ظ   |
| ٧ ق. ظ   | ٧ ق. ظ   | ٧ ق. ظ     | ٧ ق. ظ     | ٧ قبل الظهر   | ٦ ق. ظ     |
| ١٠ ١/٢   | ١٠ ٢     | ١٠ ٣       | ٩ ١/٢      | ٩             | ٨          |
| ٢ ب. ظ   | ١ ب. ظ   | ١ ب. ظ     | ١٢ الظهر   | ١١            | ٧          |
| ٦        | ٤        | ٤          | ٢ ١/٢ ب. ظ | ١ بعد الظهر   | ٣          |
| ١٠       | ٧        | ٧          | ٥          | ٣             | ٢          |
|          |          | ١٠         | ٧ ١/٢      | ٥             | ١          |
|          |          | ٣ ق. ظ     | ١٠         | ٧             | ٣          |
|          |          |            | ٣ ق. ظ     | ٩             | ٣          |
|          |          |            |            | ١٢            | ٤          |

وهذا القانون يقبل التغيير والتبدل تبعاً لمقتضى الحال  
ثانياً : انتقاء الغذاء المأهول والمأهاد التابعة له

ليكن معلوماً ان الطعام الذي يقرب في تركيه من لبن الثدي هو أفضل غذاء للاطفال ك لبن الحمير والخيول فإنه أقرب الى اللبن البشري من سائر اللبنات الحيوانات ومن ثم فهو أدنى غذاء للطفل بعد لبن الأم . ولما كان الوصول الى لبن الحمير والخيول صعباً جداً في اكثار البلدان فلم يجد بدلاً من استعمال لبن البقر وتحضيره حسب قوانين الصحة ليسهل هضمه على الرضيع . والفرق بين لبن البشر ولبن البقر قليل جداً كما يتضح من الجدول الآتي :-

بالربيع خرراً شديداً . ولا متحان للبن طرق عالمية يصعب فهمها على العامة ولكننا نذكر طريقتين سهلتين : الاولى ان تزن اللبن بالميزان (شكل ٢٣) وذلك بان تسمى في الانبوبة التي ترى صورتها في الشكل بعد ان تملأها لبنا الى الجلط



الميزان الانبوبية

اللتوس الازرق في اللبن ونذر كما حتى تشف فاذا احررت فالبن حامض يجب اصلاحه بماء الصودا او ماء الجير حتى يصير قلوياً واذا تحول لون الورق الازرق الى احمر بعد اضافة الماء المذكورة فالبن فاسد لا يصلح للرضاع

بقي ان نجز من لبن البقر طعاماً يشبه في تركيبه وعناصره لبن الام على قدر الامكان بحيث يكون موافقاً للأطفال في جميع اطوار الحياة سواء كان قبل زمن الطعام القانوني أو بعده لانه يتغنى كثيراً ان الطفل ينفصل عن امه منا . ولادته فيضطر أهله ان يغدوه بالصناعة لفقرهم أو لتعذر الوصول الى مرضع والمجوزات الآتية تحضر في البيت من لبن البقر ويتناولها الطفل على نحو ما نقدم شرحه في جدول قانون الرضاع ويزداد الطعام أو ينقص تبعاً لقتني الحال

## جدول

| لبن الانسان         | لبن البقر         | لبن البقر | لبن البقر        | لبن البقر | لبن البقر | لبن البقر | لبن البقر | لبن البقر           |
|---------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| فعله                | قلوي              | قلوي      | بكثيريا          | حامض      | بكثيريا   | لاميء     | بكثيريا   | فعله                |
| ماه                 | (٨٧ - ٨٨ بالمائة) | ماء       | ماه              | موجود     | باء       | باء       | باء       | ماه                 |
| جوامد               | ١٣ - ١٤           | »         | جوامد            | ٤         | »         | ٤         | »         | جوامد               |
| مواد دهنية          | ٤                 | »         | مواد دهنية       | ٤         | »         | ٤         | »         | مواد دهنية          |
| مواد زلالية وأشابها | ١                 | »         | » زلالية وأشابها | ٤         | »         | ٤         | »         | مواد زلالية وأشابها |
| سكر اللبن           | ٧                 | »         | سكر اللبن        | ٤         | »         | ٤         | »         | سكر اللبن           |
| امالاح              | ٧٦                | »         | امالاح           | ٢٤        | »         | ٢٤        | »         | امالاح              |

فن هذا الجدول يتبيّن ان الزلال في لبن البقر يزيد في كيته عن الزلال الموجود في لبن الانسان . ومعلوم ان المواد الزلالية عناصر مهمة في التغذية ولكنها تحتوي على مادة ثقيلة على المعدة تسمى « كاسين » وهذه المادة لا تهضمها معدة الطفل الا اذا كانت بذات الكثافة الموجودة في لبن الانسان . ولذلك يجب ان يخفف لبن البقر بالماء لكي يصير الزلال الموجود فيه معاذاً لزلال الموجود في لبن الام . الا انه عند تخفيفه بمالاً تقل المواد السكرية والدهنية من لبن البقر فيضاف اليه عندئذ قليل من السكر والشدة السائلة (كرام) لاجل تعويض ما خسره منها باضافة الماء اليه

وبما ان لبن البقر حامض فيضاف اليه ماء الصودا او ماء الجير (الكلس) حتى يصير قلوياً مثل لبن الثدي . وينبغي ان يكون اللبن جديداً من بقرة سليمة من المرض وعلفها من الحبوب او الاعشاب التي لا تؤثر في طعم لبنها حتى لا ينفر الطفل منه

ومن الضروري ان يفحص اللبن قبل استعماله لثلا يكون فاسداً فيضر

## من اول الشهر الثالث الى السادس

|                    |           |               |   |
|--------------------|-----------|---------------|---|
| ملعقة كبيرة ٥      | لبن       | ملعقة صغيرة ٢ | فشدّه سائله (كرام)  |
| » ١                | كرام      | » ٣           | مصل اللبن   |
| » ٢                | ماء       | » ٣           | ماء فاتر  |
| ملعقة صغيرة ١      | سكر اللبن | ١             | سكر اللبن   |
| كل ثلاثة ساعات مرة |           |               | تعطى في كل ساعتين حتى يبلغ ما يتناوله الرضيع في اليوم (٢٤ ساعة) |

## من الشهر السادس الى العاشر

|  |           |               |  |
|--|-----------|---------------|--|
| ملعقة كبيرة ٨  | لبن       | ملعقة صغيرة ٤ | لبن  |
| » ١  | كرام      | » ٤           | فشدّه سائله (كرام)   |
| » ٢  | ماء       | ٢             | سكر اللبن  |
| ملعقة صغيرة ١  | سكر اللبن | ١             | ماء  |
| كل ثلاثة ساعات مرة على ست دفعات حتى يبلغ ما يأخذ في اليوم نحو ٣٦ فنجاناً |           |               | تعطى كل ساعتين ونصف مرّة من الساعة الخامسة قبل الظهر الى الخامسة بعد الظهر حتى يبلغ ما يتناوله الرضيع في مدة ٢٤ ساعة من ١٢ - ١٦ أوقية او ١٦ فنجاناً صغيراً |

## من الشهر العاشر وهو زمن القطام القانوني الى نهاية السنة الاولى

|  |                         |           |               |                     |
|--|-------------------------|-----------|---------------|---------------------|
| ٢  | ملعقة كبيرة             | لبن       | ملعقة كبيرة ٢ | لبن                 |
| ٢  | »                       | كرام      | » ٠           | فشدّه سائله         |
| ٣  | ماء الصودا او ماء الحير | »         | ٠             | ٠                   |
| ١  | ملعقة صغيرة             | سكر اللبن | ٠             | ٠                   |
| تعطى كل $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$ ساعات مرة على خمس دفعات في اليوم   |                         |           |               | كل ثلاثة ساعات مرّة |
| ينذى الطفل بهذه الجهزات اما بالملعقة او بالزجاجة واذا كان يتقيأ بعد الطعام مواد عجينة فيضاف اليها ماء الصودا او ماء الشعير او ماء الحير عوضاً عن الماء الصرف . وما يفيد أيضاً نغذيته بالطعام المذكور في (ملحق ١) |                         |           |               |                     |

## في الاسبوع الاول

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| ملعقة صغيرة ٢ | فشدّه سائله (كرام) |
| » ٣           | مصل اللبن          |
| » ٣           | ماء فاتر           |
| ١             | سكر اللبن          |

نحو عشر أوقية طبيه كل اوقية ٨ دراهم او فنجان صغير

## من الاسبوع الثاني الى السادس

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| ملعقة صغيرة ٤ | لبن                |
| ٤             | فشدّه سائله (كرام) |
| ٢             | سكر اللبن          |
| ١             | ماء                |

تعطى كل ساعتين ونصف مرّة من الساعة الخامسة قبل الظهر الى الخامسة عشرة بعد الظهر حتى يبلغ ما يتناوله الرضيع في مدة ٢٤ ساعة من ١٢ - ١٦ أوقية او ١٦ فنجاناً صغيراً

## من الاسبوع السادس الى نهاية الشهر الثاني

|               |             |
|---------------|-------------|
| ملعقة كبيرة ٢ | لبن         |
| ١٠٠           | فشدّه سائله |
| ١             | لبن السكر   |
| ٢             | ماء         |

-----

وينبغي ان يزداد الطنام تدريجياً بعد الفطام الى ان يبلغ السنة الاولى فعندئذ يُؤخذ اللبن صرفاً . اما الماء المولفة منها المجهزات المذكورة فحضر كا يأتي : -  
اولاً : الکرام - هو مادة اللبن السمنية يحضر بوضع اللبن في آناء أو  
أنبوب من زجاج يحفظ في الثلاج أو الماء البارد ٢٤ ساعة فيترتب في أعلى الانبوبة  
مادة سميكة يقال لها الکريم أو القشدة السائلة

ثانياً : مصل الحليب - (يحضر حسب ملحق ١٣)

ثالثاً : ماء الصودا - يحضر على نسبة خمسة سنتكرامات من يكاربونات  
الصودا الى ملعقة كبيرة من الماء النقي او تذوب نحو ٤ جرامات صودا في الماء  
ويحفظ في زجاجة نظيفة فيقي زمناً طويلاً . وكل ملعقة من ماء الصودا تعادل  
ملعقة من ماء الجير


رابعاً : ماء الجير - يحضر حسب (ملحق ٢٢)

خامساً : ماء الشعير - (يحضر بحسب ملحق ٢)

سادساً : سكر اللبن - يطلب من الصيدليات او يحلى اللبن بالسكر ايضاً  
هذا أفضل ماوصل اليه اختبار الاطباء من الاطعمة الصناعية التي تقرب في  
تركيبها من لبن الانسان . على ان البعض من الاطفال يربون عليها فتوافق  
صحتهم والبعض الآخر لا توافقهم . وعندئذ يجب ان يبدل الطعام بطعام آخر  
يوافق الطفل وي Shawd الطبيب عند أقل خلل يطرأ على صحة الولد بسبب  
الغذاء الصناعي

﴿تطهير اللبن﴾ - فرغنا من تدبير المواد الازمة للتغذية الصناعية وبن  
ان نبسط الكلام على كيفية تقييم اللبن وحفظه من جرائم الفساد التي هي السبب  
في هلاك كثرين من الاطفال . وهذه الجرائم او الميكروبات هي اجسام حية  
لا ترى الا بالنظرية المكبرة منها نوع يدخل اللبن (الحليب) فيفسده ويجلب  
الضرر على الرضيع . أما لبن الام فلا يخشى عليه من الفساد الا اذا كانت  
الميكروبات عالقة بحملة الثدي فتدخل فم الرضيع في أثناء الرضاع وتسبب الاصناف

ومثل ذلك لبن البقر فانه خالي من الفساد عند حله . واما اذا مضى عليه ساعات  
قبل ان يشربه الطفل فلا يخلو من الميكروب . وهذا الميكروب يدخل اللبن من  
يد الحليب القدرة او يقع فيه من تعرضه للهواء أو من وضعه في وعاء غير نظيف  
وبناء على ذلك يجب ان يغسل الحليب يديه بالماء السخن والصابون وينقى اظافره  
من الاوساخ المشوهة فيها قبل ان يخلب البقرة وان ينطف الوعاء جيداً ليكون  
اللبن خالياً من تلك الميكروبات القاتلة . ومع كل هذه التحوطات فان لبن البقر  
لا يخلو في غالب الاوقات من دخول الميكروب اليه ولذلك يجب ان يطهر قبل  
شربه . والطريقة الشائعة لتطهيره هي تسخينه على النار ولكن التسخين على النار  
 مباشرة يرفع حرارة اللبن الى درجة عالية فيفسد طعمه ويفير مواده الغذائية  
فيفسر هضمه على الرضيع . ويكتفى لقتل الميكروب ان يسخن اللبن الى درجة  
١٥٥° او ١٦٨° ميزان فهرنهايت . وقد جعلوا لتطهيره أوانى مختلفة وأسهلها استعمالاً  
الوعاء الذي ترى صورته في (شكل ٢٤) وهو من الصفيح او معدن آخر ويتبعه



(ش ٢٤) مطهر فرن من  
التار وتوضع فيه الزجاجات المذكورة ويُقفل

عليها بالغطاء . وكلما برد الماء في الوعاء تدب الحرارة في جميع أجزاء اللبن على  
السواء اي ان اللبن يسخن في أسفل الزجاجة وأعلاها في وقت واحد . وبعد  
٤٤ دقيقة يفتح الوعاء ويضاف اليه ماء بارد حتى تبرد الزجاجات ثم تحفظ في  
الثلاج او الماء في مكان رطب الى حين الحاجة  
ويتناسب ان يطهر عوضاً عن الحليب مقدار من المزج الذي جهزناه

لرضاعة يكفي الطفل طول النهار والليل . الا ان الحرارة تغير ماء الجير (الكلس)  
فيبدل باء الصودا

هذه هي احدي الطرق الشائعة الاستعمال لتطهير اللبن من جراثيم الفساد  
وجمله طعاماً صحيحاً للاطفال . ولكن الوصول اليها وشيوخ استعمالها أمر صعب  
جدًا في هذه البلاد ولذا ذكر طريقة أخرى بسيطة وهي ان يوضع المزيج  
المجهز لتعذية الطفل في زجاجة متينة وتسد بقطن نقى ثم تتمس في ماء غال  
نحو ١٠ دقائق ولا يجوز ان يستعمل من المزيج الا ما يكفي الطفل لكل  
رضاع فقط


ويحسن ان تكون زجاجة الرضاع مفردة من ظاهرها لاجل تحديد مقدار  
البن الذي يتناوله الطفل في كل مرة وترك على فها حلة صناعية قصيرة  
والافضل ان تكون الزجاجة ذات ثلم في فها أو بطنها حتى يدخلها الهواء ويساعد  
على مرور اللبن من الحلة بسهولة . والزجاجة التي تستعمل لتطهير اللبن يجوز  
استعمالها للرضاع أيضًا

ولا بد من تسخين اللبن المطهر قبل تغذية الطفل حتى لا يتناوله بارداً و يتم  
ذلك بتقديس الزجاجة باء غال الى ان تصير حرارة اللبن على درجة ٩٨ - ١٠٠  
میزان فهرنھیت وهي درجة الفتور

وي ينبغي عند تغذية الطفل انت تضعه أمه في حضنها وتستدرأسه بذراعها  
وترضعه من الزجاجة يدها نحو ١٥ - ١٠ دققيقة ويحسن ان تسحب الحلة من  
فه في كل خمس دقائق لكي يتنفس ويرتاح . ولا يجوز ان يترك الطفل يرضع  
وحده ولا سيما بعد فراغ الزجاجة من اللبن وهي عادة مكرورة وعاقبتها سبعة  
جداً

والافضل ان تكون زجاجة الرضاع ملساء من الباطن أي خالية من الحفر  
والتعارض لكي يسهل تنظيفها من بقايا اللبن الذي يلتصق بجدرانها . وبعد الرضاع  
تفصل من بطنها بفرشاة ناعمة يرغى عليها بالصابون والماء السخن وتتمس بالماء

الغالى حتى يزول ما عليه من الصابون ثم يترك في محلول الصودا او محلول ملح  
ال الطعام نحو ساعة أو ساعتين وتجف بقلها على فها . واذا نسي في الزجاجة قليل  
من اللبن القديم يكون سبباً لفساد كل اللبن الجديد



**( الحلة للصناعة )** - في (شكل ٢٥) حلة قصيرة  
مخروطة الشكل من الجلد المطاط تركب على فم زجاجة الرضاع .  
وي ينبغي ان تكون عديمة الرائحة والطعم على قدر الامكان حتى  
لا ينفر منها الرضيع فيرفضه . والحلة السوداء افضل من  
اليellow

وكثيراً ما يكون ثقب الحلقة ضيقاً فيوضع بالديوس او الابرة (ش ٢٥)  
بعد احاته على النار حتى يمر اللبن بسهولة و تعالج بذلك اذا  
كانت غير مقوية . ويختبر من استعمال الحلقة المتصلة بانبوب طويل لانه يصعب  
تنظيفها من الباطن ف تكون سبباً لتولد الجراثيم المرضية وهلاك الرضيع  
ذلك - **أحوال الطفل الخصوصية او مميزات الطفل**

لا ينفعى ان لكل طفل مزاجاً مختلفاً فيه عن سواه من الاطفال الذين  
من عمره فالبعض منهم تصح أجسامهم من الطعام الاصطناعي والبعض الآخر  
يضر بهم ضرراً شديداً . واذا رأيت الولد يضعف ويهرزل من لبن البقر فهو  
دليل على أنه لا يوافقه فيجب ان يمدل عنه ويغذى بطعام آخر بإثنائه او يزيد  
او ينقص تبعاً لمقتني الحال  
والاطعمه التي تقوم مقام لبن البقر كثيرة ذكر منها ما يأتي :-

**البن المحمد :** - يجوز استعماله في الايام الاولى من الولادة وهو الوقت الذي  
يكون فيه لبن الثدي شحيحاً وقليل الغذاء . وقد شاع استعماله في جميع البلدان  
حيث يسوقونه مذوباً بالماء لكي يصير الزلال الذي فيه سهل الهضم واحياناً يكون الماء  
كثيراً فيقبل الزلال فيه فلا يستفيد الرضيع شيئاً . وخلاصة القول ان اللبن  
المحمد غذاء وقى والتعویل عليه طوحاً يضر بالطفل ضرراً كبيراً اور بما كاف

سيما هلاكه . وقد يتفق ان الاطفال الذين يفتدون به يسمون وهذا اسم  
كاذب يدل على مرض الكساح  
الطعام الجلاتيني وأمثاله — هذا الطعام من أفضل المجهزات الصناعية  
للأطفال يحضر بحسب الطريقة المذكورة ( في ملحق ١٢ ) واذا مزج مع الاراروط  
ينجع تجبن اللبن فيسهل هضمه . وطعم آخر مؤلف من الكرامي ومصل اللبن  
( ملحق ١٤ ) وآخر مؤلف من جزء واحد من الكرامي ، ٦-٥ اجزاء من داء الشعير  
ماء زلال البيض — يحضر حسب ( ملحق ٣ ) وهو مفيد جداً ويناسب  
ان يضاف اليه ( ملحق ٢ )

شاي لحس العجل — يحضر حسب ( ملحق ١٦ ) ولا يدخل في  
تركيبة اللبن ولا الكرامي واستعماله مقصور على الاطفال الذين يعذل هضمهم  
وتهزل أجسامهم

الطعام المضوم — يحضر حسب ( ملحق ٢٣ - ٣٢ ) وفائدته عظيمة الا  
ان استعماله مدة طويلة يعوّد المعدة على الكسل فتضيق القوة الهاضمة منها  
الاطعمه المشائبة — يباع في الصيدليات أنواع كثيرة من الاطعمه  
الصناعية واصحابها بالغون بفائدهم ومقاربتها للبن الذي مع انه تبين من التحاليل  
الطبية أنها مؤلفة من مواد نشائية كالرزر والنشاء وأمثالها . ولا يخفى ان النشاء  
يضر الاطفال ولا يجوز استعماله قبل الشهر الخامس او بعد العاشر من العمر وذلك  
الاسباب الآتية وهي :-

عند ما يضع الانسان طعامه يخرج من جدران الفم سائل يسمى اللعاب  
( الريال ) وظيفته هضم المواد المشائبة الموجودة في الطعام وتحويلها إلى مادة  
سكرية . وبعد الفراغ من الهضم الفجي ينزل الطعام إلى المعدة ( ١ ) فتهضم  
عصاراتها الماء التي تسمى في اصطلاح الطب « بروتيد » ثم يسير إلى الأمعاء

( ١ ) يذهب البعض في هذه الأيام إلى أن وظيفة المعدة حزن الطعام وليس  
هضمه . ولم يثبت هذا الرأي

فيلاقيه على الطريق عصير آخر يأتي من عضو واقع وراء المعدة اسمه البنكرياس  
( الحلاوة ) فيذوب أو يهضم ما افلت من النساء والبروتيد في أثناء الهضم الفجي  
والمعدى وبهذه الطريقة يستحصل الطعام إلى دم يغذي الجسم  
فما تقدم يتضح لزوم هضم النساء في الفم قبل وصوله إلى المعدة والأمعاء .  
ولما كان افراز الاعاب لا يكل قبل الشهر الخامس أو العاشر من العمر فلذلك اذا  
نزل النساء إلى المعدة والأمعاء قبل هذا الزمن احدث الامهال والهزال  
على ان البعض من هذه المجهزات الصناعية يتحول فيها النساء في أثناء طبخه  
إلى مادة سكرية فتصير صالحة للغذاء . ومن الصعب ان تعرف الام الطعام النشائي  
بدون ارشاد الطبيب أو تحويله تحليلاً كيماياً . ولذلك ذكر طريقة أخرى بسيطة  
وهي ان يذوب نحو ملعقة من الطعام المراد امتحانه باء سخن ويضاف اليه قليل من  
صبغة اليود فإذا صار لونه ازرق فهو نشائي لا يصلح للأطفال الذين لم يبلغوا  
الشهر العاشر من العمر

» الطعام بعد الفطام القانوني » — ينדי الطفل عند الفطام القانوني  
بلبن البقر ممزوجاً بالماء على نحو ما نقدم شرحه في الطعام الاصطناعي ويجب  
ان يزيد الغذاء تدريجياً كلما تقدم الطفل في الأيام حتى اذا صار عمره سنة واحدة  
يتناول اللبن صرفاً بدون ماء ويتدرج على أكل الاطعمه السهلة الهضم كاليض  
( برشت ) والمرق وبعض المطبخات النشائية السائلة يتناولها بالملعقة في مقدار  
صغرى . وأما اللبن فيتناوله بالضاعة اذا كان الطفل يفضلها على الملعقة  
وقد تلقينا عن الدكتور كرفيث الامريكي بعض أصناف الاطعمه لتفذذه  
الاطفال من السنة الاولى إلى السنة الثانية من العمر وذلك حسب الترتيب الآتي

من الشهر ١٢ - ١٨

الملفة الاولى — من الساعة ٦ - ٧ صباحاً

( ١ ) كمية لبن بقر مع قليل من الحبز المفتوت

(٢) الارادوط مع اللبن يطبخ نحو ساعة او اكثر على نار خفيفة حتى يتخلو الشاء الذي في الارادوط الى مادة سكرية يسهل هضمها على المعدة  
 (٣) بيضة واحدة (برشت) مفتوت معها الخبز . وقدح لبن . العلبة الثانية . - الساعة ١٠ قبل الظهر

(١) قدح لبن صرف العلبة الثالثة - الظهر الساعة ١٢٤ - ٢ بعد الظهر

(١) خبز مبلول برق المعم الحالي من الدهن او عصير لحم الجigel (ملحق ٢٢)  
مع قدح لبن

(٢) قدح لبن ورز مطبوخ برق المعم

(٣) قدح لبن وبيضة برشت وخبز مدهون بالزبدة  
ويعطي مع هذه الاغذية مقادير صغيرة من الارز أو النشاء المطبوخ بالبن  
والسكر

العلبة الرابعة - الساعة الخامسة بعد الظهر

(١) قدح لبن او خبز وبن

العلبة الخامسة - ٩ - ١٠ بعد الظهر (مساء)

(١) قدح لبن فقط

وهذه العلبة ليست ضرورية للطفل الا اذا كان ضعيفاً او بطيءاً النمو  
واذا افاق من نومه قبل وقت فطور الصباح وبقي مستيقظاً فيعطي فنجاناً من  
البن لكي يسد جوعه الى ان يأتي ميعاد الطعام . ويجب ان يزداد الغذاء تدريجياً  
كلما تقدم الطفل في العمر وذلك على قدر الحاجة اليه بشرط ان يكون معظمها من  
البن . وليس من الضروري ان يظهر اللبن في الفصول الباردة في هذا العمر ولكن  
يجب الاعتناء بنظافته حق العناية منعاً للفساد وأما في الصيف فيجب ان يظهر ثلاثة  
توزيع فيه الحرارة فتفسد

من الشهر ١٨٤ - ٢٤

فطور الصباح . الساعة السابعة قبل الظهر

(١) قدح لبن مع الخبز والزبدة او مع أوت ميل او بسكويت من غير سكر  
وأفضل نوع منه رسك بسكويت

(٢) بيضة واحدة (برشت) مع الخبز والزبدة وقدح لبن  
العلبة الثانية - الساعة ١٠ قبل الظهر

(١) خبز منقوص بالبن

(٢) قدح لبن مع خبز او بسكوت  
العلبة الثالثة - الساعة ٢ بعد الظهر

(١) قدح لبن مع مسحوق الارز مطبوخاً بالماء او مع بطاطس مشوي  
يسحق ويل برق المعم

(٢) مرق الضان او الفراخ مع الخبز والزبدة

(٣) لحم فراخ من الصدر (نسير . سفين) او سبك مشوي اورستو  
قطع قطعاً صغيرة ناعمة مع قدح لبن وخبز وزبدة  
العلبة الرابعة - الساعة الخامسة بعد الظهر

(١) خبز وبن

(٢) خبز وزبدة وقدح لبن

والغرض الوحيد مما ذكرناه من أصناف المأكل ان يتدرج الطفل على اكالها  
فإن لم يعجبه هذا أحببه ذلك ويخترس من تكرار الصنف الواحد لثلا ينفر الطفل  
منه ويكرهه . وكذلك يخترس من الاكثار من البطاطس لانه صعب الهضم على  
صغر الأطفال لكتلة المواد النشائية فيه  
ويجب ان لا ينفل عن الفواكه كالدراcon والفراز والعنب (من غير بزر)  
وعصير البرتقال والتفاح مطبوخاً ومحلى بالسكر لانها فضلاً عن فائدتها الغذائية فهي

ثلين الامماء وقمع الامساك  
وحيانا يصير عمر الطفل سنتين ونصف او ثلات سنين يجلس الى المائدة على  
كرسي عال بجانب امه وتطعمه من الاصناف السهلة الانهضام . ومن السنة الثالثة  
او الرابعة فصاعداً تبلغ المعدة قام القوة فتهضم جميع الاطعمة نفريها الا انه لا يجوز  
ان يسمح للولد بان يمد يده الى كل نوع من الغذا على المائدة ولا ان يأكل  
بين طعام وطعم الا اذا كان جائعاً فيعطي شيئاً قليلاً من اللبن  
﴿الاطعمة الممنوعة﴾ - تجنب الاطعمة الكثيرة الدهن والبهارات الحريفة  
والحلويات والمجنات والموز والطاطم (البندوره) والكرنب والجوز واللبس والشاي  
والقهوة والخمور والغواكه العبرة كل هذه عشرة المضم ومضره بالأولاد  
ويجب ان يكون العشاء خفيفاً كاللبن والحبز حتى يرتاح الطفل في نومه ولا يجوز  
ان يقطع عنه اللبن في كل هذه المدة وأقل ما يعطى منه مرة واحدة في اليوم  
اما التغذيه في المرض فنبسط الكلام عليها في القسم الثالث من هذا  
الكتاب وهو تدبير الاولاد في المرض

## الفصل السادس

### في نوم الاطفال

أوقات معلومة . ولذلك يحفظ من الشهر الثاني فصاعدا نحو ساعة مستيقظاً قبل  
ميعاد نوم المساء لكي ينام في الليل براحة تامة  
ويجب على الام أن تحمل طفلها ينام في أوقات معلومة واذا كان كثيراً  
الارق في نومه فلا يجوز ان تسقيه منوماً كالخشاش ونحوه لانه يسقم الجسم  
واحياناً يقتل الطفل الضعيف البنية . وكثيراً ما تحمل الام طفلها على ذراعيها  
ونهشى به في أرض الغرفة أو تلقيه على الفراش وتهدهده ( المهددة الضرب  
باليد قليلاً قليلاً ) او تهز السرير او تناوليه الى غير ذلك من الوسائل التي  
يستعملها النساء لاجل نويم الاطفال وكلها غير لازمة لانها تتعب الام المرض  
وطفلها والافضل أن تبذل جهودها تنويم الطفل من غير الوسائل التي تقدم ذكرها  
وتقابل المصاعب التي تلاقتها في هذا السبيل بالصبر الجميل  
ويجب أن ينام الطفل في الشهر الاول على ظهره طول الوقت . ولا بأس  
بعد ذلك الوقت اذا كان ينام في بعض الاوقات على جنبه الain او بطنه  
وهذا التنقل يفيد الطفل فائدة عظيمة ولا سيما اذا كان مصاباً بمرض الكساح أي  
رخاؤه العظام فانه يخشى عندئذ أن يعوج ظهره من النوم على جنب واحد كل  
الوقت وبقى كذلك طول الحياة  
ولا بد من أن تكون ساعات النوم مرتبة مثل ساعات الطعام . فینام الطفل  
قبل الشهر الرابع او الخامس في الساعة الخامسة ونصف او السادسة بعد الظهر .  
ولا يجوز أن يوقظ غير مرّة واحدة أو مرتين في الليل لاجل ارضاعه  
وبعد الشهر الرابع أو الخامس ينام في الساعة السابعة بعد الظهر ويغذى  
مرة واحدة في الساعة العاشرة او الحادية عشرة ليلاً ثم ينام من غير رضاع الى  
الساعة السادسة او السابعة من صباح اليوم التالي بحيث يغذى ويرد الى فراشه  
اذا كان يميل الى النوم . على انه كثيراً ما يتوقف ترتيب النوم على ترتيب الطعام فيجب  
الانتهاء الى ذلك  
وعند ما يبلغ الشهر السادس ينام في النهار نحو ساعة او ساعتين قبل الظهر

حرارة النار في جميع فصول السنة ما عدا فصل الصيف وقد يستغني عن ذلك بالفَقدِيِّ الطفل بطرف احرا من الصوف الناعم لخفيف الحرارة  
اما الحاد ففضلها ما كان من الريش الناعم ودثارها من الكتان (التيل)  
الا يض والغطاء خفيف حسب الفصول والاقام

ولا يجوز أن ينام الطفل في الثياب التي كانت عليه في النهار واحياناً يتبع  
الولد الكبير عن تغيير ثيابه في المساء وعندئذ يجب على الأم ان تبذل جهدها  
لكي تذلل عنده بالطف والملاينة حتى يقدم على تغيير ثيابه اختياراً لا اضطراراً  
اما الغرفة التي ينام فيها الطفل فتتوقف في الغالب على احواله، فان كان  
يرضع من ثدي امه فالاولى ان ينام في غرفة مخصصة مع خادمه وفي ساعات  
الرضاع يوُخذ الى امه لاجل تغذيتها . ولا يخفي ما في ذلك من الراحة للام  
ورضيعها ولا سيما في الليل بحيث لا يكون باعثاً الى ارقها وارضاع طفلها كلما بكى  
واستيقظ من نومه

وان كان من يندون بالصناعة أي يرضعون من الزجاجة فلا بأس اذا كانت  
الخدمة او المرضعة تتعهد تغذيته ولكن تحت مناظرة امه ولا يجوز الاعتماد على  
الخدمة مالم تكن اهلاً للثقة مما سينذكره في فصل الخدمات

## الفصل السابع

ـ في التربية ـ

التربية الجسدية — التربية العقلية والادبية

التربية علم واسع الاطراف نذكر من اساليبه وكيفياته ما يسمح به غرض  
الكتاب وقد قسمنا الكلام عليه الى قسمين  
اولاً : التربية البدنية

ومثل ذلك بعد الظهر بشرط ان لا يطول نومه الى ما بعد الساعة الرابعة لثلاثة أيام في الليل . ويداوم على هذه الكيفية طول السنة الاولى والثانية ماعدا النوم بعد الظهر  
لأنه غير لازم الا اذا كان الولد في حاجة اليه

وكما نقدم الولد في العمر تختصر ساعات النوم في الصباح شيئاً فشيئاً حتى  
يستغني عنها تماماً . ولا يغدو في الليل الا اذا كان مضطراً الى التغذية  
ويجب ان ينام الولد في الساعة الرابعة والخامسة نحو الساعة الثامنة وفي الساعة  
العاشرة او الثانية عشرة نحو الساعة التاسعة مساءً

وفي الاشهر الاولى ينام في سرير هزار يغطي بناءوسية من الشاش  
او التول والأخير أفضل من الاول لاتساع خلاياه وسهولة نفوذ الهواء فيها لان  
الهواء لازم للصغار كما هو لازم للكبار . ولا يجوز ان يغطي السرير بملاءة او لحاف  
بحجة ان هذه الاغطية تحفظ الطفل دائرياً لانها تمنع الهواء عنه فتفطسه

و قبل تمام السنة بشهرين او ثلاثة أشهر ينقل الى سرير آخر من الاسرة  
الثانية ويجب أن يكون السرير مرتفعاً من جانبيه لوقاية الطفل من السقوط ولا  
 تستعمل الناءوسية في هذا الحين الا اذا دعت الحالة استعمالها

ومن اقبع العادات واشدتها خطرًا ان ينام الطفل مع امه في فراش  
واحد لانها كثيراً ما تستغرق في النوم فتقلب عليه وتقتله أو تجذب الغطاء فوق  
رأسه حتى يبتعد عنها الهواء فتفطسه . وهب انه نجا من هذه المخاطر فلا ينجو من  
خطر آخر يهدد صحته وهو ان نومه مع امه في فراش واحد قد يكون باعثاً على  
ارضاعه بالليل كلما بكى فيصاب بعسر الهضم ويعيش ممراضاً طول حياته على  
نحو ما سبق ذكره في فصل الرضاع

ويجب أن يكون فراش الطفل من الصوف أو الشعر في الشتاء ومن القطن  
في الصيف وأفضلها الصوف لانه يصل بالماء فينظف جيداً ويفرش فوق الفراش  
ملاءة من المشمع لمنع نفوذ المواد الفضلية اليه وفوق المشمع ملأة أخرى من  
نسج المصليينا نطوى على مرتين وتغير كلما تبالت . وقبل النوم تدفأ الملأة على

### ثانياً : التربية الذهنية والادبية

فالترية البدنية او الرياضة الجسدية تقوم بتحريك عضلات الجسم والتزه في الجنان البعيدة عن مجتمع الناس واقتدار المدن . ولا بد للولد من تربية بدنية وهذا فرض واجب على الوالدين لأن نجاح كل أمة موقوف على افرادها والافرادي صحة أبدانهم وشدة بأسمهم وجدهم . ومن كان مسقاً مراضاً قصر عن القيام بواجباته نحو وطنه ونفسه وكان حلاً ثقيلاً على أهله ووقرأ على عائق الانسانية وتبتدئ التربية البدنية من الأسبوع الثاني من الولادة وهو الزمن الذي يشرع فيه الطفل بتحريك يديه ورجليه ولذلك لا يجوز ان يقطع من رأسه الى شخص قد미ه أو يليس شيئاً زائدة في طولها عن الحد الذي يطلبه قانون الصحة لثلاثين عن الحركة كما يموجي فيتعوق نموه . هذه أول خطوة من خطوات التربية البدنية والخطوة الثانية هي ان تحمل الطفل على اليدين مستلقياً نحو مرتبين في اليوم وتحمه مخدة من الريش الناعم كأنه نائم في سريره . ولا يأس اذا كان يحمل في أثناء الشهر الثاني من غير مخدة على الطريقة التي تقدم ذكرها وبعد ذلك يتحمل متصباً على الذراع الواحدة ويستند ظهره ورأسه بالذراع الأخرى . ولا يجوز ان يخرج به الى النزهة قبل الزمن الذي يوصل جسمه لتحمل الهواء . وثم عادة سبعة وهي انهم يعرضون الطفل الصغير للهواء باكراً بمήجة ان ذلك يقوى بدنـه ويعوده تحمل الحشونة وهي حجة واهية لأن من البرد ولا سيما في الطور الاول من الطفولة يؤثر في أجسام الأطفال البضة منها كان الطقس معتدلاً أو حاراً فيضر بصحتهم ضرراً جسيماً كـان النافق والمخفظ الزائدين يورثاً الضعف والسقام وخير الامور الوسط

والافضل ان يخرج بالطفل الى الهواء تدريجاً فيوخذ حيناً يصبر ابن اسبوعين من غرفة الى غرفة أخرى هواؤها ابرد من هواء الغرفة الاولى بقليل حتى يتدرج على تحمل الهواء من غير ان يلحق به ضرر من التعرض له دفعة واحدة ويجوز من الشهر الثاني فصاعداً ان يخرج به الى الخارج في الايام الصافية

فيكثـ من ١٠ - ١٥ دقيقة في الدفعة الأولى واكثر من ذلك في الدفعات التالية ويخترس من الخروج به في الأيام الباردة قبل الشهر الثالث من عمره . وإذا صادفت ولادته في فصل الشتاء فالاولى ان يبق في البيت الى فصل الربيع حتى يدفع الجو ويكون الطفل في مأمن من مضار البرد . ومع ذلك فان الحكم في هذه حالة عائنة الى تدبير الأم وحكمتها وحالة الطفل من القوة والصحة . وإذا كانت ولادته في فصل الخريف فيعود الخروج الى النزهة قبل مجيء الشتاء وأما في أيام البرد والأرياح الشديدة فيكتفى ان يلف بـلاة ثم تفتح نوافذ الغرفة التي ينام فيها حتى يتجدد هواؤها ويستنشقه تقلياً خالياً من الفساد وذلك أفضل من الخروج من المنزل في مثل هذه الاحوال . وإنما يجب ان يوضع في أثناء ذلك في مكان منحرف عن مجاري الهواء لثلا يبرد وحتى في الأيام الحارة يجب ان يعنى بتدفنته في النزهة فإذا بردت رجلـه او يدهـه ردـه الى البيت حالـاً ويحسن ان يخرج به في الدفعة الأولى على ذراع أمه او حاضنته لأن حرارة بدنـها تحفظ الطفل دافـاً فضلاً عن ان اسنادـها ايـاه يـدهـا الأخرى يـريحـه راحـةـ بـكريـ

وبعد الشهر الثالث وذلك حسب الطقس يؤخذ الى النزهة على عربـة الأطفال ويـجب ان تكون العربـة مـستوية أيـ غير مـائلـة الى جهةـ من الجهات ورفـاصـها لـيناـ وفـراـشـها نـاعـماًـ من الـريـشـ اوـ الشـعـرـ وـانـ يـكـونـ لهاـ مـخدـةـ يـجلسـ عـلـيـهاـ الطـفـلـ حـيـناـ يـلـغـ العـمرـ الـذـيـ يـوـهـلـهـ لـذـلـكـ .ـ وـمـظـلةـ لـمـنـ حـرـارـةـ الشـمـسـ وـالـأـخـيرـةـ لـازـمـةـ جـدـاـ وـبـدونـهاـ لـاتـفـعـ العـرـبةـ شـيـئـاـ .ـ وـكـثـيرـاـ ماـشـاـهـدـ هـذـهـ العـرـباتـ فيـ شـوـارـعـ الـعـاصـمـةـ تـسـوقـاـ الـحـادـمـةـ مـنـ عـيـرـ مـظـلـةـ وـالـشـمـسـ تـلـفـ وجهـ الطـفـلـ فـتـحـرـقـهـ وـتـكـونـ سـيـباـ لـاعـتـلاـهـ اوـ هـلاـكـ

والافضل ان يكون لون العربـةـ من الـظـاهـرـ اـسـودـ اوـ اـسـمـرـ وـكـذـاكـ بـطـانـتهاـ وـفـرـشـهاـ لـانـ اللـوـنـ الـأـيـضـ وـلـاسـيـماـ الـأـلوـانـ الـبـرـاقـةـ كـالـأـهـرـ وـالـأـخـضـرـ تـعـكـسـ نـورـ الـأـرـضـ إـلـىـ الـعـيـنـيـنـ فـنـسـرـ بـهـاـ ضـرـرـاـ جـسـيـماـ

ويتبع العربة سير من الجلد يربط الى جانبها من الامام لوقاية الطفل من السقوط . على ان وضعه على هذه الصورة لا يخلو من الخطأ لانه اذا اصطدمت العربة او كان الطفل كثير الحركة وخادمه لا هبة عنه وقع وتمشم كا حدث ذلك كثيرا . ولذلك يجب ان تدرك هذه المخاطر بتركيب السير على الطريقة التي نراها في ( شكل ٢٦ ) وهي ان يثبت الى جانبي العربة بمقاعدتين من الجلد حتى يحيط بالطفل ويحصره داخل منطقة حريزة تضمن له السلامة من السقوط كما ترى في الشكل



(ش ٢٦) عربة الاطفال

ومن الشهر السادس فصاعداً يقبل الطفل الى القعود في العربة عوضاً عن وضعه فيها مستلقياً وحينئذ يدعم ظهره وجانباه بالخاد الى ان يبلغ الشهر السابع من العمر فيجلس على مقعد العربة وحده . ويناسب ان يوضع من الشهر الثالث



(ش ٢٧) سياج او اطار للطفل

على انه يجوز حالاً يقوى الطفل ان يسير كل يوم على قدميه نحو ١٠ دقائق او اكثر حسب قوته وسنّه . ويداوم على النزهات في عربة الاطفال الى ان يبلغ السنة الرابعة من عمره وبعدئذ يركب عربة يمدها جسراً او حصان صغير ( بوني ) على نحو ماترى في شوارع العاصمة . وكلما ثقى الولد في السن زاد ميله الى اللعب فلا يقل ولا يكمل وهذا من غرائب ما يشاهد في الاولاد . ومن الواجب ان لا يسمح له بترويض بدنه الى حد الجهد والاعباء ثلاثة تكون الرياضة وبالاً عليه وأولاد المدارس من أحوج الناس الى ترويض أجسادهم لأن ازدحامهم في المدرسة واشتغالهم في درس العلوم كثيراً ما يفضي الى انحطاط العقل وربما أحدثا أمراضاً عصبية يصعب برؤها وأشدتها وطأة المرض المعروف برقض القدس انطونيوس الذي يكثر حدوثه في أولاد المدارس من أعمال الفكر والتقاعده عن الرياضة البدنية كما ينبعي ولا بد للطفل من ساعة أو ساعتين ير褚 في بدنها باللعب في الهواء المطلق

وأفع الالعاب للتلامذة ما يلعبونه من تلقاء أنفسهم لأنهم يغبطون به ويجدون فيه من اللذة ما لا يجدونه في غيره من الالعاب التي تفتخر عليهم أو يكرهون عليها ومن صنوف الرياضة المقيدة للإحداث ركوب الخيل والخيول والرقص والسباحة وكرة القدم والتنس وركوب الدراجة (البيسكل) كل هذه تحسن أثراها لا في الصبيان فقط بل في البنات أيضاً . ولست أرى مانعاً أدبياً ولا غير أدبي يمنع البنت عن ترويض بدنها بجميع الالعاب التي يتمرن عليها الذكور في الهواء وحرارة الشمس وهذا خير لها من الجباء في يتها لأن الرياضة على الطريقة التي نقدم ذكرها تكتسبها صحة وجلاً وبالتالي فلا تكون من الكاذبات في سوق الزواج وقد اخترع الأفرنج العاباً كثيرة لترويض أبدانهم وأنشأوا التوادي والجمعيات من رجال ونساء للمسابقات في فنون الرياضة الجسدية وقد جرت الحكومة المصرية هذا المجرى في مدارسها وكثيراً ما يلعب تلامذتها على رهن أو جائزة لأن ذلك يرغبهم في ترويض أجسادهم وينشطهم على المبارزة فيكون لهم نفع صحي يغبطون به طول حياتهم ولا تجد فيهم من المترهلين والقصعين ما تجده في سوام من الذين لا يراعون قانون الرياضة كما ينبغي

﴿التربية الذهنية والأدبية﴾ . هي ان ت Nur ذهن الولد وتتفق عقله وتهذب أخلاقه وتقوم شيرته ليكي يصير رجلاً بالحق متضاماً بصفات الإنسانية ويزعم اكثرا الناس ان التربية العقلية قائمة بتعليم الولد بالكتب ولذلك يسرعون بوضعه في المدرسة حلاً ينطق ببعض الألفاظ فيكرهونه على تعلم قواعد العلوم أو بالآخر على تحفظها غيّراً كالبيغاء من غير فهم ولا لذة ترغبه فيها لانه لم يترشح لادراث معاناتها بالوسائل العملية أي بقوية ذهنه وتنويره بالخطاب قبل الكتاب . ولهذا السبب ينفر الولد من المعلم والعلوم وتصير المدرسة سجنًا مظلماً في عينيه

ويبدأ بال التربية من الشهر الخامس وصاعداً وفي هذا الزمن يسر الولد باللاعب الأطفال وأفضلها ما كان من الجلد أو الكوتشك وغيرهما من المواد البينة لأنها اذا

كانت من المواد البينة الانكسار كالجلبص والخمار فلا تثبت ان تنكسر فتضطر الاام الى ابداها بعلبة أخرى جديدة . ولا يخفى ان الرزق الكبير يودي الى الاسراف والتبذير وهكذا حال الطفل من هذه اللاعب فانه اذا رأى انها توارد عليه من غير حساب قل حرصه عليها وفاته الفائدة منها . وبناء عليه يجب ان يكون للولد لعبة واحدة من المواد البينة الانكسار حتى تبقى عنده مدة طويلة ويتعلم ان يحرص عليها ويتعني بتقطيفها وتديريها لأن الولد قابل للتعليم والتذبذب منها كان صغيراً

ومن جملة الملاهي العقلية التي ت Nur عقل الولد ان يكون في البيت كتب موضوعة بصور مشاهير الرجال وبعض أنواع الانسان والحيوان والنبات فتشرح له أممه أو حاضنته شيئاً عنها على مقدار سنه وفهمه حتى يتبعاً عقله تدریجاً لقبول المعارف التي تلقى عليه في المدرسة

ومما يسر الولد كومة من الرمل الجاف يلعب بها في أيام البرد في بيته فتارة يمسطها فيجعل منها سهلاً وطوراً يكومها فيثقل جيلاً أو أكمة وبهذه الواسطة يدفع عنه الملل والضجر ويتيحها عقله لقبول العلوم الجغرافية وقس على ذلك سائر العلوم والاتصال بالولد بالفاظ لا معنى لها وهي اللغة التي تستعملها الام في مخاطبته أولادها ومعظمها كلام غير معهوم يتلقنه الولد كانه لغة أعممية ولكن لا معنى لها ولا وجود سوى في محلية الامهات . والافضل ان تخاطبه من بدء الامر بكلام واضح وعبارة جلية حتى يتعود من صغره على طلاقة الحديث وفصاحة اللسان

ومن عادة الالاد ان يسألوا عن كل غريب يشاهدونه وهذا طبيعي فيهم يدفعهم اليه حب الاستطلاع والوقوف على كل شيء يجهلونه . يدلنا على ذلك انك اذا ذهبت بالولد الى الجنائن والتقط زهرة او شاهد طيراً الى غير ذلك مما يقع تحت يده او يستلفت نظره أقليك يسأل عن هذا وذاك وينظر الجواب بشوق زائد . على انه كثيراً ما تعد الام هذه الاستثناء ضرباً من التطاول والفضول فتزجره عنها أو تجعل جواها قليل الفائدة . ومن الواجب على المربى كائناً من

كان ان يجاوب عن كل سؤال يطرحه عليه الولد ويشرح له كل غواصه حتى يتشرّبه ويرسخ في ذهنه . ولا يخفى ان ما يتعلمه الولد من الاسئلة أو يسمى في تحصيله من عند نفه اختياراً لا قسراً واضطراراً يكون أحب اليه وابقى في حافظته مما لو اخذه عن الكتب في المدرسة على انه اذا سأله الولد سؤالاً في غير محله او لا يليق بهن كان في سنه فيجب ان يمنع عنه ولكن بالاطف والملاينة لا بالقسوة والخشنة والقدوة من اكثر ذرائع التعليم والتعلم فائدة للاولاد بل هي افضل معلم لهم وذلك لبراعتهم في التقليد والاقتباس وبناء عليه يجب ان يكون الوالد قدوة حسنة لاولادهم في القول والفعل ولا يسمحوا لهم بمعاشرة الاولاد الناصفي التربية لثلاثة تربتهم وأدابهم ولا بد من تدريب الولد على الطاعة حتى يمثل لاً وامر والديه حباً بهما لا طمعاً في جائزه او فراراً من عقاب . ولا يخفى ان الطاعة من أكثر ذرائع التربية فائدة ولا سيما في وقت المرض لأن الولد الذي لم يتمتع ليطيع والديه ويدعوه لا امرها يرفض الدواء ولا يأخذه الا قهراً بعد عرث طويل ربما ينجلي عن اضطراب المليل وشتداد العلة مما يصيبه على اثر ذلك من الانفعالات النفسانية واحدزد من معاقبة الولد اذا تكلم بالصدق لثلا يعتزم بالكذب في المره الثانيه ولا تماقهه ملما يرتكب ذنبـ . ويجب ان يكون العقاب مجانساً للذنب . وفي أثناء ذلك يحسن ان تناطبه بنغمة محزنة وتبين له السبب الذي من أجله استحق القصاص لكي يعرف غلطه ولا يعود اليه ومن أشد أنواع العقاب تأثيراً في نفوس الولاد منهم من اللعب أو ايقافهم في زاوية البيت أو حرمائهم من النزهة أو بعض الهدايا والجوائز وما شاكل ذلك واياك ان تماقهه في ساعة الغضب أو تلطمه على خده او تجذب أذنه او تجسسه في غرفة مظلمة لأن هذا النوع من العقاب يضر بالصحة ضرراً شديداً . ولا يجوز ان تماقـ الولد بالتساوة عند اقل ذنب يرتكبه او زلة تفرط منه لثلا يفقد

الشعور ولا يؤثر فيه القصاص او تربيـ بسبب ذلك جرائم الحقد والبغضاء في قلبه فينسب اليـ القساوة والخشونة وتصرـ في عينـه عدواً ظالماً ومنتقاً لا معلماً ومهدباً ومن الصفـات المـكرـوة حـبـ الذـاتـ وهيـ غـرـيزـةـ فـيـ الـانـسـانـ وـأشـدـهاـ قـوـةـ فيـ الـاـولـادـ ولـذـاكـ لاـ يـسـهـلـ عـلـىـ المـرـبـيـ انـ يـحـمـلـ الـوـلـدـ عـلـىـ الـاقـلـاعـ عـنـهاـ وـيـجـعـلـهـ يـفـتـكـرـ وـيـعـملـ لـغـيرـهـ لـانـاـ مـفـطـورـونـ عـلـىـ مـحـبـةـ اـنـفـسـاـ وـقـاـمـاـ يـعـمـلـ الـاـنـسـانـ عـلـاـ لـغـيرـهـ صـفـيـراـ كـانـ اوـ كـبـيراـ مـاـ لـيـكـنـ لـهـ مـنـ نـفـعـ وـلـوـشـيـ مـنـ الـلـذـةـ اوـ الـاسـرـةـ عـلـىـ اـنـ لـاـ يـصـعـبـ عـلـىـ المـرـبـيـ عـالـفـ العـارـفـ بـاـصـوـلـ التـرـيـةـ الـحـقـةـ اـنـ يـقـوـمـ وـيـعـدـ هـذـهـ الصـفـةـ فـيـ الـوـلـدـ وـذـاكـ بـاـنـاءـ الصـفـاتـ الـمـضـادـةـ لـهـ كـحـبـ الـخـيـرـ وـالـشـفـقـةـ وـالـخـنـانـ وـأـمـاثـلـهـ .ـ كـلـ هـذـهـ اـذـاـ نـتـ فـيـ تـفـلـتـ عـلـىـ صـفـةـ مـحـبـةـ الذـاتـ وـلـمـ الـوـلـدـ اـنـ يـعـمـلـ وـيـفـتـكـرـ لـغـيرـهـ وـلـوـحـيـاـ .ـ وـيـجـبـ اـنـ يـمـنـ الـاـولـادـ مـنـ حـضـورـ الـافـراحـ وـالـاجـمـاعـاتـ فـيـ الـكـنـائـسـ وـالـمـرـاسـحـ لـثـلـاـ نـتـيـجـ اـعـصـابـهـ فـيـ صـابـونـ بـالـارـاقـ فـيـ نـوـمـهـ .ـ وـلـاـ بـأـسـ اـذـاـ كـانـوـ يـتـرـدـدـونـ يـاـ هـاـ فـيـ اـوـاـخـرـ سـيـ الـحـدـاـثـهـ وـذـاكـ قـبـلـ وقتـ النـومـ بـسـاعـاتـ قـلـيـلـةـ مـنـعـاـ الـلـارـقـ وـيـمـنـ الـوـلـدـ أـيـضاـ عـنـ مـجـالـسـ الزـوـارـ وـمـحـادـثـهـمـ لـثـلـاـ يـكـونـ مـقـولاـ عـلـيـهـ اوـ يـتـنـادـيـ فـيـ الـبـذـاءـ فـيـ قـاطـنـهـمـ فـيـ الـحـدـيـثـ اوـ يـكـثـرـ مـنـ كـلـامـ الفـضـولـ عـلـىـ غـيرـهـ ذلكـ منـ الـافـعـالـ الـقـيـاسـيـهـ يـاـ بـاهـاـ الـذـوقـ السـلـيمـ وـتـشـجـبـهاـ آـدـابـ الـزـيـارـةـ وـأـصـولـ التـرـيـةـ الـحـقـةـ وعلىـ الـوـالـدـينـ أـنـ يـكـونـواـ قـدـوةـ لـاـولـادـهـ فـيـ آـدـابـ الـحـدـيـثـ وـالـمـائـدـهـ .ـ وـلـاـ يـجـوزـ الـاعـتـادـ فـيـ ذـاكـ عـلـىـ الـخـادـمـ اوـ الـخـاصـنـهـ الاـ اـذـاـ كـانـتـ مـلـهـ بـاـسـالـيـبـ التـرـيـةـ .ـ وـحـيـنـاـ يـلـغـ الـسـنـ الـرـابـعـهـ يـجـلسـ بـجـانـبـ اـمـهـ عـلـىـ كـرـيـيـ عـالـهـ وـلـاـ يـسـمـحـ لـهـ بـالـجـلوـسـ مـعـ الضـيـوفـ الاـ مـقـىـ بـلـغـ السـنـ الـذـيـ يـوـهـلـهـ لـذـاكـ وـتـمـ عـادـهـ ذـمـيـهـ وـهـيـ اـنـ الـامـ تـخـوفـ وـلـدـهـ بـحـكـيـاـتـ الـجـنـ وـالـعـفـارـيـتـ وـمـنـ اـيـسـرـ مـضـارـ هـذـهـ العـادـهـ اـنـ الـوـلـدـ يـنـمـوـ وـفـيـ قـلـبـهـ اـثـرـ مـنـ الـخـوفـ لـاـ يـزـوـلـ طـولـ

الحياة بل كثيراً ما تفضي به الحال الى الاضطرابات العقلية بسبب ما يعلق على ذهنه من اثار تلك الحكايات الخرافية التي تمثل له الوهم حقيقة . وكذلك يجب الاحترام من نحو ينه بالمناظر الفريدة الشكل والالعاب التي تحدث فرقعة واصواتاً عالية بخائفة لما ينجم عنها من الضرر بالصحة وقد نقتل الطفل . ومن الوسائل التي يحسن اثرها في الولد ان يتعلم لكي يألف الحيوانات الغير الضارة كالغirان وبعض الديدان والزيران وان يألف الظلمة ايضاً كا يألف نور النهار حتى يتساوى الاثنان في عينيه ولا يكون ظلام الليل سبباً لحوفه

وأخيراً يبلغ الولد السن الذي يخرج به من ايالة أمه ويدخل في ايالة المعلم . ويوجد طريقة جديدة لتعليم الولاد قبل وضعهم في المدرسة وهي الطريقة المعروفة في لغات الانجليز ( بالكند رجارت ) والمصطلح عليها في هذه الايام لتنوير ذهن الولد وتهذيب اخلاقه وعوائده وذلك باللعب والخطاب قبل الدرس في الكتب

فمن جملة أساليبها انهم يقرنون اللعب بالاغاني والحركات الجسدية التي لا تخلو من معنى يفيد الولد ويلذه . وبالاغاني مثلاً يقلد تغريد الطيور والحركات الجسدية يقلد طيرانها

ويتعلم حروف الهجاء على قطع خشب مزينة بالصور بحيث يتحفظها وتنتفع صورتها في ذهنه من غير خوف من المعلم وعقابه . وقس على ذلك تعلم الاعداد وتقدير الالوان ببعضها من بعض . كل هذه يتمرن عليها الولد وهو يلعب وبهذه الواسطة تزرق معارفه شيئاً فشيئاً وينتسباً ذهنه لقبول العلوم التي تلقى عليه في المدرسة عند ما يبلغ السن الذي يؤهل له لذلك . وقد الفوا لها الكتب العديدة في اغلب اللغات وساروا على هذا الاسلوب الجديد في تعليم اولادهم فصادفوا نجاحاً عظيماً . وطالبت في اللغة العربية كتاباً ترشد الوالدين الى كيفية التعليم على هذا الاسلوب الحديث ف تكون لهم خير معين على تربية اولادهم وتهذيبهم قبل وضعهم في المدرسة وبعد ما يتمرن عقل الولد على الطريق التي تقدم شرحها يوضع في المدرسة

ويمحتس من وضعه فيها قبل السنة السابعة من العمر لثلا تفضي به الحال وهو لم يزل رخص العقل غض العود الى امراض عصبية تضطره الى الاعزال عن المدرسة وتكون سبباً لاطفاء نور حياته العلمية

ويكفي ان يتعلم الولد أربع ساعات كل يوم حتى يبلغ السنة العاشرة من عمره . ولا يجوز ان يرغم على الدرس في البيت لأن ساعات المدرسة كافية ولا ان يضغط المعلم عليه ويشغل عقله بموضع مختلف لا قبل له على تحملها لثلا تنحط قواه العقلية والبدنية وتسلط عليه امراض عصبية على نحو ما سبق بيانه في موضعه ولما كانت البنت قليلة الحركة كان الخوف على صحتها من الامراض المذكورة أكثر منه على الذكور . ولذلك يجب ان تر褚 بدنها ويعنى بصحتها كما يعنى بصحة الذكور

ويمنع الاولاد عن القراءة على نور ضعيف لثلا يكون سبباً لقصر البصر . أما وضع المصباح فالاصلاح ان يكون مرتفعاً عن موازاة العين أو مائلأ الى جهة الوراء ما أمكن حتى لا نقع أشعته على الحدقة مباشرة ويجب ان يتخال الدرس فرات من اللعب لترويض أبدان التلامذة وشرح صدورهم وراحة عقولهم من عنا القراءة والحضر في المدرسة

وسواء كان الاولاد في المدرسة او في مدرسة عالية داخلية فهم في خطر من الامراض المعدية كالحنق والجدري والجي القرمزية والحسبة وغيرها من العلل الخبيثة التي تتشهي في المدارس من ازدحام التلامذة وملامستهم بعضهم البعض في مثل هذه الاحوال يجب ان تتعقل المدارس منعاً لانتشار المرض



## الفصل المثامن

### ١٠) في خدمات الطفل

وتحذرًا من المضار التي تنجم عن مثل هذا الادعاء والجهل فعل الأم ان تتعهد على طيبتها في انتقاء الخادمة الشهرية فهو أعرف بأحوالها وأدرى بمن يلائمه وينبع مشورته في خدمتها هذه هي واجبات الخادمة الشهرية وفي البلدان تمدن نساء كثيرات يعيشن من هذه الحرفة وقد يضيق وقت الخادمة الامينة عن تلبية كل من يدعوها لخدمته ولهذا السبب يعقدون معها وفاقاً قبل الولادة لكي تكون على استعداد تام عند تجيئي الحاض

#### (٢) المرض

اذا أردت ان تغذى الطفل من غير لبن أمه لمانع في صحتها فافضل غذاء له لبن المرض وان تقدر وجودها فيغذى بالصناعة ويجب ان تكون الرضع حائزة على الصفات الآتية :-

اولاً : ان يكون عمرها بين العشرين والثلاثين سنة وعمر طفلها مقارباً لعمر الطفل الذي ترضعه . ولا يجوز ان يكون اكبر منه كثيراً للالا ينقطع افراز اللبن او نقل المواد الغذائية فيه قبل زمن الفطام فلا يستفيد الرضيع شيئاً او بالاخرى يكون في خطر من امراض سوء التغذية كالكساح ونحوه لأن لبن الثدي من الشهر العاشر فصاعداً او اكثر الى السنة الاولى من العمر لا يصلح للتغذية للاسباب التي اوردناها في فصل الرضاع (صفحة ٥٢ )

ثانياً : ان تكون حلة الثدي بارزة تشبه قمع الخياطة وغير مشقة حتى يسهل على الرضيع مسکها ولا تتألم من تشدقها في أثناء الرضاع الامر الذي يزيد بها تهييجاً ويفضي الى ابطال الرضاعة وحرمان الطفل من الغذا وان يكون الثدي صغيراً اخنوطي الشكل ناهداً شديداً في المرض البكر ومرناً في غيرها ويزيد ارتضاء الثدي بعد الرضاعة الا اذا كان دهنها كثيراً فيبقى صلباً قليلاً

الخدمات على اربعة أنواع  
اولاً : الخادمة الشهرية  
ثانياً : المرض  
ثالثاً : الحاضنة او المربيه  
رابعاً : المرضة القانونية

كاهن يتعهدن الطفل في جميع اطوار الحياة التي يحتاج فيها الى اعتناء خصوصي

#### (١) الخادمة الشهرية

هي التي تعهد الطفل في الشهر الاول من ولادته فتعتني باستحمامه وليس ثيابه وتتنام معه في غرفة امه أو غرفة أخرى ملاصقة لها . وليس من واجباتها ان تغسل ثيابها ولا ثياب الطفل للالا ت فهو عن خدمته . على انه يجوز ان تغسل الحفاظ وتعتني بتعذية الام النفسيه المرضع اذا دعت الحال

وعليها ان تبلغ الطبيب الواقع على مراقبة الام ورضيعها كل التغيرات الصحية التي تطرأ على الطفل وهذا ضروري جداً لان صغار الاطفال ولا سيما في الاسابيع الاولى من الطفولة معرضون للامراض فإذا لم يشاور طبيب العائلة عند أقل اخراف يصيبهم فللاشك في انهم يكونون في خطر الموت وقد يبلغ الجهل من الخادمة الشهرية ولا سيما الغير المتعلمة ان تنبذ وصايا الطبيب ظهر يا زعمائنا ان خدمتها الطويلة في تدبير الاطفال تغنىها عن ارشاد غيرها

ويجب ان يكون لبن الثدي كافياً لاشباع الرضيع ويستدل على ذلك بعصر الحلة بعد الرضاع فإذا خرج منها اللبن كان دليلاً على غزارته وكفاءته للتغذية  
ثانياً : ان تكون لينة الطياع صبورة طويلة الازانة لا تهضم لأن الغضب  
يؤثر في اللبن فينقطع افرازه أو يتغير تغيراً يسبب المucus والاسهال والتشنجات  
العصبية وكثيراً ما يتلوط الطفل على ظري أمه أو مرضعه اذا أرضعه في ساعة الحزن  
أو الغبظ الشديد وفي هذه الحالة يجب ان يغذى الطفل بلبن البقر على الطريقة  
التي نقدم ي بيانها في فصل الرضاعة (صفحة ٥٨ و ٥٩)

رابعاً : ان تكون أمينة تشعر بوجانها وخطارة مركزها لكي تغذى بالطفل  
حق العناية ويكون في مأمن من خطر الاهال

والافضل ان تكون المرضع من المتزوجات ولكن وجود المرضع المتزوجة قليل  
جدًا واقل منه الحائز على الصفات التي نقدم ذكرها وبناء عليه لا نرى مانعًا من  
استخدام المرضع غير المتزوجة بل من الحقيقة ان ترتفع عن استخدامها ما دامت متاحة  
الشروط المطلوبة لأن وقوعها في التجربة مرة واحدة في حياتها لا يدل على انها ليست  
أهلًا لهذه الخدمة

ولا يخفى ان الفضل من استخدام المرضع ليس لاجل الاقداء بحسن ادبها  
او اقامه الحد عليها لجريرة ارتكبها واغاثتنا الوحيدة ان يكون لنا ابن بشري يوافق  
الرضيع ولا تستقيم صحته بدونه

على انه اذا وقعت في شراك التجارب غير مررة فليس من يوثق بهن لا  
لتغاثتها الادية لأنها لا توثر على الطفل انتذريه بلينها كما يزعم البعض ولكن من  
كانت كثيرة الخطأ والزلال فهي مهملة وفي الاهال خطر كبير على حياة الرضيع  
وعلى المرضع ان تأكل ما يوافق صحتها وصححة الرضيع من الفداء الباقي  
والسهل الانهضام . ( انظر صفحة ٤٨ ) وان تروض جسمها في الخلاء وتترنم في  
غرفة واسعة طاقة الهواء لأن الهواء المحصور يضعف الجسم ويحيط القوى فنقصر  
المرضع عن القيام بتغذية الرضيع . ولما كانت المرضع في الغالب فقيرة الحال لاتائق

في طعامها فيخشى انها اذا خدمت في بيت الاغنياء تمامًا في الاكل الى حد  
الكثرة وتفضي بها الحال الى سوء الهضم فتسوء صحتها ويقل لبنها واحياناً ينقطع  
افرازه بتاتاً  
ولا يجوز استعمال المنبهات او المقويات للمراضع لأنها غير لازمة والمرضع  
التي تحتاج اليها لاتصلاح للرضاع

### ( ٣ ) الحاضنة او المرية

هي التي تغذى بالطفل في أيام طفولته ومعظم سن حداهته تحت سطيرة أبيه  
ويجب ان تكون ذات خبرة وكفاءة ب التربية الاولاد وحائزة على الصفات التي  
توهّلها هذه الخدمة المهمة كما سنذكره في موضوعه  
ولا يخفى ان اكثر الحواضن في بلاد الشرق او بالاحرى جميعهن على جهل  
تمام من طرق التربية وقوانينها وامع ذلك فمن كثيرين من الناس يسلمونهن أولادهم  
تسليم أعمى لا يحسرون للمستقبل حساباً غير عالمين انهم بهذا العمل افما هم يطفئون  
نور حياة الطفل العقلية والادية

والذي يدعونا الى الاحتراس من تسلیم الاولاد للحاضنة الجاهلة هو ما نشاهد  
من خشونتها وقسوتها وغير ذلك من الاخلاق التي لا توهّلها للتعليم والتهدیب  
وإذا أردت مثلاً من جهلهما فعليك ان تذهب الى الخدائق العمومية كحدیقة  
الازبكية في العاصمة وهناك ترى عدداً كبيراً منهن: ترى الحاضنة الامينة جالسة  
مع الاولاد في ظل الاشجار تلاعفهم وتلطفهم وتحادثهم بما ينور اذهانهم ويجمل  
الزهـة مفيدة لعقدهم وآدابهم وغير ذلك مما تطلبـه أصول التربية الحقة  
وأما الحاضنة الغبية فترى الاولاد في الحديقة كغمـن لاراعي لها يتعرضون  
لحـارة الشـمس الحارقة وإذا فرطـت من الـولد فـارتـه او اـكثرـ من الضـوضـاءـ وغيرـ  
ذلكـ منـ الحـركـاتـ التيـ تـرـتـبـ علىـ لـعبـهـ صـاحـتـ فـيهـ صـيـحةـ الغـضـبـ وـبـادرـتهـ  
بـالـشـائـمـ وـالـتوـبيـخـ حـتـىـ تـلـقـيـ الرـعـبـ فـيـ قـلـبـهـ وـكـثـيرـاـ مـاـ تـنـتـادـيـ فـيـ المـخـشـونـ فـتـضـرـ بهـ

على يده ووجهه ورأسه وهنا وهناك ضرباً مولماً هي أحق به وأولى وقد كثر ما شاهدناه وشاهده غيرنا من مثل هذه الاعمال البربرية التي تأتيها الخادمات سواء كان في البيت او في الشوارع او في المزارع فلينبه الوالدون رحمة بأولادهم وليحيثوا عن حاضنة أمينة ذات خبرة وكفاءة بالتربيه وضمير حي يحثها على الاعتناء بالأولاد حق العناية . وإذا تعذر وجودها فلا أقل من أن يكون للأبوين يد في التربية واطلاع على اعمال الحاضنة التي تتعهد أولادها فيوافيانها بالتصح والارشاد حتى تشعر بواجباتها وتربي فيها الخلال التي تؤهلاها هذه الخدمة المهمة

ومن جملة الشروط المطلوبة في الحاضنة ان تكون سليمة من الامراض كاسل والسفكس (التشوش) وغيرها من الامراض الوبيلة وهذا الامر منوط بالطبيب فيجب الاعتماد عليه في هذا الشأن

ومن الامراض المكرورة الزكام الانفي ورائحة النفس الكريهة وكذلك رائحة العرق المزعجة . نعم ان هذه الامراض لاتمدي الولد الا انها من العيوب الصحية التي تشتت منها النفس وربما لها الطبع

ويجب ان يكون عمر الحاضنة من الثلاثين الى الاربعين سنة لان الشابة وخصوصا الفتاة الصغيرة لا تقوى الطفل لقلة اخبارها وكثيراً ما تلهو عن واجباتها بمقابلة افتيا ومحادثة رفيقاتها كما هي الحال في الواقي هن في مستهل الشبيبة وزهرة الصبا

ولا يجوز ان تكون نحيفة الجسم لذا تتعب من حمل الطفل اذ قد يتلقى ان تحمله ساعات متواتلة . ولا سيمية كثيراً لان السيمية بطبيعة الحركة وقد لا تقوى على حمل جسمها مسافة طويلة فكيف اذا على حمل غيرها فضلاً عن ان الدهن الذي فيها يجعل الحرارة فإذا حملته على ذراعيها او وضعته في حضنها في الايام الحارة سلقنه بحرارة دهنها واضرت بصحته

وعلى الحاضنة ان تكون لينة الطبع بشوشة فرحة تجنب الكلام الحسن

واللافاظ البذرية في حديثها فإذا أعطاها ولد شيئاً بادرته بالشكر بقولها مثلاً « كثُرْ خيرك او شكرأ لك » واذا خاطبته فلا تجعل نفسها في موقف الحاكم الامر بل من الواجب ان تستهل خطابها بالعبارات المصطلح عليها في آداب الحديث كقولها مثلاً « ارجوك » « من فضلك » « اذا كنت ت يريد » وفي الجواب « نعم ياسيدني او ياعزيزي » وما أشبه ذلك حتى ينشأ الطفل على الحديث المذهب من غير تكافف وتصنع

ويشترط ان تكون نظيفة ومرتبة والا فلا يرجي منها ان تقوم بتنظيف الولد وترتيب ثيابه وآشياته ولا سيما اذا كانت في ادارتها غير ولد واحد فانها ولا شك تصرف في واجباتها أياً تفضير

هذا بعض ما يصح لنا المقام بذكره عن الصفات التي تؤهل الحاضنة ل التربية الاولاد وبقى ان نذكر شيئاً عن واجباتها نحو الولد وواجبات الام نحو الحاضنة ان من واجبات الحاضنة ان تتعهد الطفل تحت مناظرة أمّه فتفقد بجمع ما يلزمها من استحمام وتنظيف ولبس الثياب وترتيبها وتصليحها وترميمها وتغذيتها اذا كان يرضع من الزوجة . وعليها ان تأخذه الى النزهة تارة على ذراعيها وتارة على عربة الاطفال ولا يجوز ان تذهب به الى الجيران من غير مشورة أمّه ولا تحمله على كتفها او ظهرها كما تفعل الخادمات في البلدان الشرقية لانه كثيراً مايسقط الولد فتسخح بشرته او ينكسر عظمه او يصاب برض او خلع الى غير ذلك من الآفات . وعليها ان تبلغ سيدتها كل شيء يطرأ على صحة الولد ولو كان حاصلاً من اهالها . ومن واجباتها ان ت quam مع الطفل في غرفة واحدة الا اذا كان ينام مع أمّه فتنعده في الليل عند الحاجة . وحينما يكبر وبلغ السن الذي يوكله للفهم يجب ان تدور ذهنه وتهذب أخلاقه ونقوم سيرته وتدربه على الطاعة والنظافة وآداب الحديث والمائدة على نحو ما سبقت اليه الاشارة في الكلام على التربية حتى يصير رجلاً بالحق اذا شب

واما واجبات الام نحو الحاضنة فهي ان تدفع لها راتبها الشهري في حينه

ولا يجوز أن تستخدمها إذا لم تكن قادرة على ايفاء حقوق غيرها لثلا يقل عنم الحاضنة وتفهي بها الحال الى اهال واجباتها وكذلك لا يجوز استخدامها في الاشغال الخارجية عن حدود وظيفتها التي هي خدمة الطفل فقط ومن الضروري ان يرخص لها باجازة نصف يوم في الاسبوع ويوم كامل في الشهر لقضاء حاجاتها الخصوصية ولا يليق ان تتنقدها في أعمالها بل يجب ان تكون معها على وفاق تام فيما يتعلق بتديير الولد الا اذا كان هناك ما يخالف ذوقها ورأيها فعليها ان تنبه الحاضنة اليه سرّا لاجهارا وباللطف والوداعة لا بصيغة الامر او لهجة يشتم منها رائحة الرئاسة - وما بقي نتركه لحكتها وتدييرها

#### (٤) المرضة القانونية

المرضة القانونية هي التي تلتقي في المريض في المستشفى علماً وعملاً ومارسه في البيوت والمستشفيات بارشاد الطبيب ولا ينفي ان شفاء العليل يتوقف على اجتهاد المرضة وامانتها بل المريض انجع دواء للعليل ان لم تقل هو الطب كله على انه لا يأس في الامراض الخفيفة ات تقوم الام مقام المرضة بارشاد الطبيب الواقع على معالجته . واما في الامراض الثقيلة والطويلة المدة فالاولى ان تتعهد بها مرضة قانونية امينة ولا يعتمد فيها على الام لانها معها كانت خيرة وحاذفة بتمرير الاطفال فليس في استطاعتها ان تجمع حواسها في ساعة الخطر بل كثيراً ما تضطرب افكارها وتغيب عن صوابها فنذهب عن الدواء او تسمع كلاماً من جاراتها العجوز فتعمل بها وتندى وصايا الطبيب ظهرياً فيكون ذلك وبالاً على صحة ولدها

والمرضة ثياب خصوصية تلبسها في أثناء المريض وهي ثوب من الانسجة التي سهل غسلها وغليها في الماء . ومريل ابيض تلبسه فوق الثوب . وحذاء

خفيف لا يحدث صوتاً في أثناء المشي في غرفة العليل . وقلنسوة ( طبوش ) من الشاش الا يض تلبسها على رأسها وهي عالمة المرضة القانونية عليها ان ترتب السرير وتنظف الغرفة و تقوم بجميع ما يحتاجه العليل من دواء وغذاء وغير ذلك مما سندكره في فصل المريض في القسم الثالث من هذا الكتاب


ولا يأس اذا كانت تحضر الغذاء بنفسها اذالم يكن في البيت من يحضره كما ينبغي على انه اذا كان المرض معدياً كالحصبة والدفتيريا فالاولى ان تقيم في غرفة العليل ليلاً ونهاراً وفي وقت النزهة تخرج من الغرفة بدون ان تختلط احداً من البيت لثلا تكون سبباً لانتقال العدوى اليهم . وقبل خروجها يجب ان تفصل يديها بامام حامض الفنيك ( ملحق ٩٢ ) وتغير جميع الثياب التي كانت عليها ومتى شفي المريض نظر الغرفة والاواني والامتعة التي فيها كما سندكره في غرفة المرض في الفصل الثاني

ومن الضروري ان يكون للمرضه وقت كاف للنوم والنزة لاجل راحة جسمها وعقلها لان حصرها في غرفة العليل نهاراً وليلاً يساب من قواها البدنية والعقلية فتقصر بواجبتها بل كثيراً ما تقضي بها الحال الى الشسلط والزلل فتضرك العليل ضرراً كبيراً ان لم تكن سبباً لها كذلك

وبناء عليه يجب على الام ان لا تغفل هذا الامر المهم حرصاً على صحة ولدها واذا لم يكن في استطاعتها ان تنب عن المرضة في اوقات النوم والنزة فيجب ان تستخدم احدى النساء لهذه الغاية . وكذلك من واجباتها ان تعتنى بتنفسية المرضة وغسل ثيابها

وفي الامراض الطويلة المدة يجب ان يكون للعليل مرضستان تتناوبان الخدمة نهاراً وليلاً لانه في بعض الاوقات تضطر المرضة الى السهر على العليل طول اليوم لقضاء حاجاته من غذاء ودواء وكثيراً ما يكون السهر وسيلة لإنقاذه من خطور الموت

ويجب ان تكون حرارة الغرفة على درجة ٦٦ - ٦٨ ميزان فهرنheit .  
وتولد بواسطة كانون ( وجاق ) تصل به مدخنة حمل الدخان الى الخارج .  
ويحترس من استعمال منقل الفحم خوفاً من الاختناق بالغاز ومثل ذلك كانون الغاز لأن  
دخانه يفسد هواء الغرفة فيضر بالصحة على انه يجوز استعماله اذا وضع تحت مدخنة  
تتدلى الخارج بواسطة كوة في الحائط او في احدى نوافذ الغرفة . وتقاس حرارة  
الغرفة بواسطة ميزان الحرارة يعلق في الحائط بعيداً عن النافذة أو الموقف



(ش ٢٨)

منظر الانابيب المطهرة من داخل الغرفة

أما أثاث الغرفة فالأفضل أن يكون من الأنسجة البسيطة المتنية التي يسهل غسلها  
وغلبها وتغرس أرضها بالسجاد ويعلق في جدرانها بعض الصور المفيدة . ولا بأس  
إذا كان فيها عصفور كالكتاري وغيره من العصافير المفردة وزجاجة يوضع فيها  
بعض السمك الاحمر وحوض للزهور والنباتات التي تعيش في الطفل وكراسى  
مختلفة الحجم والزي . وكرسي من خشب تقبع مقعدهه وتستعمل لاجل قضاء  
حاجة الطفل . على ان الزهور سواء كانت في غرفة النهار او في غرفة النوم فلا  
تضر بالصحة الا اذا كانت رائحتها قوية فيخشى عندئذ ان تهيج الاعصاب

وتسبب وجع الرأس

ومن واجبات الخادمة ان تعيني بتنظيف الغرفة حق العناية وتبعد عنها بقايا  
الاطعمة والثياب الملوثة بالمواد الفضلية وكل شيء ذات رائحة كريهة

## الفصل التاسع

### ٢٨) في غرف الطفل

غرفة النهار — غرفة النوم — غرفة المرض

#### (١) غرفة النهار

هي التي تقيم فيها الحاضنة نهاراً مع الاولاد الذين تتعهد نوريتهم ويجب ان  
تكون جافة وخالية من الرطوبة ولهانوافد كافية لدخول الهواء وأشعة الشمس اليها  
ويقدر اتساعها على نسبة عدد الاولاد المقيمين فيها بحيث يكون لكل شخص  
مقدار ٥٠٠ - ١٠٠٠ قدم مكعب من الهواء . أما الطريقة التي تقام بها  
الغرفة بالقدم المكعب فهي ان تقرب طولها في عرضها ثم تضرب الحاصل في  
علوها هكذا : لنفرض ان طول الغرفة ٢٠ قدمًا وعرضها ١٥ قدمًا على علوها ١٠ اقدام  
فيكون الحاصل من ضرب  $20 \times 15 = 300$  ومن ضرب  $300 \times 10 = 3000$   
وهو قياس الغرفة بالقدم المكعب يكفي ثلاثة أشخاص على حساب الف قدم  
لكل شخص

ولا بد من فتح النوافذ نحو بربع ساعة أو أكثر في كل صباح ليتجدد هواء  
الغرفة وتدخلها أشعة الشمس سواه كان الفصل حاراً او بارداً . على ان الاعظم  
في أيام البرد ان يتجدد هواها بواسطة أنابيب توضع في أسفل النافذة على الطريقة  
التي تراها في شكل ( ٢٨ ) فيدخل الهواء بواسطتها الى الغرفة متوجهًا الى ماحتها  
العليا وينتشر فيها بدون ان يتعرض أحد لمجرأه . ولكل أبنيوه مفتاح يتصل  
في داخلاها لاجل تعدل الهواء أو سد مجريه بما لا يقتضي الحال بصمام

## (٢) غرفة النوم

تحفظ حرارة غرفة النوم بين درجة ٦٠ - ٦٥ بيزان فهربت أي أقل من حرارة غرفة النهار بدرجات قليلة لأن الفراش والغطاء يحفظان الطفل دافئاً ولا يلزمه من الحرارة أكثر مما تقدم ذكره . والأفضل أن ينام الطفل في الظلمة لأن النور يسبب الارق ودخانه يفسد هواء الغرفة . على أنه يجب استعمال المصباح بشرط أن يكون نوره خفيفاً بحيث لا تقع أشعته على عيني الطفل فتوقفه أو يفسد هواء الغرفة بدخانه فيضر بصحة المقيمين فيها . وفي (شكل ٢٩) صورة مصباح هرمي الشكل يستعمل في غرف النوم ولو مدخلته زجاج فوقها غطاء كروي من معدن قاتم لانتفذه أشعة النور . وفي الجانب الواحد من الغطاء ثقب ينبعث منه ما يكفي من النور لانارة طريق الحاضنة وقضاء أشغالها . وفي وسطه شمعة طولها قيراطان ومثل ذلك عرضها يحيط بها طبقة رقيقة من الجبس لمنع الحرائق . وتفرش الغرفة مثل غرفة النهار ماعدا الصور والزهور وسائر الامتنع المستعملة لازينة فإنها غير لازمة لعدم نفعها في وقت النوم . أما الثياب وجميع لوازم الاستحمام فتوضع في غرفة النوم أو النهار حسب ارادة الام او الحاضنة القائمة بتربية الطفل



(ش ٢٩) مصباح هرمي لليل

وفي مacula ذلك يجب أن تكون مثل غرفة النهار من حيث اتساعها

## وتجديد هوانها كما سبقت اليه الاشارة

## (٣) غرفة المرض

إذا كان المرض بسيطاً فلا بأس منبقاء المريض في غرفة النوم وأما في الامراض المعديه كالجدري والدقيريا والحسبة والحمى القرمزية وأمثالها فيجب ان يعزل في غرفة مخصوصة ويبعد عن الضوضاء والجلبة وخصوصاً اذا كان المرض يستلزم الراحة والسكون . ولا يجوز ان يخالطه احد غير مرضته ولا بد من ان تكون الغرفة واسعة ليدخلها الهواء ونور الشمس واذا كان العليل يتزعج من النور لعله في عينيه او اضطراب في اعصابه فيوضع بينه وبين النور ستار وهذا ستار يقي العليل أيضاً من مجارى الهواء

أما تجديد الهواء فيتم بواسطة الانابيب المطهرة (شكل ٢٨) وهو خير من فتح النوافذ والابواب وعلى الخصوص اذا كانت المريض مصاباً بالنزلة الصدرية وغيرها من العلل التي يصاحبها التهاب الشعب الرئوية فان فتح النوافذ في هذه الامراض يجلب البرد فتزداد حالة العليل وبالاً

وينبغي ان يكون أثاث الغرفة بسيطاً وأرضها من الخشب تدهن بالفنيش او تفرش بسجاد عتيق يحرق عند شفاء العليل . وتنقف بسج الغبار عن جدرانها وأثاثها بغرفة مبلولة بالماء شيئاً قليلاً وهو أفضل من الكنس أو النفض لانه يثير الغبار الحامل ميكروب المرض فيستقر في المرضية او الخادمة فيعدلها . ويجب ان ان تجعل حرارة الغرفة على درجة ٦٥ - ٦٨ (فهربت) ويوضع السرير في مكان منحرف عن النوافذ خوفاً من مجارى الهواء لانه منها كان بناء النوافذ محكم الالتصاق فلا بد من ان يدخل الهواء من شقوتها نسمات رفيعة يشعر بها العليل الضعيف لشدة حس جسمه في المرض فيكون وبالاً على صحته . واذا أردت ان تهتدى الى مدخل الهواء فأضي الشمعة وعرض نورها لشقوق النوافذ فيثنا تجد النور مضطرباً لاثباتها فهناك يكون مدخل الهواء فاجتنبه وضع السرير في مكان

بعيد عنه

وفي أمراض الزور والخلق ينبغي ان يكون هواء الغرفة رطباً ويتم ذلك باطلاق البخار المائي بواسطة مرشه بخارية (شكل ٣٠) يغلى فيها الماء حتى يخرج منها البخار وينتشر في الغرفة أو ياف السرير بلة ويطلق البخار على العليل رأساً. ويناسب ان يضاف الى الماء زيت التربينينا او زيت اليوكانوس لتصير رائحة البخار عطرية فضلاً عن ان الزيوت المذكورة مضادة للفساد (انظر برق ٩٨) وفي أثناء ذلك يجب ان تزداد حرارة الغرفة لأن البخار ينخفضها ماطوبته

وقد جرت العادة ان ترش الغرفة ببعض المعاليل المضادة للفساد إلا ان البعض منها لا يخلو من رائحة خصوصية يشتمز منها العليل ويكتفي ان يعني بتنظيف الغرفة وتتجدد هواثها ويعمل على باهها ملأة تبل كل يوم بمحلول مضر للفساد (ملاحق ٩٢ و ٩٤)



(ش ٣٠)

واذا وجد في المنزل غرفة أخرى توادي الى غرفة العليل أو ملاصقة لها فتحخص للادوية وأواني الطعام والرضاع وسائل ادوات التمريض ويحدد هواؤها بفتح النوافذ مراراً في النهار

وعلى المريض ان تبعد من غرفة المريض كل ما لا لزوم له وتحترس على ملابسه واشيائه الملوثة لثلا تنقل من غرفة الى اخرى بدون تغيير. ويتم ذلك بتغمسها ببعض ساعات في محلول (ملاحق ٩٢) قبل ان تنقل من غرفة المريض لاجل غسلها. وكذلك الصحن والملاعق والشوك وغيرها يجب ان تغمس بال محلول المذكور حتى تموت الجراثيم المرضية العالقة بها

ومما يحسن اثره في المنزل ان يكون فيه خزانة (دولاب) أو صندوق لحفظ الادوية وسائل المواد الالزمة للمرض حسب الترتيب المذكور في (ملاحق ١١١) وهو ما يسمى بالصيدلية البيتية وثديتها عظيمة جداً. ولا بد من ان يكون في هذه الصيدلية ادوية مختلفة يستعمل بعضها للخارج وبعض الآخر للداخل . ولا يخفى ان الادوية المستعملة للخارج كالمراهم والمرؤفات هي في الغالب سامة فاذا اخذت من الداخل اضرت بالعليل وربما تسمم وكانت سبباً لحالاته . ودفعاً مثل هذه المخاطر يجب ان يلتصق على الزجاجة السامة ورقة حبراء لتمييزها عن سواها من الزجاجات الغير سامة . على ان هذه العلامة قلماً تفي بالغرض المقصود لاده كثيراً ما تكون الام او المرض منشغلة بالبال او تضطر الى الدواء في الظلمة فلا تأمن الغلط . وبناءً عليه يجب ان يكون للزجاجة السامة علامة اوضح وذلك بان يربط في عنقها سلسلة تتصل بطرفها السائب كرة من خشب وبهذه الطريقة تمييز بالبصر والمس سواء كان الوقت نهاراً او ظلاماً

ومن الضروري ان تتفعل خزانة الدواء بالمفتاح ويوضع بعيداً عن صغار الاولاد لأنهم كثيراً ما يقلدون الطيب او المريض في الشربون الدواء او يسقونه الى اولاد آخرين وهو كثير الحدوث وخطره كبير على الحياة

ومعنى شفاعة المريض يجب ان تبعد جميع الادوية عن بصره لثلا يُؤثر في منظرها ثم تغسل ارض الغرفة بمحلول (ملاحق ٩٢ و ٩٦ و ٩٧) وكذلك السرير وادوات الطعام ما عدا الاولاني المعدنية فيحترس من غسلها بالسليمانى لثلا يتغير لونها وتفقد جديتها . واما جدران الغرفة فتبييض بالجير او تدهن بالبوية حتى تزول اسباب العدوى وما يقي من الالاث والفرش والخاد والاشياء التي لايسهل غسلها يجب ان تظهر بغاز الكبريت وذلك بان تغلق نوافذها جيداً ويحرق فيها مقدار ثلاثة ارطال مصرية من الكبريت العاومي بكل الف قدم مكعب في الغرفة (راجع غرفة النهار لمعرفة القدم المكعب) وطريقة العمل ان تضع الكبريت في وعاء من الصفيح وقزجه بالسرير ثم تضع الوعاء في دلو ما

(جردل) وتقد الكبريت وتغلق الباب وتسد مدخل المفتاح بنديل او قطعة قطن حتى لا ينفذ الغاز منه وبعد سنتين تفتح الغرفة ولا يأس اذا كان يعاد تطهيرها من وقت الى آخر حتى لا يبقى للجرائم المرضية اثر فيها والطريقة الثانية ل التطهير هي غاز الفورمالين يطلق في الغرفة بواسطة قنديل خصوصي يماع في الصيدليات الكبيرة وهو افضل من الكبريت لقتل جرائم المرض. هذا ما يجب اجراؤه في الامراض العدديه واما في الامراض البسيطة فلا يحتاج الى التطهير ولا الى غرفة ثانية واملأة على الباب

### القسم الثالث

في تدبير الاطفال والاحاديث في المرض

## الفصل الاول

في تعریف الاصطلاحات الطبية

لا يخفى ان للاطباء اصطلاحات في تعریف الامراض نذكرها شهلاً الفهم وهي

الغشاء المخاطي - هو الغشاء الذي يبطئ الفم والانف والمعى ويرشح من سائل

الزكام - ارتجاع يسيل من الغشاء المخاطي كالزكام المعوي في الاسهال وزكام الانف في النزلة الانفية المعروفة بالرشح

الاعراض - هي علامات المرض كارتفاع حرارة الجسم وسرعة النبض عن معدتها الطبيعي

المرض الحاد - وتحت الحاد - والمزمد - المرض الحاد هو الذى ظهر

اعراضه فجأة بسرعة زائدة وتكون شديدة . واذا كانت الامراض ابطأ في سيرها وأخف في شدتها فيقال له تحت حاد أو بطيء وهو الاصلح . والمرض الذي نطول مدهه وتسرع اعراضه يبطو . يسمى مزمنا

»(الاختلالات)« - أحوال مرضية ترافق احياناً مرضآ آخر ليست من حقها ان تكون معه كأن يختلط السل بنزف الدم من الرئتين أو الحمى التيفويدية بنزف الدم من المعى أو نقرح وتنتفب من شدة الالتهاب

»(الاسباب)« - منها خارجية تنشأ عن السموم أو الجروح ومنها عاديه تحدث من تغيرات الفصل وقد تكون وراثية كانتقال الاستعداد لقبول المرض من الوالدين الى أولادهم . ونوعية كتمس الدم بالميکروبات المرضية كما في الهواء الاصفر والحمى المalarية المعروفة بالدورية . ومنها العرق كحدث الاسهال في الاطفال وأمراض القلب في الشيوخ ومنها أسباب مهيبة كالخوف والبرد . وثنوية تأتي على اثر علة اخرى

»(ميکروبات المرض)« - الميكروب حيوان صغير لا يرى بالعين المجردة يدخل الدم عن طريق الانف أو بواسطة الطعام وماه

»(مضادات الفساد)« - هي الادوية التي تقتل الميكروبات المرضية اما من الجروح بنسليها مثلاً ب محلول حامض البوريك أو من اليدين أو الثياب بتقطيعها في محلول الساليفاني أو محلول الفينيك

»(تشخيص المرض)« - هي معرفة أسبابه ومقره ومدته وطبيعته وتميزه عن سائر الامراض المشابهة له في الاعراض

»(الانذار)« - هو الانباء بنتيجة المرض كأن يكون سليم العاقبة أو وخيمها

»(العلاج)« - الفرض من المعالجة ان تستأصل المرض أو تخفنه أو تمنعه ولا يقوم هذا باستعمال العقاقير الطبية وحدتها بل ببراعة قوانين الفناء والصحة للوقاية من المرض

»(يوم المرض)« - يعني بذلك اليوم الذي يظهر به أول عرض من الاعراض

**﴿الكورتيانا﴾** — هي المدة التي يعيش فيها المريض وينع في اثناءها عن مخالطة الناس خوف العدوى وفي الطب اصطلاحات اخرى للفاطات الجلدية نشرح اشكالها لكثرة عبيتها في الكلام على الامراض وهي **﴿الحوبيصة﴾** — نقاط صغيرة مرتفع عن سطح الجلد قليلاً ومتى لا سائلة مائياً صافياً **﴿الحليمة﴾** — حلقة صغيرة او تو، اجر على شبه الحلة مرتفع قليلاً عن مساواة سطح الجلد **﴿البيرة﴾** — عبارة عن حويصلة او حليمة ملائمة قيحاً **﴿البهق﴾** — بقع تختلف في لونها عن لون الجلد وليس لها ارتفاع

## الفصل الثاني

### — في دلائل المرض —

الوجه — الجلد — مركز الجسم — الاشارات — الرأس الصدر — البطن الصراح — السعال — التنفس — النبض — حرارة الجسم — اللسان — صرير الاسنان — الرضاع والبلع والشرب — البول — البراز — الشهوة — القباء

تكلمنا في الفصل الثاني من القسم الاول عن دلائل الصحة وتعيناً للفائدة نذكر الان ما يقابلها في المرض لكي تكون الام على بصيرة عند اقل المحراف يطرأ على صحة ولدها فتداركه بما عندها من وسائل الشفاء التي يحيى لها الطبيب استعمالها

التي تندد بحدوث المرض كقولنا اليوم الاول واليوم الثالث الخ. واليوم عبارة عن ساعه يتذى من نصف الليل الى نصف الليل حسب الطريقة المصطلح عليها في تقسيم الاوقات . مثلاً . اذا اظهرت أول علامه من المرض في الساعة العاشره بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ١٣ الشهر فال يوم الثاني من المرض يتذى من نصف الليل التالي الذي هو يوم الاربعاء الواقع في ١٤ الشهر وذلك بعد ساعتين من تاريخ ظهور أول علامه من علامات المرض

**﴿الحضانة﴾** — لابد لكل ميكروب من مدة معلومة قبل ظهور فعل سمه في الجسم . وهذه المدة أي من دخول الميكروب الى ظهور اعراض المرض يقال لها حضانة كالجدري مثلاً فان الميكروب يدخل الجسم وبقى كامناً فيه من ١٠ — ١٤ يوماً قبل ان تظهر اعراض العلة

**﴿طور الهجوم﴾** — هو الطور الذي يشعر به المليل باختلال الصحة يتذى من متهى طور الحضانة الى ظهور الاعراض المميزة ( كالنفاط في الجدري او الصياح في الشهقة ) وتختلف مدهه باختلاف العلل ( انظر الجدول في فصل الامراض العقنية )

والاعراض التي تظهر في هذا الطور مثل ارتفاع حرارة الجسم وسرعة النبض الخ تعرف بالامراض المنددة وهو اليوم الاول من المرض

**﴿طور الاعراض المميزة وطور النفاط﴾** — يتذى من متهى ظهور الهجوم وفيه تظهر الاعراض المميزة للعلة كالنفاط في الجدري والحسبة . والصوت الشهيقي الذي يشبه صياح الذيل في الشهقة . ويقال له في الحيات النفااطية « طور النفاط » والحيات النفااطية هي التي يراقبها نفاط جدي كالجدري والحسبة والقرمزية ( انظر الامراض العقنية )

**﴿طور النقاهة وطور التشقش﴾** — هو الذي تزول فيه اعراض المرض ويتجه العليل الى الصحة ويقال له في الحيات النفااطية طور التشقش او التفشر لأن النفاط يزول عن الجلد بتقشره

أو تدعوا الطبيب فيعالجه قبل بلوغ العلة درجة الخطير

فن أمثل ذلك ان الولد المحموم أو الموجوع لا يستقر على حال من القلق  
فيهيل ان تحمله امه على ذراعيها وتجول به في أرض البيت . وفي الامراض  
الطوويلة المدة يستقر على ظهره ويشخص بصره الى السقف وهو دليل على الخطاط  
القوى . وفي مرض الكساح يرفس النطاء برجليه على الدوام . وإذا بكى ثم نفثه  
من جنب الى آخر ولم يسكت فذلك دليل على انه لم يزل متائماً . وإذا  
فتح الطفل فه وهو نائم والق رأسه الى الوراء فهو مصاب بالتهاب اللوزتين  
المزمن أو علة اخرى في المسالك الرئوية التي يعسر فيها التنفس . وفي التهاب  
الدماغ يلقي رأسه أيضاً الى الوراء وأحياناً ينام على جنبه ويقوس ظهره ويطوي  
رجليه ويضع يديه على صدره مصابةً . وفي وجع العينين يتالم من التور فيستر  
وجهه في الخدأ أو في حضن أمه

**(دلائل الوجه)** - اذا لم ينقبض الطفل عينيه تماماً وهو نائم أو يقي ياضها  
ظاهراً فذلك علامة امراض المعدة الحادة والمزمنة . وتشاهد هذه العلامة  
أيضاً في علل التنفس وسائر الامراض الشديدة  
وفي وجع الرأس ينقبض الحاجبان وتتجدد الجبهة . وفي الامراض الرئوية  
الشديدة يتتخن الاف ويضطرب عند مدخله من ضيق التنفس وسرعته وهي  
علامة ردية تذر بالخطير

وفي امراض الكلى ترم الانسجة حول الجفن الاسفل من العينين . وفي  
الاسهال الشديد يتجمد الوجه وتتور العينان . وفي امراض المعدة والمعى يتسم  
الطفل في نومه وال العامة تقول انه يكلم الملائكة

**(الجلد)** - يصفر الجلد في اليرقان ويزرق في مرض القلب والرئتين  
وخصوصاً حول الشفتين . ويصير لونه تراياً في الاسهال المزمن . وأيضاً ضارباً  
إلى الصفرة في مرض الكلى والسل والكساح وغيرها من الملل التي يقل فيها الدم  
**(مركز الجسم)** - اذا كان الطفل قلقاً لا يثبت في مكانه ولا في فراشه

ولا يسكن اضطرابه الا اذا حمله امه على ذراعيها أو هزت سريره أو أقعدته  
على ركبتيها فهو دليل على ان المرض مصحوب بالشديد . وان كان الطفل  
لا يستريح في نومه الا اذا الق رأسه وكتفيه على مخدة عالية او كان يعمد ظهره  
بالخاد فهو اما ان يكون مصاباً بالختاق ( الدغيريا ) او مرض القلب او الرئتين  
لان التنفس يضيق في هذه الامراض فيجد العليل بعض الراحة برفع رأسه  
وكتفيه على نحو ما سبق بيانه

**(الاشارات)** - في وجع الرأس يشير الطفل يده الى رأسه وفي وجع  
الاذن يضعها قرب اذنه . وفي الثمين في فمه . وفي الديدان المغوية يجده مقعدته  
وقبل حدوث التشنجات العضلية المعروفة عند العامة بالرجفة أو هزة الحيط يحر  
عينيه ويثنو ايديه ورجليه ويرفع جفنيه . وقد يحدث التواء الابهام في  
حالة الصحة ولذلك يجب التدقيق في تشخيص العلة خوف الوقوع في الغلط  
**(الرأس)** - يعرق الرأس عرقاً غزيراً في مرض الكساح والهيدرسفلوس  
( ما في الدماغ ) وتكون قته في الاول مسطحة وفي الثاني كروية ( شكل ١ و ٢  
من صورة ٤ ) ويکبر اليافوخ في كلها وينبض في التهاب الدماغ

**(الصدر)** - ثبت الفسحات بين الاضلاع في عسر التنفس ويتتنفس الصدر  
وبرم من جانب واحد في دائرة الجذب ويكون بازرزاً مثل صدر الطير في امراض  
الحلب الشوكي

**(البطن)** - يتصلب البطن ويتطبل في المغص ويتنفس في الاستقاء او  
من تجمع الغاز في الامعاء

**(الصراخ)** - يصرخ الطفل من الجوع ويكون صراخه حاداً في وجع  
الاذن ومثل ذلك لو وخرته ابرة أو دبوس أو كان فيه مرض جلدي مصحوب  
بحكة دائمة . ولا يستفاد ان كل صراخ يكشف بعد الرضاع يكون سببه الجوع  
فإن صراخ المغص أيضاً يخف على اثر الرضاع لكنه لا يلبي أن يعود بعد قليل  
من الوقت كما اسفينا ذكره في فصل الرضاع

والبكاء مع نقطب الحاجبين يدل في أثناء السعال على ألم في الصدر . وقبل البراز أو بعده على ألم في الامعاء . وإذا كان الصوت مصحوباً بآخونة فالعلة في الانف أو بحة في الحنجرة . وكثيراً ما يبح الصوت من كثرة البكاء .  
يئن الطفل ولا يبكي بكاء صريحاً في الامراض القوية التي يسر فيها التنفس كداً، العجب والنيومونيا (التهاب الرئة) وإذا انقطع الدمع في المرض من بعد الشهر الثالث أو الرابع من العمر فالخطر شديد على العليل وعوده دايل حسن

وبكي الطفل الضعيف والمختلط القوى عند أقل سبب ويقاد بكلاده يكون متواصلاً . ويصرخ في عسر التنفس صراخاً قصيراً وفي المغص صراخاً فجأة ثم يسكت ويصرخ ثانية ويستمر على هذه الحال الى ان تزول العلة على اثر دفع الاماء او افلات الفازات منها

وإذا بكي عند ادخال الطعام الى فه فاما ان يكون في الطعام شيء واخز  
أو التهاب أو نقرح في فه يومئذ ويخرج فيه البكاء  
وفرك العينين مع البكاء دليل النعاس

﴿السعال﴾ - يكون السعال أبجح في امراض الزور كالصوت فيها. واذا كان الطفل يسعل سعالاً جافاً في اوله وطرياً في آخره ولا يشعر مع السعال باللم في صدره فهو مصاب بالبرونشيت أي التهاب المسالك الهوائية في الرئتين والعلامة الاخرة تنبئ بزوال الملة. وقد يحدث السعال من تلك المعدة والامعاء والتهاب الاذن والاذف وهو قليل جداً وقد يكون عادةً في كثير من الاطفال والاحdas

» التنفس « - يزيد التنفس عن معدله القانوني في الحيات الشديدة ووجع البطن والنیومونیا (التهاب الرئتين) وقد يتنفس كبار الاطفال في العلة الاخيرة نحو ٦٠ مرة في الدقيقة ولا خوف على الحياة الا اذا بلغ عدد التنفس نحو المائة فصاعداً وقد ينحط الى ٨ - ١٦ في الدقيقة وذلك في الپیدروسمفلاوس المزمن

والتهاب غشاء الدماغ الدرني والتسسم بالايفيون  
والتنفس من الفم يدل على التهاب غشاء الانف المخاطي أو على وجود  
أجسام غريبة تسد الانف فتمنع مرور الهواء فيه . و اذا رافق التنفس خرا خر بدون  
سعال دل ذلك على وجود مخاط عالق في مؤخر الحلق  
وفي التيومونيا والدفتيريا والازما (الربو) تستدحر كات التنفس كثيراً فيصعد  
الصدر ويحيط وتحفظ حفرة رأس المعدة والفسحات بين الاضلاع . وينتفخ  
الانف ويضطرب عند مدخله بسرعة زائدة

«النبض» - يختلف في سرعته باختلاف الامراض في الحمى القرمزية مثلاً ينبع نبض نحو ١٦٠ نبضة في الدقيقة ولا خوف من ذلك على العليل واما اذا بلغ في الحصبة هذه الدرجة فالخطر شديد على الحياة . وهو بطبيعة الحال التهاب الكلية وغير منتظم في امراض الدماغ والقلب وفقر الدم

» حرارة الجسم « - ذكرنا في الكلام على دلائل الصحة طريقة قياس حرارة الجسم وزنيد الان ان حرارة الطفل قد ترتفع عن درجتها القانونية عند أقل انحراف يطرأ على صحته فتفاقم الام بسبب ذلك فلتاً زائداً مع ان هذه الحالة لا تستوجب الحوف والاضطراب لان الطفل اذا برد قليلاً أو تناول طعاماً ثقلياً على معدته أو اصابه امساك قد ينجم وترتفع حرارة جسده الى درجة ١٠٣° بغير ان فهرنهيت ( $\frac{1}{3} \times 39$  سنتكراد) وهي درجة متوسطة . واذا بلغت ١٠٤° او ١٠٥° ( $\frac{1}{3} \times 40$ ) فالحى قوية او ١٠٧° ( $\frac{1}{3} \times 42$ ) فالخطر شدد جداً على الحياة . على ان الخطر من الحى لا يتوقف على شدتها فقط بل على طول مكتها ايضاً فان العليل يتحمل الحى على درجة ١٠٥ مدة قصيرة من الزمان وأما اذا

طال مكثها فتتحط قواه ولا ينجو من آفاتها الا القوي الجسم  
وتخالف حرارة الجسم في سيرها باختلاف الحيات في المساء تكون غالباً  
أقل من الصباح واذا صارت الحرارة في الصباح أعلى من حرارة المساء السابق  
فالخطر شديد على العليل . وكما ارتفعت حرارة الجسد درجة واحدة زاد

النبض من ٨ - ١٠ نبضات والتنفس من ٢ - ٣ تنفسات في الدقيقة . وقد تختلف هذه النسبة باختلاف الحميات والأعماres .  
وإذا هبطت الحرارة بخفة إلى الدرجة الطبيعية فذلك دليل على زوال الخطر والتجاة العليل إلى العافية بشرط أن تكون باقي اعراض المرض آخذة بالتحسن .  
أيضاً والاً فهي علامة غير محمودة . وقد تربط إلى ما تحت الدرجة الطبيعية حتى تبلغ ٩٧° أو أقل من ذلك يميزان فورهنوت وهي علامة ردية وإذا هبطت إلى درجة ٩٥° فالمريض في خطر شديد ولا يرجى شفاؤه .  
وتنخفض الحرارة في جميع الامراض التي تحطّن القوى كالاسهال الشديد والتي المستعصي ونزف الدم وأمراض القلب والرئتين المزمنة .  
وتشاهد مخفضة أيضاً في طور النقاوة بعد زوال الحمى لكنها لا تثبت قليلاً من الأيام حتى تعود إلى درجتها المقررة .

**﴿السان﴾** - يبيض اللسان وتتحمر حوافيه في الامراض المعدية ويحمر في الحمى القرمزية فيصير لونه كلون الكبوش الحمراء (التوت) ويصفر في الضعف الزائد وسوء الهضم . ويحيف في الحيات التي يطول مكثها ويكون مائلاً إلى الزرقة في الشفقة . وفي القلاع يشاهد عليه قطع يضاء متفرقة منظرها مثل منظر اللبن الجبن .

**﴿صرير الاسنان﴾** - يدل صرير الاسنان على الديдан المعدية واقتراب التشنجات العضلية المعروفة بالرجمة او هزة الحيط . ويكثر في طور التسنين وأمراض الدماغ وقد يكون في البعض عادة .

**﴿الرطاع والبلع والشرب﴾** - اذا رضع الطفل نحو دقيقة ثم ترك الحلمة باكي او بكى عند ادخال الاصبع الى فمه فذلك دليل على التهاب الفم وإذا كانت العلة في الزور فيليع بصعوبة وتبدو على وجهه علامات الالم ولا يرضع عندئذ الا ما يكفي لسد جوعه . أما في الاحداث وكبار الاطفال فيعرف وجع الزور من شربهم الماء جرعات متقطعة ورفضهم الاطعمة الجامدة لما يحدث بسببها من الالم عند بلعها .

ولذلك يفضل العليل الطعام السائل كالبرق واللبن . وإذا كان العليل مصاباً بالنيومونيا (التهاب الرئتين) أو البرونشيت (التهاب الشعب الرئوية) أو غيرها من الامراض التي يسر فيها التنفس فيرغم مصات قليلة بسرعة ثم يتراك الحلمة لكي يتنفس وتشاهد هذه العلامة في كبار الاطفال عند شربهم الماء .  
وإذا كان الطفل مثلاً بالمرض وامتنع عن الرضاع بتاتاً وشوهد في عينيه حول خاليته تذر بالخطر . وان شعرت المرض بسخونة حلمة الثدي في اثناء الرضاع فيشخص فم الرضيع فإذا وجد على اللسان قطع يضاء منظرها مثل منظر قريشة الجبن فالطفل مصاب بالقلالع (القالوع) وربما تخف الام خوفاً زائداً لأن القالوع على رغم العامة يقمع الولد مع انه ليس في هذا المرض شيء من الخطرا الا اذا نقرح الفم وامتد النقرح الى الحنجرة وهو نادر جدًا .  
وإذا ادخلت الاصبع الى فم الرضيع وهو في حالة الصحة في المصه مصاباً شديداً .  
واما في الامراض التفيلة فتنقص قوة المص وعودها علامة حسنة .  
**﴿البول﴾** - يتكلّف البول ويغمق لونه في بعض امراض سوء الهضم الشديد وإذا كان غامقاً كثيراً وترك في قاع الوعاء راسبًا مبيضاً او محمرًا فهو علامة سوء الهضم الحاد اما زكمي او ثنيوي لعلة اخرى من الحيات الحادة .  
ويصفر البول جدًا في البرقان فيصبح الحفاظ بلون زعفراني . ويكتد او يتذكر في امراض الكلي . وإذا شعر الطفل بالألم في اثناء التبول فذلك دليل على التهاب مجرى البول او تضيقه او زيادة الحامض فيه او وجود حصوة في المثانة .  
**﴿البراز﴾** - يكثر البراز في الاسهال ويقل في الامساك فيكون في الاول مائماً وفي الثاني جامداً صلباً . وإذا كان الطفل يبرز طعاماً غير منهضم ومواد مائعة وجامدة مما ومزوجة بعادة يضاء على هيئة قريشة اللبن فذلك دليل على اذقال المعدة بالطعام وتقصيرها عن هضمها سواه كان الفداء من لبن الثدي او من زجاجة الارضاع . ويسود البراز من بعض الادوية كالكلورال والخديد والبرمودت . ويشاهد مسمراً ومحظطاً بمواد مخاطية في الاسهال الحادث من

زكام معي . ويرافقه دم وقطع من غشاء المخاطي في الحمى التيفودية والزنطاري وسائر الامراض التي تترجح فيها الامماء . ويكون اخضر مائلاً الى الصفرة وحامض الرائحة في الاسهال الناشي عن الاطعمه الريحه وكريها في الاسهال الز Kami والسل المعي . ويتغير لون البراز من الديدان الموعية

﴿ الشهبة ﴾ - (القابلية) تفقد شهية الطعام في القياد والحراف الهضم الموي الحاد . وتزيد من الافراط في الاكل لان الطفل اذا أكل فوق شبعه قصرت معدته عن هضم الطعام . ومعلوم انه اذا لم ينهض الغذاء قاماً فلا يتحول الى دم لتفذية الجسم ونفسيته . وعليه فلا يستفيد الولد شيئاً من الاكل بل يبقى جائعًا مع انه يأكل كثيراً لان المول على ما يأكله الطفل وينهض في معدته ويتحول الى دم ينفذ ويفويه

﴿ القياء ﴾ - واعراضه مثل اصفرار الوجه وتلاشي القوى والضعف . وافراز اللعاب بكثرة زائدة . كل هذه تشاهد في امراض المعدة والامعاء والرئتين والدماغ وداء الجنب وبعض القيادات الفيروسية والخصبة

ومن العلامات المول عليها نوع المواد التي تندفع المعدة فإذا كانت مزوجة بحادي مخاطية فيقال للمرض زكام معدى لأن المعدة ترشح سائلًا من غشائها المخاطي كما يرشح الانف في الزكام المعروف بالرشح او النزلة الانفية . وإذا ثنياً الطفل مواد مجينة وطعمها منضمًا مائماً حامض الرائحة فهو مصاب بالدسيسيا اي عسر الهضم الذي يكثر فيه تكون الحامض واحتقار الطعام . ونفيه الديدان يدل دلالة صريحة على وجودها في المعدة

## الفصل الثالث

### ٢٥٠ في تهريض الاطفال

التهريض هو الاعتناء بالمريض . والمرضة هي التي تعتنى بالمريض تنافي هذا الفن في المستشفيات وقارسه بارشاد الطبيب في بيت المرضى . وكثيراً ما توقف حياة العليل على امانتها وحسن ادارتها وتدبرها

وما كان يعز على السواد الاعظم من اهالي هذه البلاد وغيرها من البلاد الشرقية التوصل الى مرضية متعلقة تبعد اولادهم في مرضهم رأينا أن نذكر لام شيئاً من اصول التهريض وبذلك تكون اكبر مساعد للطبيب على شفاء العليل ولا يخفى ان تهريض الصغار أمر شاقٌّ وخصوصاً اذا كان الولد عنيداً لم يتدرّب على الطاعة فيرفض الغذاء ويعتنى عنأخذ الدواء . في مثل هذه الاحوال يجب ان تبذل المرضية ما عندها من وسائل اللطف لإقناعه او استمالته بالدراما والصور وغير ذلك مما يسر الاطفال ويرضي صغار الارواح

واذا لم يقنع اللطف فلتله بخلافة حول يديه ثم تسد افنه باصبعيهما فيفتح الولد فه لكي يتنفس وعندئذ تدخل ملعقة الدواء الى فمه وتفرغها عند قاعدة اللسان ثم تسحبها على مهل بدقة وامان

اما الطفل الصغير فيفتح فمه بالضغط على ذقنه الى الاسفل ولا يجوز ان يسبق جرعة الدواء دفعة واحدة لثلاثيني . فمه فيقيها

واذا كان الولد مشكلاً بالمرض فالافضل ان ينقط الدواء من جانب الفم بقطارة من زجاج (شكل ٤٤) ويخترس من ادخالها بين اسنانه لثلا يغضها فتشكس وتحرجه

ومن الامور التي يجب مراعاتها ان لا تخندع الولد بالكلام فنقول له مثلاً

هذا الدواء حلو وهو مر لثلاثة نقل ثقته يكفي فلا يصدقك في المرة الثانية  
**» كيفية شرب الادوية «** - ان اكثرا الادوية كريهة الطعم وتبقى  
 كذلك على رغم ما يبذله الطبيب والصيادي من الاجتهد لتحسين طعمها . ومن  
 الوسائل المستعملة لاخفاء طعم الدواء عند شربه هي ان يأخذ العليل قليلا من  
 البن او عصير البرتقال او ماء المعناع قبل الدواء او بعده

**» شرب زيت الخروع «** - يضاف الى زيت الخروع ماء الصودا  
 او عصير البرتقال او قليل من الكويناك ويترك في الوعاء حتى يطفو على وجه  
 الزيت فيهون شربه . او يضاف اليه قدره من البن ويكسر بالملعقة نحو  
 خمس دقائق او اكثر حسب الازوام ثم يخلب بالسكر فيختفي طعمه . وصفار الاطفال  
 يتناولونه بقبول قائم

**» الدواء المسحوق «** - اذا كان المسحوق عديم الطعم فيؤخذ بوضعه  
 على اللسان وشرب الماء بعده او يمزج مع الطعام بدون ان يشعر به العليل او  
 يوضع في الملعقة بين طبقتين من السكر الناعم ثم يرطب بالماء حتى تumasك اجزاء  
 السكر ويصدر المسحوق كأنه في غلاف صلب كالملبس

**» الدواء الحامض «** - يغسل الفم بماء الصودا قبل تناول الدواء الحامض  
 منعا للضرس

**» الحبوب «** - قد يصعب بلع حبوب الدواء على الاولاد ولذلك يحسن  
 ان يتمرنوا في صغرهم على بلع حبوب من اب الحبز حتى يسهل عليهم ابتلاع  
 حبوب الدواء عند الحاجة

**» جرعة الدواء «** - يعطي الدواء اما بالنقطة او بالملعقة ولاجل تحديد  
 مقدار جرعته يجب ان يكون في كل بيت قطارة ومكيال زجاج (شكل ٤٤ و٤٥)  
 فالاولى لاجل النقط والثانى لاجل تحديد جرعات الدواء وتطبيقها على الملاعق على  
 اختلاف حجمها كما ترى في (ملحق ١١٠ و ١١٨)

**» تغذية المريض «** - يخفف الطعام في بدء المرض والافضل ان يقطع

باتانا في القى ، والاسهال نحو ١٢ ساعة او اكثرا الى ٢٤ ساعة ويتناول العليل في  
 اثناء ذلك ماء الشعير (ملحق ٢) او ماء الزلال (ملحق ٣)  
 وقد يفقد العليل شهية الطعام فتصعب تغذيته وفي مثل هذه الحال يقدم له  
 الابن في وعاء صغير كفنجان القهوة مثلا حتى لا يتوجه ان الطعام كثير فيرفضه .  
 وقد يقبل الطعام اذا أضيف اليه قليل من الملح أو تناولت منه المرضية امامه او  
 أعطي له عند ما يطلب شربة ماء . ويجب ان تراعى في تغذية المريض القوانين  
 الآتية وهي :-

اولاً : ان يداوم على طعام واحد بدون تغيير وذلك في امراض المعدة والمعوي  
 والجي التيفودية . ثانياً : ان يقلل او بالاحرى يمنع الطعام في بدء المرض . ثالثاً :  
 اذا تقيا العليل على اثر الطعام فيجب ان يوقف ويشاور الطبيب . وفي القسم الاول  
 من الملحق في آخر هذا الكتاب مجهزات صناعية تفيد المرضى فائدة عظيمة  
 (الماء) - يزعم كثيرون من الناس ان الماء يضر العليل فلا يسقونه  
 كفافة مع انه من افضل وسائل الراحة في المرض ولا سيما المتأوج في الحيات  
 بشرط ان لا ينوب مناب الطعام

**» النوم «** - يحفظ العليل ساكنا في فراشه ولا يزوره أحد في غرفته  
 الا مرضته او أمه . وتنعيم الحركة والجلبة في البيت على قدر الامكان لأن الصغار  
 مثل الكبار يتاثرون من الضوضاء والصرانع والطاقة و لكنهم لا يستطيعون  
 الشكوى فتزداد عليهم شدة وأهلهم لا يدركون . اما الطفل المصاب بأمراض الرئتين  
 كالنيومونيا فيجب ان ينقل دائما من جنب الى آخر ولا يجوز ان يترك على جنب  
 واحد مدة طويلة لثلا يتحول الدم الى الجنب النائم عليه فيكون سببا لازدياد  
 احتقان الدم في الرئتين فضلا عن ان ذلك يمنع حدوث القرح على جنب  
 واحد بسبب النوم على ذلك الجنب

**» الغطاء «** - يميل اكثرا الناس ان لم أقل جميعهم الى تغذية المريض  
 غير مراعين حرارة جسمه ولا حرارة الطقس . ومن الواجب ان يكون الغطاء

على قدر ما تستلزم الحاله خصوصاً في الحالات بجبيث ترتفع حرارة الجسم الى درجة لا يطيق معها المحموم القطا، على الاطلاق  
**اللباس** — لا يكون اكثر من قيس واحد للنهار وآخر الليل، وفي  
 الامراض الصدرية يجب ان يدفأ صدر العليل بالقطن او الفانلا، ولا يجوز ان  
 يترك في فراشه او يجلس فيه ما لم يضع على كتفيه رداء لوقايته من البرد  
**الفراش** — يحفظ السرير نظيفاً وتغيير الملاءات (الشرائف) كل يوم،  
 وقبل استعمالها تدفأ على النار قليلاً، ويناسب ان يكون للنهار فراش وللليل آخر  
 وبهذه الطريقة ينفع العليل بتغيير موضعه وتغير اوضاع فراشه لنور الشمس والهواء  
 وقتاً كافياً

واذا كان العليل يبرد تخته فيحسن ان ينام على فراش من الطحلب او القش  
 الناعم الرخيص الثمن او يوضع تحت مقعدته ملاة من نسيج عتيق منعاً لنفوذ  
 السوائل الى الفراش، وقد تكون رائحة البراز كريهة فترش الغرفة على اثر ذلك  
 بالروائح العطرية ثم تفتح النوافذ حتى تزول الرائحة وذلك بعد ان يوضع العليل  
 في مكان مخرب عن مجاري الهواء

ولا يجوز عند تغيير الملأ (الشرشف) ان ينحضر العليل من فراشه لانه قد  
 يكون مصاباً برض القلب او غيره من الامراض التي يحتاج فيها الى الراحة التامة  
 فتكون الحركة سبباً لضرره، والافضل ان تسحب الملأ الوحيدة من تحته باطافة  
 ثم يفرض نصف الملأ النظيف في الجانب الواحد من السرير، ويترك النصف  
 الآخر مطوي او ملفوفاً ملاصقاً العليل، وعندئذ تنهضه المرضية او تشير اليه ان  
 يقلب على جنبه حتى يصدر النصف المطوي من الملأ في الجانب الآخر من  
 السرير فترشه بدون ان ينزعج العليل

**غرفة المريض** — انظر غرفة المرض

**الاستحمام الموضعي** — يغسل وجه العليل ويداه ورجلاه وأسنانه  
 كل يوم بالصابون والماء البارد او السخن بما مقتضي الحال، ويضاف الى الماء قليل

السبيرتو الصرف، أما الحيات النفااطية كالحصبة والجدري والقرمزية فيشاور فيها الطبيب، وفي الاسهال تفصل المقعدة وما حوطها بناء الشاء بعد كل براز (ملحق ٤٣)  
 ويرش عليها من المسحوق المذكور لاجل تحفيتها  
 اما اغتسال الجسم كله فيترك لطبيب وذلك لأن للاطباء طرقاً مختلفة في هذا  
 الشأن فالبعض منهم يعتمدون في الحيات على الماء البارد والبعض الآخر على اماء  
 الفائز وترى تفصيلاً كافياً على أنواع الحمامات وطرق استعمالها في (ملحق ٣٦  
 ٥٠)


### الوضعيات

**الوضعيات الساخنة** — اما جافة اورطبة، فالجافة تحضر بوضع الماء  
 الغالي في كيس كوشوك او زجاجة متينة تسد سداً محكماً حتى لا ينفذ منها الماء، او  
 يحمس القرميد (الطوب) او الرمل او الملح او الرماد الخ على النار ويوضع في  
 كيس ويربط طرفه ربطاً متيناً، ويختبرز من استعمال هذه الوضعيات بدون ان  
 تلف بمنشفة ولا سيما اذا كان العليل مثقلًا بالمرض فان حرارتها تسخن جلده ولا  
 يشعر بالام، وستعمل هذه الوضعيات في الاحوال التي تخفض فيها حرارة  
 الجسم عن معدتها الطبيعي وتبرد الاطراف وتضعف الدورة الدموية  
 والرطبة تم الاصق واللابخ الخ (ملحق ٥٠ - ٦٢)

**الوضعيات الباردة** — اما جافة اورطبة: فالاولى تقوم بوضع قطع  
 ثلج في مثابة عجل أو خنزير أو في كيس كوشوك وهو الافضل، وهذه الاكياس  
 مختلفة الانواع والاجناس وأفضلها الناعم الرقيق الذي يبرد سريعاً في الثلج  
 ويثبت بسهولة في اي مكان من الجسم، وعند استعماله يحيط بمنشفة أو منديل  
 لصق ما يتكتاف من الهواء ويتتحول الى ماء بلا مسته سطحاً بارداً

وانثنائية أي الرطبة تقوم بوضع خرقه مبلولة بالماء البارد حسب الدرجات  
 المذكورة في (ملحق ٣٦) وكلامها تستعملان لتسكين الالم العصبية الخلية  
 كوجع الرأس في الحمى التيفودية وغيرها

تُوصله إلى ما وراء المستقيم بكثير . و إذا لم توجد هذه المحققن فيكتفي أن تركب أنبوبة على طرف قمع أو فم زجاجة فتقوم مقام المحققنة الراسية




(ش ٣٣) محققنة جلد مطاط

**كيفية الحقن** - يضجع العليل على ظهره أو جنبه الأيسر وليس الآين وتدخل الماسورة في الاست بالحروف من الأسفل إلى الأعلى بعد دهنها بالزيت أو القاسلين . وإذا ثقفر السائل في أثناء الحقن فتركب على ماسورة المحققنة (شكل ٣١) اسطوانة لكي تسد الاست وتمنع خروج السائل في أثناء الحقن

**وضعيات الحلق** - هي سوائل يداوى بها الحلق المتهب على طريقتين الأولى أن تضغط على اللسان بذنب الملعقة وتدهن الحلق بالدواء بفرشاة ذات مقبض طويل أو بقطعة قطن مطهر تلف على رأس عود لفاما محكمًا والفرشاة أسهل استعمالاً وأسلم عاقبة


على أن الولد المتهبي على الطاعة لا يتنبع عن فتح فمه وأما الصغير فلا يفتحه إلا بالقوة . ولذلك يجب أن يكون مع المرضة من يساعدها عليه فتلغه بلامبة حول يديه وجسمه حتى يتنبع عن الحركة ثم تجلس أمامه والملعقة في يدها اليمنى والفرشاة في اليمنى وتزقب الفرصة التي يفتح فيها فمه ولو قليلاً فتدخل ذنب الملعقة بين أسنانه ثم تدخلها رويداً ناحية الحلق حتى إذا وصلت إلى مؤخر اللسان

**(كادات التربينينا والبهارات)** - تحضر حسب ملحق ٦٣ و ٦٤  
**(الحققن والحقن)** - تستعمل الحقن في الامصال والأمساك والتغذية عن طريق المستقيم (انظر ملحق ٣٣ و ٣٥) والحققن كثيرة الانواع منها محققنة بسيطة من الكلوتشوك الصلب تسع نحو تسمة فناجين صغيرة . مؤلفة من اسطوانة ومضغط وأنبوبة في طرفها (شكل ٣١) وهي أكثر المحققن شيوعاً . ومنها محققنة صغيرة تعرف بمحقنة الأطفال مؤلفة من نفاخة من الكلوتشوك الطري



(ش ٣١) محققنة كارتشوك بسيطة


في طرفها أنبوبة (شكل ٣٢) وكيفية استعمالها ان تضغط على النفاخة حتى يتفرغ منها الماء ثم تغمس طرف الأنبوة بالماء وتترك كما حتى تنتهي



(ش ٣٢) محققنة الأطفال

ومحققنة أخرى (شكل ٣٣) تستعمل في التهاب المعدة والأمساك المستعصي وهي عبارة عن أنبوبة كونتشوك في وسطها نفاخة فإذا أغمض الطرف الواحد في الماء وضغطت النفاخة ضغطاً متواصلاً اندفع الماء منها بقوة إلى المستقيم . وأفضل من الكل المحققنة الراسية مؤلفة من حنفية أو كيس كونتشوك وأنبوبة تنصل في طرفها السائب ماسورة (شكل ٣ صفحه ٨) فإذا علقت في الحائط أو رفعت باليد على علو ما وفتحت الماسورة في أسفل الأنبوة اندفع منها الماء بقوة كافية

ضفت عليه وعند الضغط ينفتح الفم وعند ثنيه تنس الحلق بالدواء بأمرع ما يمكن من الوقت والطريقة الثانية هي غسل الحلق بسائل دوائي بالرشاشة (شكل ٣٤) وفي هذه العملية يضغط اللسان بذنب الملعقة لكي يصل الدواء إلى الحلق والا أصاب اللسان فقط على غير فائدة . وطريقة العمل أن تدخل أنبوبة الرشاشة إلى فم العليل



(ش ٣٤) رشاشة لغسل الحلق

ونضغط على النفاخة ضغطاً متواصلاً فيندفع منها الدواء بسرعة إلى الحلق أو المكان المراد غسله . هذا أهم ما يجب عمله في المرض وقد بقيت واجبات أخرى مهمة جداً وهي أن تكتب الممرضة كل ما يحدث للمريض من الاعراض في سير المرض وهكذا مثلاً : -

في ٢٣ نيسان (أبريل) ١٩٠٣

الساعة الثامنة قبل الظهر : الحرارة ١٠٢° - النبض ١٤٠ - التنفس ٣٥ -  
تناول كبيرة حليب وفنجان ماء شعير - نصف ملعقة كونياك

١٠ - ظ - تبرز ولون البراز طبيعي

١١ - ظ - شرب نصف كبيرة لبن رائب وفنجان من ماء الجير ،  
أخذ الدواء والكونياك

الحرارة ١٠٣°

الساعة ١٢ - قلق لم يستمر في نومة . الحرارة ١٠٥° - سعال كثيراً -

مسح يده بالاسفنجية

الساعة ٢ ب . ظ - نام ساعة واحدة . الحرارة ١٠٢° . اخذ دواء للسعال ،

ونصف ملعقة كونياك الح

فهذه الكتابة هي أكبر معين للطبيب على تشخيص المرض واتباع سيره  
ويستفيد منها مالا يستفيد من الأسئلةمهمة

## الفصل الرابع

### ٤٠ علل الجهاز الهضمي

الثفة الارنية - التهاب الفم - القلاع - التسنين - خراج اللثة - التهاب الاوزتين - التهاب اللوزتين المزمن - مرض المعدة الحاد - عسر الهضم المزمن - القيء - الاسهال - المغص - الامساك - انسداد المعي - هبوط المستقيم - الديدان - البرقان

٠٠

### الثفة الارنية

شق في الثفة العليا يتد أحياناً إلى الانف فيتعذر الرضاع على الطفل من ثدي أمه . تعالج بالجراحة في الأسابيع الأولى من الحياة وبنجاحها مقرر لا ريب فيه

٠٠

الساعة  $\frac{1}{2}$  ١٢ - قلق لم يستمر في نومة . الحرارة ١٠٥° - سعال كثيراً -

### التهاب الفم

يصيب الأطفال في بعض الحالات السريرة العدوى كالحصبة والقرمزية . ومن أسبابه التسنين وسوء الهضم وأهمال قوانين النظافة . وهو على نوعين بسيط وغزير ينفي **(الاعراض)** - احرار في اللثة وسفق الحلق وإذا اشتد الالتهاب فيمسك الطفل حلة الثدي ويرخيها باكيًا وقد يكون الفم جافاً كثيراً أو رطباً من افراز اللعاب بكثرة . وأحياناً ينفرج اللسان والحلق وغشاء الشفتين والشدقين المخاطي

**(العلاج)** - يعطي الطفل مسلاً خفيفاً من زيت الخروع أو المنازيا (انظر ملحق ١١٠ لتحديد الجرعة) وقس القروح بقطعة قاش ناعم أو قطن طبي تلف على الاصبع وتتمس في الدواء (ملحق ٧٩)

اما النوع الغزير ينفي فيستدل عليه برائحة التنفس الكريهة وافراز اللعاب بكثرة زائدة وهذا النوع من أعظم علل الفم خطراً على الأطفال ويعرف عند العامة «تجة الكي» والواولي ان يعالجه الطبيب

٥٠

### القلاء

قطع بيضاء صغيرة متفرقة ومتصلة تظهر في اللسان والحلق وباطن الشفتين وتكثر في الصيف . المولودين حديثاً والأطفال الذين يرضعون من الزجاجة ولم يعن بتنظيف أفواهم وألحامه الصناعية كي ينبغي

**(الاعراض)** - مقص واسعال وحرارة شديدة في الفم تشعر بها المرضع عند ما يمسك الرضيع حلة الثدي

**(العلاج)** - تنظيف الفم من بقايا الطعام وازالة القطع البيضاء بقطعة

نسيج ناعم ملفوفة على الاصبع ومبولة بـ فاقير وإذا انتزعت زوراً تدمي . ويذكر ذلك كل ساعتين او ثلاث ساعات ثم يرش الفم بمحلول حامض البوريك (ملحق ٧٥) او تسخن الواضع المتقرحة مسأً لطيفاً بفرشاة من وبر الجل او بقطعة قطن بوريكي ملفوفة على طرف عود بعد تغميسها بقليل من مزيج البوريك واللكرس بن (ملحق ٧٩) وقد تشتد العلة فيشاور الطبيب

٥٠

### التسنيف

هو زمن نبت الاسنان واعراضه كثيرة لارابط لها في سيرها فتارة تكون شديدة وطوراً خفيفة لاتلحق بالعليل أدنى ضرر وقد تمحر اللثة واحياناً تنفرج من شدة الالتهاب عند منفذ السن فيعالجها طبيب بالشق ويصاب الطفل بالاسهال والمغص وتشنجات عضلية ونفاطات جلدية وسعال من التهاب الشعب الرئوية ويستولي عليه الاضطراب وضيق الحلق ثم لا تثبت ان تزول هذه الاعراض حالما تنبت السن

**(العلاج)** - اذا كان الطفل رضيعاً فيعول على ابن امه ولا يجوز ان ترضعه أكذر من اللازم لثلا يصاب بالقيء والمغص والاسهال . وإذا كان مفطوماً فيمنع عن الاطعمه القايسنة ويسبق ابن البقر مخففاً بماه نحو الثالث . اما الانحرافات المصبية فسكن بتطيس العليل في الماء السخن (ملحق ٣٨) ورعيان اللثة بفرشة الاصبع فركاً لطيفاً او يعلق في عنق الطفل طوقاً من الكاوتشوك فيمده وبهذه الواسطة يخفف الرعبان .  
وإذا مضت السنة الاولى من العمر ولم تنبت الاسنان فهو دليل على مرض الكساح وما شذ عن ذلك فنادر لا يقياس عليه

٥٠

## خروج اللثة

تكون في جذر ضرس مسوس أو مصاب بأفة أخرى وتعرف بورم حول الضرس المصاب وبعد أيام قليلة ترتجي وتنفجر من نفسها ف تعالج عندئذ بغسلها في محلول حامض البوريك (ملحق ٧٥) وإذا اكتشف عليها قبل انفجارها فتحس بصبغة اليود . ويسكن الوجع أما بفصل الفم بما سخن يحفظ فيه بعض دقائق او بالوضعيات السخنة من الخارج على ان الشق أنجح دواء لهذا الداء

٩٩

## التهاب اللوزتين الحاد

يعرف باشتماز الرضيع من الرضاع ونفوره من الثدي او الرضاعة . ومن اعراضه عسر البلع الذي يدل عليه البكاء على اثر الرضاع . أما في كبار الاطفال فيدل عليه رفضهم الاطممة الجامدة كاللحم والجبين والخبز وشربهم الماء جرعات صغيرة متقطعة . ومن جملة الاعراض ارتفاع حرارة الجسم وخشونة الصوت واحمرار وتورم في اللوزتين واحياناً يشاهد عليها نقط بيضاء يتكون منها غشاء أبيض يشبه القشط الدقيقري فتختاف الام خوفاً زائداً وتسرع في طلب الطبيب وهو خير عمل تعلمه في هذه الاحوال فان العليل قد يكون مصاباً بالداء المذكور فيعزله الطبيب ويعالجه باكراماً (انظر الدقيقري)

**العلاج** — يلزم العليل فراشه ويعالج بالمرطبات والملينات ومص قطع صغيرة من الثلج في فمه وكبار الاطفال يعالجون بالفراغر القابضة (ملحق ٨١) وتختفف الحرارة بالزيزج المذكور في (ملحق ١٠٣) وفيما خلا ذلك يشاور الطبيب . والاصابة في هذه الاعنة تعد صاحبها الى أخرى واذا تكررت يفقد العليل سمعه

## التهاب اللوزتين المزمن

هو تكبير زائد في حجم اللوزتين ويكون لونهما أصفر وأحمر كما في الالتهاب الحاد . وتكثر هذه الاعنة بين الاحداث الذين يصابون بها في طفولتهم . وعند النظر الى باطن الفم تشاهد اللوزتان زائدتان كثيراً عن حجمها العتاد . وقد تسدان من كبرها مسالك الاذن فتضطر العليل الى التنفس من فمه ويشعر في نومه ويبح صوته ويخشن . وينخفض السمع كأنه مصاب بنزلة قوية . وبما ان هذه الاعنة شديدة الخطورة فن الواجب ان يعالجها الطبيب

٩٠

## مرض المعدة الحاد - عسر الهضم الحاد

ويعرف بالجى المعدية أو التهاب المعدة يكثر حدوثه بين الاطفال الذين يربون على الرضاع من لزجاجة ولا يعنى بتناقضها من بقايا الحليب في كل رضاع . ويحدث عند الفطام من انتقال الطفل فجأة من حليب امه الى طعام آخر غير معتادة معدته عليه . ومن أسبابه الرضاع فوق الشبع وشرب الماء غير النقي اما في الاحداث فيحدث من الاكل بمجلة والاكتثار من الاطعمة ولا سيما الحلمة . ومن توادر القشعريرة لعدم كفاءة الابلسة في أيام البرد

**الاعراض** — ترتفع الحرارة الى درجة ١٠٢ - ١٠٣ بمقاييس فهرنهايت ( $\frac{3}{4} - \frac{1}{3}$  ٣٩ ) ويسرع النبض والتنفس واحياناً يستيقظ الطفل من النوم بفترة فيصرخ صراخاً حاداً متواتراً وتتررق شفتاه ويطوي رجله فوق بطنه كأنه يشير الى مركز الالم في معدته . ومن جملة الاعراض قيء واسهال ممزوج بمواد مخاطية وياض في مؤخر الاسنان واحمرار لامع في رأسه وحوافيه **العلاج** — السكون التام والانقطاع عن الرضاع في بدء الاعنة نحو

أربعة وعشرين ساعة سواء كان من الزجاجة أم من الثدي . وفي خلالها يأخذ كل  
ثلاث أو أربع ساعات نصف فنجان أو اكثراً من الماء البارد الذي يشربه بملعقة  
صغيرة ويضاف إلى الماء نحو عشرين نقطة من الكونياك وعندما ينقطع النبيء  
والأسهل يتناول كوبات صغيرة من مرق اللحم وبلغ الشعير أو الأرز . وتحتفظ  
الحرارة بمسح البدن به بارد إضافة إليه السبز أو الخل . والبعض يشفرون  
من الذهاب إلى الجبال والارياف أو الشواطئ البحرية

٥٠

### عسر الهضم المزمن - التهاب المعدة المزمن

يعرف بالتهاب غشاء المعدة المخاطي او تسمم طبقتها المخاطية بحيث تقل  
عصاراتها وتتجزأ عن هضم المواد الموجودة فيها . وأسبابه تكرار الاصابة بالتهاب  
المعدة الحاد وسوء معالجتها وعدم هضم الطعام كما ينبغي . واكل الحبز الساخن  
والاطعمة الملحنة والفاكهية العبرة ودخول طعام على طعام

«الاعراض» - ففتشية الطعام ووجع الرأس وبراعم اللسان  
خصوصاً في مؤخره ووسطه وألم في القسم المعدي وقلق وقيء مزوج بآلام صفراء  
وفي بعض الحالات امساك معوي وفي البعض اسهال . وينبغي العزل غازات حامضة  
ذكرية الرائحة . وتبرد أنطراقه ويرى في نومه أشياء مفزعة فينهض من  
فراشه مرعوباً

«العلاج» - المعدة كباقي أعضاء الجسد اذا حلتها فوق من تطبيقه  
من اثقال الطعام وهنت قوتها وقصرت عن اداء وظيفة الهضم . والذي يتلهم معدته  
بكثرة الطعام تظلمه هي أيضاً بما تذكرة في مرضها من اوان العذاب فتنقص عيشه  
وتسلبه لذة الحياة . هذا في الكبار واللاؤم في ذلك عليهم . وأما الاطفال  
والاحdas فاللوم في هذا القائم على والديهم ولا سيما الوالدة فانها تطعم ولدها

في أي وقت تطلب نفسه الطعام فلا تتردد طلب شفقة وحنواً منها . فعلى  
الام ان تفدي ولدها في أوقات معينة ولا تسمح له بغير المأكولات السهلة الهضم  
والكثيرة الفداء كما اسلفنا ذكره في باب الرضاع والطعام  
وإذا كان العليل رضيعاً فيعالج بارضاعه كل ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات  
مرة أو فطيلاً فيغذى بالبن ومرق اللحم أو خلاصته او بالطعام المهمض حسب  
(ملحق ٢٦ - ٣٢)

وأما الاحداث فيعالجون بالامتناع عن الاطعمة الحلوة والدهنية والنشائية  
والاقصرار على اللبن واللحم الابيض وجميع الخضر الحدية ويكون طعام العشاء  
خفيفاً من الحليب والمرق

ومن الوسائل الفيدة تبديل الهواء في الجبال والشواطئ البحرية وكذلك  
الاستحمام مسححاً بالاسفنجية في الصباح والمساء بماء درجة حرارته ٨٦° بمقاييس  
فهرنهايت او ٣٠° سنتيمتر وأفضلها ماء البحر المالح . قبل الاستحمام بغزير البدن  
بنشفة خشنة ثم يصب الماء على صدره وهو واقف في المغطس ويحمس بدمه  
ويهدى بطنه

٥٠

التيء

عرض لا مرض وهو نوعان الاول القياء ، الحال من ارتفاع الطفل  
اكثر مما تسع معدته ويقال له في اصطلاح الاطباء نهقه الطعام لانه يحدث في  
الصحة وليس في المرض وقد سبق الكلام عليه في باب الرضاع . والثاني يحدث  
في امراض المعدة والنيومونيا والجي القرمزية والتهاب غشاء الدماغ ولذلك يجب  
ان يستدعى الطبيب حالاً لاجل تمييز الصلة وتشخيصها قبل اشتداد وظائفها . على انه  
كثيراً ما ينتقياً الاولاد على اثر اكلة ثقيلة على المعدة فيرثا حتون . وقد يتواتر القياء

فيلاشي العليل وينهك قواه

**»العلاج«** — يضجع العليل في فراشه من غير حركة ويقطع عنه الطعام نحو ست ساعات او اكثر . وبعد ذلك يعطي ماشاء الشعير او ماشاء الابومن (ملحق ٢ و ٣) في كياس قليلة . وتوضع الحرادل (ملحق ٦٤ و ٦٥) على القسم المعدى تجاه الاخلاع بالحرف قليل الى الجانب اليسرى ويشرب ماشاء الصودا والنعناع (ملحق ١٠) وأما الاحداث فيضاف الى الصودا صبغة الزنجيل وقد ينقطعقيا بازدراد قطع ثلج صغيرة وليس بحصها في الفم . وبعد زواله يعطى المصاص جرعة سهلة من المازيا لطرد الماء المبعة من المعدة عن طريق المستقيم فيخلص العليل من اثمارها

٥٠

### الاسهال

ابراز مواد مائعة دفعات متواالية يختلف عددها من ١٥ - ٢٠ - ٥٠ في اليوم . وأنواعه أربعة البسيط والحادي والبطيء واللاتهابي

٥٠

### النوع الاول — الاسهال البسيط :

ويقال له سوء الهضم المعي يحدث من الافراط في الاكل وعدم مراعاة قوانين النظافة وترتيب أوقات الفداء . سواء كان من الثدي أو زجاجة الارضاع . ومن الاسباب التي تعد الاطفال لهذه العلة تغيرات الجو الفجائية والانتقال من الاقاليم الباردة الى الحارة وهذا السبب يكثر الاسهال بين الاطفال والاحاديث الذين ينقلون في فصل الصيف من الجبال الى السواحل أو من القطر الشامي الى المصري . وتشتد العلة اذا وافق حدوث الاسباب المذكورة طور التسنين وهو زمن ظهور الاسنان . فان الجهاز العصبي والقناة المضدية يتاثران في مثل هذه الحال بسرعة زائدة

**»الاعراض«** — براز متواتر يبلغ عدده من ٥ - ٢٠ في اليوم الواحد وفي الغالب يكون البراز في الدفعات الثلاث الاولى طبيعياً في لونه وقوامه ثم يصير مائعاً مخضراً او مصفرراً وممزوجاً بمخاطر ومواد غير مضومة من الطعام وفي الآخر ينحطط قليلاً بالدم . وقد يسبق البراز ألم وحرير وفي أثناء ذلك يسرع النبض وترتفع حرارة الجسد شيئاً قليلاً . ويرافق العلة قيء، خفيف وانفاس في البطن من تولد الفازات في المجرى المائي يشعر به في القسم المعي تحت الضغط . وفي بعض الحوادث يصاب الطفل بشتنجات عضلية وهي علامة رديئة تدل على تسمم القناة المضدية . وجملة الكلام أنه لا يمر على العليل ساعات قليلة وهو في هذه الحال حتى تبدو على وجهه وساقيه علامات الضعف والهزال

**»العلاج«** — يعطي العليل ماءمة أو ملعقتين من زيت الخروع لتنظيف المجرى من فضلات الطعام وغيرها من الاسباب المهيجة . وقد يرفض زيت الخروع كما هو الحال في الاطفال فيختنق في المستقيم بعد مزجه بقليل من الماء أو يكسر باللين ويضاف اليه نحو عشر نقط من الكوكنيك فيختنق طعمه ويسهل تناوله . ولا يجوز استعمال الماء في أول ظهور الاعراض لئلا تكون سبباً لانحطاط قوى العليل وعندئذ يعالج بالحقن على الطريقة الآتية :-

تحت نترات البزمومت ٦٠ سانتيجراماً

ملح الطعام ٦٠ «

ماء مقطر أو مرشح ٦٥ غراماً

وكل ٣٢ غراماً يساوي فنجاناً صغيراً . يحقن بها صغار الاطفال مراراً في النهار كل مرة بمثل هذا المقدار واذا كان الطفل ابن سنتين يضاعف هذا المقدار ثلاث مرات ويجب الاحتراز من استعمال الايفون أو غيره من القوابض قبل تنظيف الامعاء من المواد المبعة على نحو ما أسلفنا ذكره

أما الالم فيسكن بملعقة صغيرة من شراب الرواند العطري أو بخمس نقاط أو أقل من صبغة الكافور المركيه تكرر تبعاً لمعنى الحال

وما يفيد أيضاً العلاج الآتي ولا سيما إذا كانت العلة مصحوبة بالقيء وهو ما: الكافور فورم وما: المجير وما: القرفة من كل صنف فنجان صغير تمزج معها وتعطى ملعقة صغيرة كل ١٠ دقائق أو ١٥ دقيقة فيخفى الدرب فضلاً عن ان هذا الدواء مطهر المعوي وبضاد للفساد

وإذا لم ينقطع الاسهال بعد ٢٤ ساعة من هجمته فتزيد الجرعة الآتية : -

كامل ٣٠ الى ٥٠ مليجراماً

تحت نترات البرموت ٣٠ سانتيجراماً

ساول ٥ سانتيجراماً

تدرج مما وتعطى كل أربع ساعات على خمسة أيام ويجوز استعمالها أيضاً بعد انقطاع الاسهال خوف الاتكاس

وينبغي أن يمنع العليل عن الطعام نحو ٦ ساعات أو أكثر إذا كان من يغذى بالصناعة. ويُسوق في خلال المدة المذكورة مقدار فنجان من ماء بارد مع ١٥ الى ٢٠ نقطه كونياك كل ساعة وفي نهايتها يعطي مرق اللحم ولا يغذى باللبن؟ مالم يرجع البراز إلى حالته الطبيعية وعندئذ يعطي من صبغة جوز المقي، نحو نقطتين قبل الأكل إنقاذه المضم الموعي

ال النوع الثاني - الاسهال الحاد : -

وهو الذي تأتي اعراضه بفجأة فيتواتر الدرب والقيء وتتحفظ قوة العليل ويهزء بسرعة زائدة وفي قليل من الوقت يصبح جلاً على عظم . ويقال لهذه العلة كولا الأطفال لأنها تشبه في سيرها الكولا الآسيوية المعروفة بالهوا، الأصفر . ولا تحدث إلا في فصل الصيف من شدة الحر ولا سيما في المدن الكبيرة بين الفقراء الذين يسكنون البيوت الفقيرة ولا يراعون في تربية اطفالهم قوانين النظافة . وأكثر حدوثه من الشهر الثالث إلى آخر السنة اثنائية من العمر (الاسهال) - ميكروب خصوصي يفسد اللبن وكل طعام مؤلف

منه . ولذلك يكثر هذا النوع من الاسهال بين الأطفال الذين يعيشون على الرضاع من الزجاجة اذا لم يطهر اللبن قبل استعماله . وما عدا الاسباب المارة ذكرها فإن جرائم المرض تدخل الفئنة المرضية عن طريق المستقيم أو من حملة الثدي أو أصابع الطفل الوسخة

﴿الاعراض﴾ - يهجم القيء والاسهال بفجأة وفي بعض الحالات يسبقهما ذربٌ خفيف مائع ومحضر قليلاً . أما القيء، فنهك واكثره في الاول من محنويات المعدة ثم يصير مائياً متواصلاً وأخيراً تفرغ المعدة ويبقى العليل متکلفاً له . ويزداد القيء عند تناول شيء من طعام أو شراب . وفي اثناء ذلك يصفر وجه العليل وينتفخ بطنه وتثور عيناه وبرد عرقه ويعطش عطشاً زائداً وفي الآخر يتجمد جلده وتنحط حرارة جسده ولا يزال على هذه الحالة حتى يصبح كالحيدان ويستولي عليه السبات فيموت في أقل من ست ساعات وأحياناً تنتهي العلة بتشنجات عضلية تؤدي عليه

وأما البراز فيزداد المرة بعد الأخرى ثم يتواصل ويتغير لونه بالسرعة من اصفر طبيعي إلى أخضر يشبه السبانخ وفي الآخر يتبرز العليل مواد مائمة في كثرة كبيرة يتخلها مواد مخاطية تشبه ماء الرز

وهذا النوع من الاسهال شديد الخطورة على الحياة ولا ينجو من شره إلا الأطفال السجان . وإذا كان العليل من تربوا على التغذية الصناعية فالامر في شفائه ضعيف لأن فعل السم يبلغ درجة لا يؤثر فيها دواء . ومن الاعراض الحسنة تناقص القيء والاسهال بالتدرج وعدم حدوث اعراض عصبية وانحطاط في القوى

العلاج: نوعان علاج واقٍ وعلاج شاف

﴿العلاج الواقي﴾ - يقوم بتنظيف حملة الثدي قبل الرضاع وبعدة وأذا كان الطفل يغذى بالصناعة فيطهر اللبن من جرائم الفساد باغلانه على النار ولكن الأغلا، يفسد طعمه وينغير مواده فلا يصلح لارضاعة (انظر تطهير

اللين صفحة ٦٠ ) ويجب ان تغسل الزجاجة بالماء السخن حتى تنطف جيداً وقليل من اللين القديم اذا نسي فيها يكفي لفساد اللين الجديد . وينبغي ان تكون الحلة الصناعية التي تركب عليها قصيرة لكي يسهل غسلها من بقایا اللين المعلقة بها ( انظر صفحة ٦٢ )

ومن الوسائل التاجعة أن يمنع الطفل عن الرضاع عند اقل اسهال يصيبه في الصيف ويستوي مرق اللحم او ماء زلال البيض عدة ساعات ( ملحق ٣ ) **» العلاج الثاني «** - اولاً : يمنع العليل عن الطعام نحو ٨ ساعات واحياناً ٢٤ ساعة من ابتداء العلة وبسبب الانحطاط الزائد الذي يظهر باكرًا في هذه العلة يضطر العليل الى المنبهات وافضلها الكونياك يعطي منه ملعقة صغيرة او ملعقتين في فنجان ماء بارد مقطر يكرر كل ساعة او اقل تبعاً لمقتضى الحال

ثانياً : ينبعي مساعدة الطبيعة على قذف المسموم من الامعاء بمحول ملح الطعام أو البزموت ( خمس جرامات في ٥٠٠ جرام ماء مقطر ) يحقن بها في المستقيم ويكرر ذلك مارداً الى الاسهال مستمرتين . واذا كانت حرارة الجسد منخفضة كاهي الحال في اغلب الحوادث فيغمض العليل في ماء درجة حرارته ٩٥ ف او ٣٥ س ويزداد الى ان تصير ١١٠ ف او ٣٤ س ويضاف الى الماء قليل من مسحوق الخردل لتبيه دورة الجلد

واما الحمى ( اذا وجدت ) فتحتفف بوضع اكياس الثاج على الرأس أو غسل البدن بماء فاتر وفركه بمنشفة خشنة ولا يجوز تخفيفها بالادوية لئلا تمحظ القوى ويعود العليل

ثالثاً : ينذى الطفل بعد زوال الحمى بماء زلال البيض ( ملحق ٣ ) او مرق اللحم ولا يعود الى غذائه الا صلي مالم يمر عليه بضعة ايام سليماً من الاعراض المذكورة . ومع ذلك فقد يبقى في خطر الاتكاس عند اقل سبب يهيج الامعاء هذا كل ما يمكن عمله في غياب الطبيب . ومن الواجب اعلامه بأسرع ما يمكن

من الوقت ضناً بحياة العليل ان تذهب ضحية الجهل والاهال

**النوع الثالث - الاسهال البطيء** - ويقال له ايضاً اسهال الصيف يحدث من فساد اللين في زمن الحر الشديد للاسباب التي سبق ذكرها في النوع الثاني من الاسهال . وقد يأتي على اثر الاسهال الحاد ( كولرا الاطفال ) اذا عاد العليل الى التغذية من الثدي ولاسيما من زجاجة الارضاع قبل بلوغه تمام الشفاء ( انظر صورة ٣ ) **» الاعراض «** - في خفيف يستدل على اثر الطعام والشراب وذرب قليل في أول هجوم العلة ثم يزيد ويخالطه مخاط كثير ومواد دهنية وفضلات من الطعام غير منهضمة . وفي اول الامر يكون الفائط اصفر اللون او اسمره ثم يتتحول سريعاً الى اخضر او اصفر ضارب الى الخضراء . وفي اثناء العلة يتطلب البطن كثيراً ويتسلخ الجلد حول المقعدة والفتحتين ويكتسي الانسان فروة بيضاء وترتفع حرارة الجسم الى درجة ١٠٢ او ١٠٣ ف = ٣٨ او ٣٩ س . ويفقد العليل شهوة الطعام فيضعف ويزل و بسبب الضعف الزائد تتحطم قواه ويصاب بأمراض الصدر والكليةين وهي كثيرة في الاسهال البطيء وعاقبتها الموت ويتأثر الاسهال البطيء عن الاسهال الحاد ( كولرا الاطفال ) ببطء اعراضه واعتدال الحمى وخلو البراز من الماء الكثير وقد يتبعه بانسداد الامعاء فيتميز عنه بخلو القى من المواد البرازية وقد الزhir والإلم الشديد **» العلاج «** - يمنع العليل عن اللين ويفتحني بمرق اللحم وماء زلال البيض ( ملحق ٣ ) يتناوله في اوقات معينة يینها نحو ثلث ساعات او اربع ولا يعود الى التغذية باللين مالم ينقطع القى تماماً ويرجع لون البراز الى اصله . وفي اثناء طور المهجوم يحتمم بالماء الفاتر مرة في اليوم وتغسل مقعده بعده كل براز بالماء الصرف واذا كان العليل من سكان المدن الحارة فينقل الى القرى والحقول في الجبال او السهول الندية الهواء والماء واما يفيد جداً شرب الماء مرشحاً او مطهراً باغلاقه على النار يسقي منه مراراً

في اليوم كميات قليلة ويضاف اليه نحو نصف ملعقة صغيرة او اكثراً من الكونياك او الوسكي فينبه القوى ويخفف النزيف . وفي بدء العلة يعطى مسحلاً من زيت الخروع لتنظيف امعائه من المواد الحريفة التي تسبب الاسهال وفي طور النقاوة وهو من زوال الاعراض يعطى زيت السمك لتقوية جسمه وقد لا تهدأه معدته اضعافها فيفرك به بدنه حتى يدخل الزيت الى الدم بواسطة مسام الجلد

نوع الرابع - الاسهال الالتهابي : - هو التهاب خفيف في الامعاء من اعراضه حمى قليلة وقيء خفيف وبراز مخاطي مائع قليل الكثافة وفي بعض الاحيان تتبين اعراضه باعراض الاسهال البطيء، فيصعب التمييز بينما بدون مساعدة الطبيب . واذا اشتدت الاعراض فيقال للعمة عندئذ دومنطاريا وفيها يكون البراز قليل الكثافة كثير الماء والدماء ومصحوباً بزفير يلاشي القوى فيشعر العليل في أثناء ذلك بشيء في المستقيم لم يدفع بعد

«العلاج» : يداوى هذا المرض على الطريقة التي سبق ذكرها في أنواع الاسهال وعلى الام ان تحفظ لطبيب شيئاً من البراز حتى يسهل عليه تشخيص العلة

### لاغص

وجع شديد في البطن يأتي من وقت الى آخر وأحياناً تتكرر نوبه مراراً عديدة في اليوم . وينشأ غالباً من تدفق المعي بالغازات . وهو كثير الحدوث في الطفولة وأعراضه صراخ شديد يأتي بجأة فتتفتح بطن العليل وتزرق شفتاه وينتمي من شدة الالم فتارة يهدى رجليه على طولها وتارة يطويها فوق بطنه وهكذا يفعل بيديه . ثم لا يلبث العليل ان يتجمساً او يتبرزاً او تنفلت



لـ: **البراز**  
لـ: **الغص**  
لـ: **الدومنطاريا**  
لـ: **القيء**  
لـ: **البراز**  
لـ: **البراز**

الغازات من امعائه فتنزول الاعراض بجأة كجاءه

﴿الاسباب﴾ - البرد وسوء المضم . فالاول يحدث من عدم كفاية  
اللباس ولا سيما في وقت النوم والثاني من كثرة الرضاع والافراط في الطعام وبهذا  
السبب تولد الغازات في المעי فتهددها وتحدث ألمًا شديدًا في البطن هو المغض  
﴿الملاج﴾ - لاجل منع البرد يلبس الطفل ثيابًا دافئة وجوارب سميكة

على طول الساق وحزاماً للبطن في وقت النوم وهو ضروري جدًا لصغار الاطفال  
وتفرك رجلاه مزيج مولف من جزء واحد من زيت التر بتينا وثلاثة أجزاء من  
زيت الزيتون . وأما اعراض سوء المضم فتعالج بتطويل فسحات الطعام وتقليل  
كتبه وترتيب اوقاته على نحو ما اسلفنا ذكره في فصل الرضاع . واذا كان الطفل  
ينفذى بالصناعة فيفيده ابدال الفداء بذاء آخر يوافقه ولا يغير الا بأمر الطبيب  
وفي أثناء النوبة يمنع الرضاع بتأني . نعم ان حليب الثدي او الزجاجة يسكن الوجع  
لمدة قصيرة ولكنه اذا تكرر يلبيك المعدة فتندو العرض اشد من الاول .  
ومن الوسائل الخارجية المقيدة الوضعيات العطرية (ملحق ٦٤) والحقن بماه السخن  
نحو فنجانين صغيرين او أكثر تبعاً لعمر العليل . وأحياناً اذا دلك بطن الطفل  
براحة اليد بضع دقائق او تغير مركز الطفل برفعه مثلًا فوق الكتف انفلت  
الغاز من المعي وزال المغض

هذا كل ما يمكن استعماله من الوسائل الخارجية في غياب الطبيب . وقد  
تفتحي الحال استعمال الدواء من الداخل . من ذلك ماء النعناع او ماء القرفة  
خفقاً بالماء ومحلي بالسكر يؤخذ بعد كل رضاع فينبع المغض . وفي أثناء النوبة  
يعطى في كل نصف ساعة او ساعة فنجانًا من مزيج الصودا والنعناع ممزوجاً بقدره  
ماء سخناً (ملحق ١٠٠) وهو من أبسط العلاجات وانجمها في المغض

وقد تنحط قوى العليل ويبرد جسمه من تكرار النوب فيعالج بالكونياك نحو  
٥ - ١٥ نقطة حسب العمر يتناولها الطفل مع الماء السخن محلىً بالسكر

ثم يوضع في مغطس ما سخن بضم دقائق ويوضع في فراشه بعد تجفيف بدنه  
وتوضع الحرادل على بطنه (ملحق ٦٥)  
وقد بذور المقص على رغم كل الوسائل التي ذكرناها وعندئذ يشاور  
الطيب

٥٠

### الامساك - القبض

قلنا في دلائل الصحة ان الولد ينوط في السنة الاولى من ٣ - ٥ مرات في  
اليوم . وفي السنة الثانية من ٢ - ٣ مرات وكما نقدم في الايام تقل مرات البراز  
حتى يصير واحداً في كل ٢٤ ساعة  
في الامساك تغير الحالة فينوط الولد كل يومين أو ثلاثة أيام مرة واحدة  
وقد يمر على ذلك زمن طويل فتعمد الاماكن على البلاد والكليل ويسير الغائط  
صلباً أو يابساً يشبه بفر الماعز او الغنم فيمذب العليل ويسكب وجمع الرأس وألم  
وتشقق في المستقيم . والامساك كثير الحدوث في سن الطفولة ولا سيافي الاطفال  
الذين يرضعون من الزجاجة

**(الاسباب)** - يحدث الامساك على اثر مسهل قوي او من كثرة الاكل  
بوقلة المواد الدهنية في الابن وأسباب أخرى لا محل لها ذكرها

**(العلاج)** - اذا كان الامساك حاداً من قلة المواد الدهنية في اللبن  
وكان الطفل يرضع من الزجاجة فيضاف الى غذائه كمية وافية من القشطة السائلة  
(الكريام) او يتناولها بالملعقة اذا كان يرضع من ثدي امه . وما يفيد أيضاً ما  
الاوت ميل (ملحق ٥) يضاف الى اللبن بدلاً من الماء لصغار الاطفال . وعصير  
البرتقال . والتفاح مشوياً او معقوداً بالسكر . والاطعمه السائلة كالمرق ونحوه  
للارولاد الذين من السنة الاولى فصاعدأ

ومن الوسائل النافعة الاستحمام بالماء البارد وفرك البدن جيداً على أثره . وذلك  
البطن (تسيد) براحة اليدين كما لطيفاً مبتدئاً من أسفل الجانب . الاين البطن  
الى ما تحت الاخلاع ماراً أسفل السرة الى الجانب اليسرى متبعاً في هذين  
الحركة امتداد المعي الغليظ الى المستقيم . ويجب ان تكون اليدين مدحونه بالزيت  
او الفاسلين ليسهل مرورها على الجلد . ويكتفى ان يمسد البطن نحو ١٠ - ١٥  
دقيقة في كل يوم قبل ميعاد اطلاق البطن بساعة حتى تنبه اعصاب المعي  
ونفذ الغائط

والحقن بباء الملح سخناً او ماء الصابون باردًا ليومين او اكثر يخفف وطاة  
الامساك وما يحدث بسببه من الكرب في البطن . أما الكمية التي يحقن بها العليل  
فتخالف باختلاف العمر . فلا يكون اكثراً من فنجانين لصغر الاطفال وقدر  
ذلك ثلاث مرات لابن سنتين . وادا لم يفع الحقن بالماء فيتحقق العليل بنصف  
ملعقة من الفلسرین اما صرفاً او ممزوجاً بقدر ما . وأفضل أنواع المحقق  
«محقنة الاطفال» او «محقنة الكوتاشوك» (شكل ٣٢ و ٣١ صفحه ١١٢)  
ويجب ان تكون فتحة المحقق واسعة ليسهل مرور الفلسرین منها  
واذا كان الغائط يابساً ولم تؤثر فيه الوسائل التي تقدم ذكرها فيتحقق  
بمتدار فنجان صغير من زيت الزيتون سخناً يحفظ في المستقيم بضم ساعات ثم  
يحقن بعد ذلك بباء الصابون . وقد لا تفع هذه الواسطة فيضطر الطبيب الى  
اخراج الغائط اليابس بعد الاصبع او ذنب الملعقة الى المستقيم

وما يفيد كثيراً استعمال التحاميل من الصابون الجاف تدخل التحميله في  
المستقيم بعد دهنها بزيت الزيتون او الفاسلين وترك فيه الى ان يشعر الولد بالميل  
الى البراز . ويكتفى ان يكون طوهاً قيراطين وسمكة من القاعدة نصف قيراط  
ومن الرأس ربع قيراط على الهيئة التي تراها في (شكل ٣٥)

هذه هي الوسائل الخارجية الشائعة الاستعمال لازالة الامساك على انه في بعض الاحيان لا يزول الا بالادوية منها زيت الخروع يعطى منه نحو ملعقة صغيرة او ملعقتين . او فصصات الصودا نحو خمسين سنتكراام ممزوجاً بالبن . او خلاصة الكسكارا سكرادا العدية الطعم من ١ - ٣ نقط . او الكلومل من ٥ - ١٠ ميلكرامات . كل هذه يجوز استعمالها اياماً قليلة ويحترس من تكرارها لثلاثة ينعد العليل عليها ولا يفوظ بدونها

والافضل ان تناط معالجة الامساك بالطبيب

(ش ٣٥)

تحميمية صابون

°°°

### انسداد المעי الخلفي

هو نضيق او انسداد تام في أسفل المستقيم يولد مع الطفل وينعنه عن البراز وهو نادر جدًا واذا مر على المولود نحو يومين بعد ولادته ولم يبرز فيعالج بالجراحة والاوائله المئية في أيام قليلة

°°°

### هبوط المستقيم — استرخاء المقدمة

ويقال له أيضًا انبات الصفرة . وهو خروج المعي من الاست يصيب الاطفال الضعفاء البنية بين السنة الثانية والرابعة من العمر . فيجيء الحوادث الخفيفة يخرج المعي نحو نصف قيراط فيظهر حول الاست على هيئة ورم احمر ارجواني اللون ينماشه شيء من السمرة وقد يحدث كلام دفعت الامعاء فيعود من تلقائه نفسه بسهولة . وأما في الحوادث العسرة فينزل المعي نحو خمسة أو ستة قراريط كلام غاط العليل أو مشى أو نهض . وقد يتكرر فيحدث ألمًا شديداً

«العلاج» — يلقى الولد على ظهره أو جنبه ويرد المعي المهابط بدفعه

إلى الداخل بالاصابع بعد دهنها بالقلسلين ثم بزيت الزيتون ويأخذ العليل دواء مليئاً (لامسلاً) للامعاء تكيي يبرز بدون زحير . ويحسن ان يستنقى البراز بوعاء والولد نائم على ظهره . وتغسل الصفرة بماء بارد . ومن الوسائل المفيدة ان يوضع على القصريّة قطعة كرتون سميكة ثقب من وسطها ثقباً مستديراً يبلغ قطره أربعة قراريط فتمتنع هبوط المستقيم في أثناء البراز . وقد لاتتفع هذه الوسائل فستعمل الحقن القابضة أو التحاميل باشرارة الطبيب . والحوادث المستعصية تعالج بالجراحة

°°°

### الديدان المعاوية

يوجد ثلاثة أنواع من الديدان مقرها المعي وهي : -

أولاً : الدود الخطي

ثانياً : الدود الاحمر (الثعبان)

ثالثاً : الدود القرعي (الوحيدة)

والنوعان الاخرين يكثران في الاطفال والاحداث . ومن اعراض الدود الخراف الشهية للطعام وحكة في باب البدن وصرير الاضراس واضطراب وأرق وسائلان اللعب وبعض الاحيان تشنجات عصبية . وقد تكون الاعراض مفقودة بتقائها فيستدل عندئذ على وجود الدود في البراز بالفحص المكرسكي


°°°

﴿الديدان الخطيّة﴾ — تشبه خيوط القطن البيضاء طول الواحدة من  $\frac{1}{4}$  -  $\frac{1}{2}$  قيراط ومقرها الاجزاء السفلية من الامعاء (شكل ٣ صورة ٣) وكثيراً ما تزدحم في أسفل المستقيم فتعذب العليل . وعلاجه النظافة الناتمة والحقن بتفعيم الكواسيا (ملحق ٨٨) كل يوم بعد آخر لمدة أسبوع او اسبوعين . ومن العلاجات النافعة الكلومل والستنتونين هكذا : -

ش (٣)



ش (٢)



ش (١)

(١) الدود الاحمر الذي يشبه دود الارض ويعرف عند المصر بـ  
بالثعبان وقد اخذت صورته في نصف حجمها الطبيعي (٢) قسم صغير من الدود  
القرعي او الدودة الوحيدة بحجمها الطبيعي (٣) الدود الحيطي بحجمه الطبيعي

|                   |             |       |
|-------------------|-------------|-------|
| كامل              | ستكرام      | ٦     |
| ستونين            | »           | ٣ - ٦ |
| سيكاربونات الصودا | »           | ٦     |
| بودوفلين          | ٣ ميلكرامات | ٥٠    |

نوخذ دفعه واحدة عند النوم وتكرر في الليلة الثانية والثالثة لابن ٩ - ١٢ سنة

«الديدان الحمراء» - تشبه دود الارض في لونها و هيئتها ولكنها تختلف  
بكثير حجمها و طولها البالغ معظمها ١٢ قيراطاً (شكل ١ صورة ٣) و مقرها الامعاء  
الغليظة وقد تنفذ الى المעי الدقيق واحياناً الى المعدة فتخرج مع القيء . وقد  
تكثر حتى تسد المעי . و مع ان الاعراض في هذا النوع من الديدان جلية  
واضحة فقد لا يلفت اليها حكم جازم مالم تشاهد في البراز و عندئذ يستدعي الطبيب  
وليس من الحكمة انه يتولى المعالجة أحد غيره .

«الديدان القرعية» (الوحيدة) - يغلب وجودها في كبار الاطفال  
و تعرف فقط من مشاهدتها في البراز وهي يضاء اللوت مؤلفة من فصوص او  
خرزات متصلة بعضها ببعض حتى بلغ طول الواحدة عدة اقدام (شكل ٢ صورة ٣)  
و علاجها منوط بالطبيب . وعلى الام في ذاك الوقت ان تستلقي البراز في اناه فيه  
ماء و تبحث عن رأس الدودة بهز الاناء بين يديها هرماً خفيفاً وهذا ضروري  
جدأً لأن بقاء الرأس في الماء يولد الديدان ثانية و بدون خروجه لانتم  
الفائدة للعليل

### البرقان

يكثر في الاسماك الاولى من الحياة ويعرف باصفار الجلد و يiatrics

العينين وغشاء المخاطي . ويشتهد اصفرار البول حتى يصبح الحفاظ ولا ترافقه اعراض اخرى غير سوء الهضم المعدي في الاداث . على ان صغار الاطفال قد يصابون احياناً باصفرار في الجلد يدوم من اسبوع الى اسبروعين ولا يدل على اليرقان الا اذا ظهر اثره في العينين

﴿العلاج﴾ - لا يحتاج الرضيع الى معالجة سوى شيء قليل جداً .  
واما الاولاد فيعالجون بالاطعمة المغذية السهلة الانهضام وأفضلها الحليب ومستحضراته  
ومن الادوية المنازل والمياه المعدنية وفي غير ذلك يداويه المأبسب

## الفصل الخامس

### في علل التنفس

الزكام الانفي - التهاب الحنجرة - التهاب الشعب الرئوية

• •

### الزكام الانفي - رشح بسيط

يصيب الاطفال الصغار لشدة شعورهم بالبرد وعدم استطاعتهم ابدانهم على مقاومته ، وليس من واسطة لوقاية الطفل من اسباب الرشح سوى الملابس الدافئة واجتناب البرد والحر كالجلوس في مجري الهواء وقرب النار ولا سيما اذا كان الرأس غير مكسوة بالشعر تماماً فيؤثر فيه البرد والحر . ومن اسبابه السكن في غرفه رطبة ولم تفتح نوافذها لادخال الهواء وشعة الشمس اليها . ولذلك يكثر هذا الداء بين الفقراء الذين يزدحرون عشرات في غرفة واحدة ولا يراعون قوانين الصحة على نحو ما سبقت اليه الاشارة

**(الاعراض)** - عطاس وتذمُّع العينين وخنة الصوت وارشاح سائل مخاطي من الانف . وقد تشتد العلة في الطفولية فترتفع حرارة الجسم ويضيق التنفس فيصعب الرضاع على الطفل . وأحياناً يمتد الالتهاب الى الاذن فيفقد العليل سمعه

**(العلاج)** - الاستحمام باء سخن في غرفة دافئة وتجفيف البدن بسرعة تامة وحفظ العليل على أثر ذلك في غرفة حرارتها أرفع من حرارة البدن بشيء قليل . وما ينفع جدًا في أول هجوم العلة زيت الخروع لتنظيف المui وياقوب عليه من بيج الحمى (ملحق ١٠٣) اذا اقتصت الحال استعماله . وكذلك دهن الانف من الداخل بالفالسلين اما بفرشاة صغيرة ناعمة تطلب من الصيدلية او بقطعة قطن تاف على طرف عود ويمسح بها سقف الانف وجداراه . ومن الضروري ان يحفظ العليل في فراشه واذا اشتتد النزلة يغسل قدماه بفنلي الخردل (ملحق ٤٩) وتوضع على الصدر لصق سخنة من بزر الكتان حسب (ملحق ٥٢)

### التهاب الحنجرة - الذبحة الكاذبة

هذا المرض من الامراض المزجية يحدث في الغالب بين السنة الاولى والستة من العمر واكثر حدوثه في الربيع والخريف حيث تكثر التغيرات الجوية وأحياناً يمتد الالتهاب الى القصبة أيضاً

**(الاعراض)** - تأتي النوبة في وقت النوم وأحياناً يسبقها اعراض منذرة وفي بعض الحوادث تهجم على العليل بغتة فيستيقظ من نومه مرعوباً ويمسك بهديه أو شيئاً آخر الى جانبه ويصلع سعالاً قصيراً متواتراً له رنقة معدنية وصوت أشبه بنباح صغار الكلاب . ويضيق التنفس وبيح الصوت ويزرق الوجه ويزرق وهذه النوبة تدوم نحو دقيقة او اكثر قليلاً وبعد نصف ساعة تهجم الاعراض

قاماً وينام العليل براحة الى الصباح . وفي النهار لا يشعر بشيء من اعراض العليل سوى السعال فقط . وربما تتكرر النوب في الليلي المتتابعة وهو نادر ويكون في الحنجرة غشاء كاذب يختلف عن الفشاء الدفتيري بخلوه من الميكروب . وأحياناً يشعر العليل بزكام وحمى خفيفة قبل ظهور الفشاء يوم او يومين

**(العلاج)** - ينذر بالبن والاطعمه السائلة ويقوى من الرطب والارياح الباردة . اذا ظهر في المساء اقل دليل يبني بقدوم العلة في الليل فعلى الام ان تنسق العليل جرعة من الدواء الذي وصفه الطبيب الواقع على معالجته . اذا لم يكن عنده شيء من ذلك فلا يأس من الاعتماد على الملاج المذكور في (ملحق ٤٠٤) . وفي اثناء النوبة او الاعراض التي تعقبها يحتمل العليل باء الحردل (ملحق ٤٢) ويعطي مقيي (ملحق ١٠٦)

ومن الوسائل المفيدة ان يشبع هو الغرفة بالبخار بواسطة مرشة بخارية او آنية أخرى على شكلها (شكل ٣٠ صفحة ٩٤) وينبوب منها ابريق من الصفيح يغلي فيه الماء ويترك على النار حتى يتضاعد البخار من أنبوته وينتشر في الغرفة او يطلق البخار رأساً على سرير العليل بعد الهجه ببلادة حتى يصدر على هيئة خيمة أما ما يعلق في اعنق الاطفال من الحجابات والاطواب الخ منعاً للعلة فهو ضرب من الخرافات لا يتجاوز تأثيرها أوهام الذين يعتقدون بها . اذا شفي العليل فليس لهذه الشعوذة اقل تأثير على صحته

### التهاب الشعب الرئوية

الشعب الرئوية اثنain متفرقة في أنسجة الرئتين يقال للكبيرة منها الشعب الغليظة والصغريرة الشعب الدقيقة او الانابيب الشعرية لتشابتها الشعر في الدقة

والحجم . وهذه الشعب تعرف أيضاً بالمسالك الهوائية لأن الهواء يدخلها في ثنايا التنفس فيتوزع في جميع أجزاء الرئتين وهناك يلتقى الهواء والدم مما فيقوم الاثنين بوظيفة مهمة للحياة ليس هنا محل الكلام عليها

فإذا كانت المسالك الهوائية الغليظة ملتهبة فالعلة هي البرونشيت أي نزلة شعبية بسيطة . وقد يشتد الالتهاب فيتهدى الى الشعب الدقيقة وعندئذ يتخذ اسم آخر وهو النبومونيا الشعبية كما سيجي في الكلام على ذلك بالتفصيل :-

البرونشيت

نزلة شعيبة بسيطة - السعال - التهاب الشعب الغلظة

البرونشيت مرض يُعرف بالتهاب حاد في المِسالك الهوائية الغليظة وأسبابه البرد او الجلوس في مجااري الهواء، والجسم عرقان . ويكثر في سن الطفولة ولاسيما في الربيع والخريف ببب التغيرات الجوية . وقد يحدث أيضاً في اثناء الحمى التيفودية والحمى الفرمزية والحمبة والخناق والشهقة والاسهال وأمراض الكلى والتسمين وفي الاحوال الناشئة عن التغذية السيئة كمرض الكساح وعمل الضعف الزائد في العلة الاخيرة يُعدّ الطفل لقمة التزلة الشعنة السبطة

﴿الاعراض﴾ - ارتفاع من الاف وارتفاع حرارة الجسم الى درجة ١٠٠ - ١٠١ ميزان فهرنheit ( $\frac{5}{9} \times 37 - \frac{38}{5}$  ميزان ستغراد) وسعال جاف في أول العلة ورطب في آخرها ويخرج مع السعال مخاط الا ان صغار الاطفال يبلغون المخاط فيخرج مع البراز عن طريق المستقيم

وقد يضيق التنفس من اشتداد الالهاب وتجمع المواد المخاطية التي ترشحها جدران الشعب الهوائية في أثناء العملة . واذا ارتفعت الحرارة عن الدرجة

المذكورة واشتدت الاعراض من بعد اليوم الثالث أو الرابع فيخشي يمتدّ من امتداد الالتهاب الى الشعب الدقيقة وتهديد العليل بما نسميه بالنيومونيا الشعبية مما سند كره في حينه

(العلاج) - تناول العلة في أولها بالملينات كزيت الخروع أو المانازيا في جرعتين متساويتين للاعمر (ملحق ١١٠) ولا يجوز ان يغفل استعمال المللينات أو المسهلات لما فيها من النفع العظيم للعليل ويتوارثها في الفائدة اصدق بزر الكتاب توضع سخنة على الصدر أو بين الكتفين نحو نصف ساعة ثقريباً وتقطعى بالقطن منعاً للبرد وتكرر اللصق كل أربع ساعات على يوم أو يومين وفي خلال تلك الفترات يدلك الصدر والظهر دلّاكاً اطيفاً بمزيج مؤلف من فنجان صغير من زيت الزيتون النقي وملعقة صغيرة من التربة بتينا وبعد نهاية الدلّاك على الصورة التي سبق ذكرها يلف الصدر والظهر بالقطن أيضاً ويخترس تمام الاحتراس من تعرية العليل للبرد ولا في أثناء الدلّاك لتلايكون علة اضرره وما ينفع جدأً على أثر ذلك غسل الرجلين بحمام خردي وكذلك شرب الماء الساخن مضافاً اليه نحو ٣ أو ٤ نقط من الكونياك أو غيره من المشروبات الروحية

فإذا تدبرت الأم هذه الوسائل بمحقق وتدقيق نام العليل من أول لصقة والنوم من أنجم وسائل الشفاء في هذا الداء ولذلك يجب أن تعم الحركة والضوضاء في البيت ما أمكن إلى ذلك سبيلاً ولا يسمح لأحد بالدخول إلى غرفة العليل غير أمه أو مرضته . ومن الواجب أن يجدد هواء الغرفة بفتح النوافذ والأبواب ولو مرة واحدة في اليوم . وأما الطعام فلين الثدي للرضاعن والبيض ولبن البقر للكبار وهو خير من اللحم ومستحضراته

### الزلة الشعبية الشعرية — اليومونيا الشعبية

تعرف هذه الملة بالتهاب المسالك الهوائية الدقيقة نذ كرها دون غيرها من أنواع التهاب الرئتين لكثرة حدوثها في سن الطفولة

**» الاسباب»** — تحدث هذه الملة على أثر الزلة الشعبية البسيطة (البرونشيت) كما تقدم في الكلام على المرض المذكور . ونأتي في سير الحصبة والدفتيريا وتصيب الأطفال المولودين حديثاً من تنشق رواح السوائل في أثناء ولادتهم . وهذه الملة شديدة الخطير على الأطفال وخاصة اذا وافق حدوثها طور التسنين وهي من هذه الوجهة كالأسنان شديدة الوطأة على الأولاد

**» الاعراض»** — ترتفع حرارة الجسد بسرعة زائدة حتى تبلغ في اليوم الثالث أو الرابع نحو ١٠٤ - ١٠٥ فهرشيتس (٤٠ - ٣٧ سنتغراد) وتحمر الوجنة ويسرع النبض . وفي الحوادث الثقيلة في صفار الأطفال يتنفس الانف ويضطرب عند مدخله من ضيق التنفس وسرعته . وقد يفقد الطفل شهيته الطعام فيرفض بصعوبة رضاعاً متقطعاً غير منتظم . ويشتد عطشه ويسهل سعالاً قصيراً مؤتاً ينفث معه مادة مخاطية صديدية وغالب الأطفال يلعنها فخرج عن طريق المستقيم

ويرافق الملة تشنجات عصبية وارق وفيه واسهال والعلامة الأخيرة ردية جدلاً . وفي الحوادث الشديدة يغلب المهدو على الطفل العليل فتباين على ظهره ملقياً رأسه الى الوراء وتصرفر وجهناه وتزرق شفتها ويصدر النبض سريعاً سطحياً وهي حالة سينية تزدري بالخطير الشديد على الحياة ومثل ذلك اذا هبطت حرارة الجسد الى مانحت الدرجة الطبيعية وأكثر ما تكون العلامات الاخيرة في تحفه ، البنية هذه خلاصة اعراض الزلة الشعبية الشعورية في الحوادث الثقيلة اما اعراض الحقيقة منها فتتجمع بعد أسبوع من بدء الملة ويدخل العليل في طور النقاهة أي يتوجه الى الصحة والعافية

**» العلاج»** — يلزم العليل الفراش وتحفظ حرارة الغرفة على درجة ٧٥ ف (٢٣ - ٢٠ س) وينبغي ان يتجدد هواه كل يوم ويحافظ

السرير بستائر على هيئة خيمة ويوضع الى جانبها مرشة بخارية (شكل ٣٠ صفحة ٩٤) او ابريق من الصفيح يفل في الماء على النار حتى يتشق العليل بخاره وبهذه الواسطة يتحلل بعض المخاط المائي الانابيب الهوائية فيخرج مع السعال ويرتاح العليل راحة عظيم من هذه العملية الصغيرة . ويحسن ان يضاف الى الماء قليل من ماء الجير فيفيد فائدة كبرى

**الاستحسام** — لا يجوز الاستحسام الا متى بلغت حرارة الجسد درجة ١٠٣ ف (٣٩ - ٣ س) وعندئذ يمسح البدن بماء حارته ٨٠ ف (٢٦ - ٢ س)

ومن الوسائل النافعة غسل القدمين بماء الحرجل سخناً (ملحق ٤٩) فان له فائدة عظيمة في تخفيف الحرارة وتسكين الاضطرابات العصبية

**الملابس** — يلبس العليل قيضاً من الصوف الخفيف الناعم مفتواحاً من الصدر والظهر حتى يسهل وضع اللصق عليها بدون ازعاجه أو تعریضه للبرد .

ويجب ان يكون الغطاء دافئاً خفيناً بحيث لا يموق حركة التنفس

**الطعام** — الحليب للاطفال وكبار الاولاد ويزاد للاخرين من مرق اللحم . ومتى نفه العليل يسمح له باكل البيض (برشت) وبعض الاطعمة

السهله المضم وادا ظهرت علامه ثدل على سوء الهضم فيعالج بالحقن أو المسهلات الخفيفة

**المنبهات** — هي المشروبات الروحية كالكونيك والوسكي وروح الشادر العطري كل هذه تتبه القلب وتفويه وتفيد الضعف ، البنية الذين تنحط قواهم من

شدة المرض

**اللصق** — تستعمل لصق بزر الكتان سخنه على نحو ماسبق ذكره في علاج الزلة الشعبية البسيطة وينبغي ان تكون حرارة اللصقة على درجة

١٠٥ - ١١٠ ف (٤٣ - ٤ س) تد على قطعة نسيج وتكرر أربع مرات

في اليوم الاول ومرة اومرتين في اليوم الثاني وهكذا الى اليوم الرابع . وقد يستعاشر عن اللصق بكمادات سخنة من زيت التربتينا (ملحق ٦٣) فيخف الالم وتنكسر حدة الالتهاب . والبعض يزجون الحزدل ويزر الكتان على نسبة واحد من الاول الى ٣ او ٤ من الثاني وقد جر به المؤلف كثيراً فأفاد فائدة عظيمة

## الفصل السادس

في امراض الدماغ والعصب وبعض الحواس الخصوصية

تشنجات الاطفال — خوف الليل — الارق — وجع الرأس — خوريا او رقص مار انطونيوس — خوريا العادة — الفاجل — الهديرسفلس — البلاهة — البكم والصم

°°°

### تشنجات الاطفال — هزة الحيط

هذه العلة من اشد العلل خطرًا على الاطفال . ومن اسبابها مرض سابق من الامراض الناهكة كالنيومونيا والقرمزية وغيرها كسوء الهضم والامساك والديدان والحييات الشديدة والتسمين وعمل الدماغ والمخيخ الحار واللحوف والالم الشديد والكساح والشهقة الخ . تكثر في اوائل الطفولة ويقل حدوثها من السنة الاولى فصاعداً . وهي على نوعين خفيفة وقوية فالخفيفة اعراضها حول العينين وثني الابهام ناحية راحة اليد وارتفاع الشفتين والجفنين وأحياناً الرأس والساقيين ومدة التوبة فيها دقيقة او كثر قليلاً

اما القوية ففيها ينقطع التنفس نحو دقيقة وينيب العليل عن الصواب ويتيسس جسمه ويزرق وجهه ويطبق فيه ويزبد وترتجف يداه ورجلاه ويصر على اسنانه وأحياناً بعض لسانه فيقضمه اذا لم يتدارك هذا الخطر بوضع مفتاح او

قطعة خشب بين الاسنان في أثناء التوبة . ثم تهجم الاعراض فيصرخ العليل ويتم . اما التوبة فختلف مدتها من دقيقة الى دقيقتين وأحياناً تبقى ساعة او ساعتين وهو قليل جداً . وفي بعض الحوادث تأتي التوبة بعد التوبة ف تكون سبباً لموت العليل

**العلاج** — يوضع العليل بدون امهال في حمام سخن (ملحق ٣٨) يغمره الى عنقه فقط . وتبل خرقة بالماء البارد وتوضع على الرأس مرات متواتلة وهو في المغطس . وبعد عشر دقائق يخرج العليل من الماء ويفل بلادة صوف ناعم بدون ان ينشف بدنـه . وقد تأتي التوبة على اثر اكـاة ثقـيلة على المـعدـة فـتعـالـجـ بالـمـيقـيـاتـ كـشـرـابـ الـايـكـاـكـ اوـغـيـرـهـ ماـ هوـ مـذـكـورـ فيـ (ـمـلـحـقـ ١٠٦ـ)

واذا استمرت الاعراض في حدتها بعد الوسائل التي تقدم ذكرها فيتحقق العليل بكـيـةـ كـافـيـةـ منـ المـاءـ الـاخـنـ اوـ حـسـبـ (ـمـلـحـقـ ٨٧ـ) ولكن المـفـاطـسـ والـوـضـعـيـاتـ الـبـارـدـةـ عـلـىـ الرـأـسـ كـثـيرـاـ ماـ تـفـيـ عنـ الوـسـائـطـ المـارـ ذـكـرـهاـ فـتـسـكـنـ الـاضـطـرـابـاتـ الـعـصـبـيـةـ فـيـ دـقـائقـ قـلـيلـةـ

وقد تشد التوبة الى درجة لا تؤثر فيها الوسائل التي تقدم يانها فعندها يجب أن يسرع باعلام الطبيب واذا كان المكان بعيداً عن الاطباء فلن الضروري ان ينشق العليل روح الايثير ينقط منه على المنديل ويترك على انه حتى تسكن الاعراض او تنكسر حدتها على ان الايثير لا يخلو من الخطير على الحياة ولذلك لا يجوز ان تستعمله الا في الاحوال التي لم تنجح فيها العلاجات المار ذكرها وخيف على العليل من الموت اذا لم يعالج بالايثير ولا يخفى ان اعراض هذه العلة كثيراً ما تلتبس باعراض داء الصرع المعروف بداء النقطة والفرق بين المرضى ان التوبة الصرعية تلازم العليل كما تقدم في العمر . و تعالج بالاطعمـةـ السـهـلـةـ الـهـضـمـ وـمـراـقبـةـ العـلـيلـ لـثـلـاـ يـسـقـطـ منـ مـكـانـ مرتفـعـ فـيـنـكـرـ عـظـمـهـ اوـ يـقـعـ عـلـىـ لـفـارـ فـيـ حـتـرـقـ °°°

## خوف الليل

يصيب الاولاد بين السنة الثانية والسادسة من العمر وهم في قمة الصحة فينهض العليل من نومه فجأة ويصرخ خائفاً مذعوراً ثم يقف في فراشه أو يركض في أرض البيت تائحاً لا يدرى ماذا يعمل وإذا سأله في اليوم التالي فلا يتذكر شيئاً مما جرى له في الليل وقد تأتي النوبة مرة واحدة أو أكثر في الليل الواحد وأحياناً تكرر في الليالي التالية ويندر حدوثها في النهار

﴿الأسباب﴾ - أهمها سوء الهضم وشدة حس الجهاز العصبي

﴿العلاج﴾ - يخفف الطعام اذا كان المرض حاداً من اختلال الهضم ويقتصر في المساء على الاطعمة الخفيفة السهلة الهضم كاللبن والمرق يتداوّلها باكراً قبل ميعاد النوم بساعات قليلة . وتحذب الأسباب المهيجة للإعصاب كالمناظر المخيفة والاصوات القوية وأشباهها، ويناسب ان يصرف العليل معظم نهاره في البراري والحقول بعيداً عن مجتمع الناس وهواء المدن الفاسد . وادام لم تنفع الوسائل المذكورة فيعالجه الطبيب لثلا تحول العلة الى نوب صرعية كا هي الحال في كثير من الاولاد

°°°

## الارق - السهر - المجموع

يأتي الارق من مصادر عديدة مختلفة منها المرض . والامساك . والام من أي نوع . والمناظر المهيجة قبل نوم المساء . والنوم في النهار أو في الليل باكراً . والجلوس من تطويل فسحات الرضاع والطعام . والاكل الى حد الكثرة في كبار الاولاد . والسكن في البيوت الفاسدة الاهواء . والغطاء الحار

في الليل . وزيادة حرارة الغرفة من اضرام النار فيها بكثرة في الشتاء . وبرد الاطراف السفلية . ونور المصباح الساطع في غرفة النوم  
 ﴿العلاج﴾ - يقوم العلاج بمنع الاسباب . وقد يكون العليل عصبي المزاج فيتبيّج عند اقل حدث يطرأ عليه وفي هذه الاحوال يعالج بالحمامات الفاتحة قبل النوم وفي الصباح يمسح بذرنه بالاسفنجات بدون ان يغمض في الماء ومن عادة النساء ان يسقين اطفالهن مغلي الحشيش ونحوه لاجل تنفسه وهو اصطلاح مضر جداً لانه كثيراً ما يكون سبباً لهلاكهم ولا سيما الضعاف البنية

°°°

## وجع الرأس

يعرف في صغار الاطفال من حركة الحاجبين والصراخ المستمر وتقلّب الرأس من جانب الى آخر واتجاه يد الطفل ناحية الوجع  
 ﴿الأسباب﴾ : كثيرة وصعبه منها التهاب غشاء الدماغ . والحميات بأنواعها . وسوء الهضم . والامساك والتعب وفتر الدم واجهاد النظر في القراءة . وكثرة الاشغال العقلية . والضعف . وأمراض الكلية والقلب . على ان الوقوف على أسباب المرض ومعالجته أمر شاق على الام بل هو فوق قدرتها ومعرفتها . وأفضل ما يمكن عمله قبل مجبي الطبيب هي الراحة التامة ومنع الصراخ والضوضاء في البيت . ولا يأس اذا كانت الام تنسى رأس الطفل بملاء البارد وتضع الحرادل على قفا العنق . وتحمم رجليه بناء الحردل سخناً ( ملحق ٤٩ ) وتمطيه مسهلاً وتنذبه بالاطعمة الخفيفة على المعدة كاللبن والمرق ونحوهما

°°°

فيكره المعلم على تحمل ما لا طاقة له به من قواعد العلوم طمماً في ارضاء أبويه لكي يتلو عليها في المساء جلاً مطمنة ينحظها غيّراً كالبيغاء من غير فهم او ادراك . ولا يخفى ان الولد الصغير لا يقدر على أعمال فكرته في واسطع شئ اذا تراكمت عليه الدروس الخاطئة قواه ووهن دماغه واستولت عليه اضطرابات عصبية كان في

أمن منها لولا حق والديه وطعم المعلم وجهه قوانين التربية المدرسية

ويكفي ان يقيم الاولاد في المدرسة اربع ساعات في النهار تخللها فترات من اللعب لتزويف ابدانهم وراحة اذهانهم . واللعب من أحوج الاشياء لاولاد المدارس لانه ضروري لنحوهم فضلاً عن انه طبيعي فيهم ومن الظلم ان يصدّوا عنهم ييل اليه طبعهم وينبغطون به من صنوف الالعاب الالزمة لاغراء ابدانهم وعقولهم

فتنة عليه يجب ان يكون المعلم عارفاً بأصول التربية وملاً بشيء من قوانين الصحة فيتصرف بالاولاد الذين نيت به تهذيبهم وتربتهم تصرف العارف لا الجاهل والمدارس الشرقية في حاجة الى هذا الاصلاح الصحي

والعلاج الشافي يقوم بما يأتي :

اولاً : ازالة الاسباب كرض القلب والروماتيزم الخ

ثانياً : التغذية السهلة الهضم وأفضلها الحليب والبن الرائب والفاكهه والحضره والحلويات في كمية قليلة يداوم عليها نحو خمسة عشر يوماً وينع من اللحم والبيض وكل غذاء فيه زلال

ثالثاً : الاستحمام بالماء الفاتر وتبریده رويداً بمالء البارد ثم يفرك البدن بعنفة جافة فركاً قاسياً ويدلك على أثر ذلك براحة اليد حتى تقوى دورة الدم ويسكن هيجان الاعصاب

رابعاً : المساهل كل يومين او ثلاثة أيام مرة لاجل تنظيف المعدة معاكسى ان يكون فيها من السموم او المواد المبيجة

خامساً : تهليل البدن مرتبين في اليوم يختار الماء الفالي حتى يعرق

### الخوريا - رقص مار انطونيوس

مرض عصبي يصيب الاطفال والاحداث وخصوصاً بين السنة الخامسة والرابعة عشرة من العمر ويعرف بتراقص عضلات الوجه واليدين والرجلين أي تحريراً كما حركة خجائية منواترة ومتقطعة . وقد تكون الحركات المذكورة شديدة فلا يستطيع العليل لبس ثيابه ولا المشي في الجهة التي يريدها . فإذا قعد لا يهدأ او أراد ان يتناول غرضاً نقفرت يده عنه او جلس الى المائدة وقع الطعام من يده . وقد تنكر النوب في بعض الحوادث فتأتي الواحدة بعد الاخرى حتى تلاشى قوى العليل ويختل عقله . وكثيراً ما يرافقاها مرض القلب وداء المفاصل المعروف بالروماتزم

**«الاسباب»** - منها الوراثة أي ان الاشخاص الذين أصيروا في هذه الملة في حداثتهم يعانون اولادهم لقبوها . ومثل ذلك المصابون بداء النقطة والصداع وغيرها من الامراض العصبية . ومنها الروماتزم وقرق الدم والخروف والمalaria وأمراض المعدة وآذى ما يكون حدوثها في اولاد المدارس من ضغط المعلمين عليهم وتشغيل عقولهم بما لا قبل لهم على تعلمه من الدروس وهم في سن لم يوه لهم لذلك

**«العلاج»** : علاج واقٍ . وعلاج شافٍ العلاج الواقي هو الذي يقي الولد من هجمات الملة فلا يحصر في المدرسة طول النهار لأن الحصر يضعف قواه البدنية والعقلية بقطعه عن الرياضة الجسدية الالزمة لنحوه . ولا يجوز ان يضغط عليه في دروسه أو يعاقب بالضرب او يهدد بالعقاب على ماجرت به العادة في بعض المدارس لأن الضغط والتهويل والتقويف تفضي الى امراض عصبية وخيمة العاقبة . ولسوء الاجت أن الوالدين قلما ينتبهون الى المضار الناجمة عن ذلك . خلماً تقوى قائمتها الولد على حل جسده وينطبق بعض الالفاظ يرسلونه الى المدرسة اما هرباً من حركاته او حباً بتعلمها باكرًا

جيداً وبهذه الواسطة تخرج المواد السامة مع البرق عن طريق الجلد فتسكن الاعراض وينام العليل مرتاحاً . ويكرر ذلك نحو اربعة أيام وفي خلالها يتناول الاغذية الخفيفة على المعدة وقد أفاد التبييل فائدة عظيمة في حوادث كثيرة

سادساً : المقويات كالحديد والزنخ في فقر الدم

• • •

### خوري يا العادة

يشاهد في الاشخاص حركات أو ارتجافات عضلية تشبه تشنجات الخور يا اي رقص مار انطونيوس وهي ليست خور يا وإنما هي عادة تنساط على أعضاء الجسم فتتحرك حركة تشنجية وكثير ما تكون هذه التشنجات في الوجه أو في الكتف وأحياناً في الرجلين . وفي الغالب يقصد صاحب هذه العادة ان يقلد بعض الحركات فترسخ فيه ملكتها حتى يصعب عليه الاقلاع عنها . وقد تكون في بدء الامر تشنجات خور يا خفيفة فيعتاد الانسان على هذه الحركات بدون انتباه او قصد منه . ولذلك يجب على الوالدين ان يرقبوا أولادهم بعين يقطانة فيتداركونهم بالنصح والارشاد حذرًا من ان تتمكن فيهم هذه العادة السمجة وتبق طول الحياة

• • •

### الفالج

مرض فيه تخمر العضلات قوة الحركة كلها او بعضها ومن أنواعه (١) فالج اولاده (٢) فالج الدفتيريا (٣) فالج الحبل الشوكي كا يأتي :-

• • •

اولاً : فالج الولادة - يصيب الاولود حدثاً اما في عضلات الوجه او الذراع فالارجل ينشأ عن ضغط آلة المولد على اعصاب الرأس فيحدث شللًا في الوجه . واحياناً ينكسر عظم الرأس فيتاثر الدماغ ويعيش الطفل مفلوجاً طول حياته . وفي الغالب يكون هذا الفالج خفيفاً ولا يلبث اياماً قليلة حتى يزول بناءً

وثاني اي فالج الذراع يحدث من الضغط على اعصاب اليد وذلك انه عندما يبرز الكتف في اثناء الولادة يد المولد اصبعه تحت ابط الطفل فيسجبه . وتحت الابط اعصاب متجمعة على هيئة ضفيرة يقال لها الضفيرة العضدية فتتأثر من الضغط فيكون ذلك سبباً لانفلاج اليد كما

﴿العلاج﴾ - تعالج الكسور بالجراحة وفالج الوجه يزول في ايام قليلة بدون معالجة . اما الذراع فيجب ان تدبر بالقطن وتلف برباط من شاش منعاً للحركة . ولا يجوز ان تترك اليد ممددة او يضغط عليها بالرباط لثلا يكون ضرره اكثر من نفعه . وبعد خمسة اسابيع يحل الزبطة و تعالج اليد بالفرك والدلك مدة طويلة ولا يقطع الرجا من هذا العلاج ولو لم يظهر فعله سريعاً لأن إشفاء الشلل بطبيعة يستلزم الصبر وطول الانتهاء

• • •

ثانياً : فالج الدفتيريا - يعقب مرض الخناق اي الدفتيريا . وفي الغالب لا تتجاوز الاصابة عضلات الحنجرة والعيتين فيدخل الطعام من مؤخر الاף . واحياناً يتاثر الجسم كله . واكثر الحوادث تشفي في وقت قصير

• • •

ثالثاً : فالج الحبل الشوكي - يندر حدوث هذه العلة قبل الشهر السادس من العمر وتكثر بين ذلك الوقت والسنة الرابعة ويظل الاولاد في خطر منها الى السنة العاشرة من العمر

• • •

الصف ) الاسباب ( - الحيات من اي نوع . والحر الشديد في فصل

﴿الاعراض﴾ - يصاب العليل بالحمى خجنةً ويرافقها هذيان خفيف وتشنجات عضلية واعراض اخرى غير واضحة . ولا يمكن تشخيص العلة قبل يوم او يومين حتى يظهر الشلل في اليدين او الرجلين . وكثيراً ما ينام الولد صحبيحاً وينهض في الصباح من فراشه مفلوجاً . وقد تتحسن حالة العليل في مدة قصيرة من الزمن او تبقي عضلات اليدين والرجلين ضامرة ضعيفة طول الحياة

»الملاج« - ان الاجزاء المصابة بالفالج تتأثر من البرد او بالحرى تكون باردة لضعفها وقلة الدم فيها فتختلف هذه الاسباب بالابسة الدافئة وبعد زوال الحمى وسائر الاعراض المصاحبة لها تمالج العضلات المفلوجة بالفرك والتمسید براحة اليدين وبهذه الواسطة تقوى دورة الدم وتنقذى الاعضاء الضعيفة فتعود اليها قوتها الحركية . وبعض يفضلون المعالجة بالكتير باه عوضاً عن الفرك والتمسید

السداوى سفلاوس

كلمة معناها مال في الدماغ او استسقاء الدماغ .  
ففي هذا المرض يكبر الرأس كثيراً ويظهر الوجه صغيراً على نحو ما ترى  
في (شكل ٣ من صورة ٤) . وفي الحوادث القوية يتأثر الدماغ فيضعف العقل  
ويفقد العليل قوة الحكم على جسمه

البلاهة - ضعف العقل

خلل في الدماغ يخالق مع الطفل او يحدث بعد الولادة من مرضٍ او آفةٍ اخرى تصيب الدماغ فمعيقه عن النمو . ويعرف الابه منذ الطفولة فلا يتبع مثلاً نور

- 101 -

القنديل بعينه . ولا ينتبه الى الصوت كا هي الحال في الاطفال الاصحاء المقول مع ان حاسة السمع موجودة فيهم . ومن العلامات الواضحة انه لا يقدر ولا يستطيع ان يمسك شيئاً في يده واحياناً يمر<sup>ر</sup> عليه سنان او اكثر قبل ان يمشي او يتكلم كلاماً مفهوماً . وربما بلغ السنة الرابعة ولم يلفظ سوى كلمات قليلة . وقد تكون البلاهة خفيفة فيتعلم اكثر وربما تحسنت حالته اذا وجد من يعنيه تعلمه منذ الصغر . ولذلك يجب على الام ان ترقب علامات البطل با كرا لثلا يفوت الوقت الذي يمكن فيه اصلاح العليل . وفي البلدان المتقدمة مدارس مخصوصة لتربيء البطل على الاشغال

الصلوة والبكاء

يولد الطفل أصمَّ ابكم لا يسمع ولا يتكلم وفي الاشهر الاولى من الطفولة يلتبس المرض بالبلهه فيصعب التمييز بينها . والفرق بين الاثنين ان الاصم لا ينتبه الى الصوت لانه لا يسمع واما الابله فيسمع ولكن ليس له عقل لكي يميز الاشياء بعضها من بعض . وفي الشهر السادس يظهر الفرق بينها جلياً فتجد الاصم ابكم بخلاف الابله قوي الجسم يتسم ويفهم ويقبض على كل شيء يتناوله بيده ولكننه لا يسمع واحياناً تتأثر حاسة السمع من الصوت القوي وذلك اما لانه لم يفقد حاسة السمع تماماً او انه يشعر بتموجات الهواء عند ما يغلق الباب او الشباك بقوه . وفي هذه الحالة يجب ان يفحص الطبيب اذنه لعله يتمكن من عمل شيء ينفع به الميل . واذا كان الرجاء قليلاً من شفائه فيرسل الى مدرسة الصناعة ليتعلم الاشغال اليدوية وكثيرون منهم يندفعون في الصناعة

## الفصل السابع

### في امراض العين والاذن

الرمد التعقيبي — الرمد البسيط — الجاجل — التهاب الاذن

ووو

### الرمد التعقيبي

يعرف بالتهاب العين التعقيبي يحدث بعد الولادة ثلاثة ايام وهو من الامراض الشديدة الخطير على العين وكثيراً ما يفقد العليل بصره فيعيش اعى طول حياته . وسببه التعقيبة في الام فتعلق جراثيم المرض بأهداب الطفل في اثناء ولادته . وقد تنتقل العدوى الى الطفل في اي الاوقات من حاضنة او خادمة مصابة بالعلة المذكورة ولذلك يجب ان تفحص الخادمة قبل استخدامها فان لم يكن من اجل هذا المرض فلاجل غيره من الامراض الخبيثة كالسفلس وسائر العلل الشديدة الدوى

» الاعراض » — تبتدئ في اليوم الثالث من الولادة بالصاق الاجفان بعد النوم ثم ترم العين وتتحمر ويشاهد الصديد سائل من جانبها ومتجمعاً بالاكثر تحت الجفن الاسفل منها

» العلاج » — لما كان هذا المرض شديد الخطير على العين فمن الواجب ان تسرع الام باعلام الطبيب عند اول علامات تشاهدها من علامات العلة المذكورة فيتداركها بالوسائل الالازمة قبل فوات الوقت ولا بأس اذا ذكر شيئاً من طرق المعالجة بهذا الخصوص كما يأتي :-

اولاً : اذا كان المرض في عين واحدة كا هي الحال في اكثر الحوادث

فتدارك الصحيحه ببطها وتطهيرها بقطن بوريكي

ثانياً : نفصل الاجفان المتتصقة بدهنهما بالذايسين او مادة أخرى طيرية كالزبدة ثم نغسل العين المصابة بالفسول الذي يصفه الطبيب حتى تنظف جيداً من المفرزات المرضية ولا سيما الصديد المتجمع تحت الجفن الاسفل بكثرة . وينبغي ان يكون العليل عندئذ مضطجعاً على ظهره ورأسه مائلأً تاحية العين المروضة حتى ينزل الصديد مع الماء بدون ان يصيب العين السليمة في الجانب الآخر فيعد فيها

ويستعمل لغسل العين قطارة زجاج (شكل ٤٤) او قطعة قطن بوريكي تبل بالفسول ونضر فوق زاوية العين المجاورة للاف حتى تنزل الاوساخ بعيدة عن العين الصحيحة على نحو ما سبقت الى ذلك الاشارة

ثالثاً : يجب ان تحرق الحرق والقطن وسائر الاشياء التي تستعمل للعين خوفاً من انتقال العدوى بواسطتها . وأما المناشف فتوضع نحو يوم كامل في محلول حامض الفينيك (ملحق ٩٢) ثم نغسل بعد ذلك وتغلى على النار بباء الصودا حتى يموت الميكروب العالق بها ولا يبقى له أثر فيها

رابعاً : يجب ان تختبر المرضية التي تتعهد العليل من امس عينيها او عيني غيرها باصابتها وهي ملوثة بمفرزات المرض فنفصل يديها أولاً بالصابون والماء السخن ثم نمسحها بمحالل مضادات الفساد (ملحق ٩٦ و ٩٧) نحو دقيقتين او اكثر منعاً للعدوى

خامساً : قد ينبع ان تلافى اسباب العدوى بغسل الاعضاء التناسلية قبل الولادة بمحالل مضادات الفساد وغسل عيني الطفل حين ولادته بمحالل حامض البوريك (ملحق ٧٥) يكرر مراراً

والبعض من الاطباء يستعملون قطرة نترات الفضة . وهذا مايسعى طبأ بالعلاج الواقي

### التهاب الاذن

وجع الاذن — سيلان الاذن

يكثُر حدوثه في زمن الطفولة واعراضه ألم شديد يأنّي غالباً في الليل  
فيصرخ العليل مراخاً قوياً متواتراً لا يغفل في تسكيته شيء على الاطلاق .  
ثم لا يلبث الام ساعات قليلة حتى يزول من اصله ولا يعود الانادراً . وكثيراً  
ما يخف الوجه على اثر سيلان القبح من الاذن وعندئذ ينبغي ان تتحقق بالماء  
السخن حتى تنطف من القبح جيداً واذا بقي فيها كرهت رائحته وكانت  
عاقبة سينية

ويرافق العلة حمى خفيفة وثقل في السمع . واذا كان الطفل صغيراً رفع  
يده ناحية الاذن الموجعة او كبرياً اشار الى مركز الام في اذنه او استانه .  
وفي مثل هذه الاحوال يجب على الام ان تفحص طفلها بدقيق وامعن فاداً بكى  
من الضغط بالاصبع خلف الاذن او امامها فذلك دليل على ان الملة في الاذن

**العلاج** — تقنن اللصق الرطبة والحقن بالأدوية من

اي نوع . و تعالج الاذن بالوضعيات السخنة الجافة (انظر صفحه ١١١)



والحقن بالماء السخن فقط بمحقنة كونشوك طري (شكل ٣٦) .  
واذا تذرع الوصول الى الحقنة فيسكب الماء في الاذن الموجعة  
والعليل مستقر على جنبيه السليم ثم تقطعي بقطعة فانلا بعد  
تسخينها على النار ويكرر وضعها على الاذن مراراً . ولا يجوز محقنة الاذن  
ان تسد الاذن بالقطن الا اذا كان العليل خارج البيت

وأحياناً يسيل القبح من الاذن بكثرة زائدة ويبيح الام شديداً وعندئذ  
يجب اعلام الطبيب بالسرعة لانه فضلاً عن ان هذه العلة توادي في غالب  
الحوادث الى فقد السمع فقد تنتهي أيضاً بالتهاب الدماغ وتكون سبباً  
لهلاك العليل

### الرمد البسيط

يكثر هذا المرض في الاطفال والاحداث واعراضه احرار في العين واحياناً  
يكون من نوع أقوى وأصعب من الرمد البسيط فيشاهد في القرنية (سودالعين)  
بشرة صغيرة بقدر طبعة الديوس فاذفتح العليل عليه تالم من نور الشمس والمباح  
ولما كان التمييز بين امراض العين الخففة والقوية امراً صعباً جداً على الام  
فن الواجب ان تعتمد على الطبيب وقمع الرياط واللصق التي تستعملها العامة  
والقطرات التي يبيعها الصيادة وأصحاب الحوانين . على انه يجوز ان تنسى العين  
من الخارج بالماء البارد وستعمل القطرة حسب (ملحق ٨٠) لتفحيف الالتهاب  
وتلطيف الام الى ان يأتي الطبيب

٠٠

### الشعيرة

الجلل — الشحاذ

ورم التهابي في حافة الجفن يكثر في سن المداثة ويصاحبه حكة وآلم  
خفيف ولا يلبث الورم ابداً كور ان يتقيح ويتفقاً او يرتجي ويزول في أيام قليلة .  
وقد يكبر الورم فيعالج بالشق وكثيراً ما يتكرر حدوثه بسبب انحراف عام في الصحة  
فيداوى بالقوىات . أو من خلال في البصر فيصلح باستعمال النظارات وهو كثير  
المحدث في أولاد المدارس صغراً وكباراً

**العلاج** — يقوم بالفسولات السخنة من محلول حامض البوريك  
(ملحق ٧٥) او مغلي الحبازي تبل به قطعة شاش ناعم وتوضع على العين مراراً .  
والعامة تعالج الشعيرة بلب الخبز سخناً يشحذونه من الفرن ولذلك اطلقوا عليه  
اسم شحاذ وفائدة لب الخبز كفائدة الفسولات السخنة في ازالة الالتهاب

٠٠

وتنفف الاذن من القبح بالياء السخن بمحنة الكوتوك الطري كما ترى في الشكل وهي سلية العاقبة وأفضل ما وجد من أنواع الماقن هذه الغاية ومن الضروري ان يكون الطعام سهل الهضم كالمرق واللبان وغيرها من الاطعمة الخفيفة على المعدة وتحفظ الغرفة دافئة على درجة ٧٠ ف (٢٦° س) وما ينفع كثيراً المساهل كل يوم أو يومين بحسب الاعمار وكذلك مزيج الحى (ملحق ١٠٣) كل هذه تساعد على تحفيز الانهاب

## الفصل الثامن

### في امراض العظم والمفصل والجلد الخ

تشوه الرأس — تشوه الاصابع — اعوجاج القدم — تقوس الفلهر — تقرح السرة — نزيف السرة — التايل — نقاط الحر — الاكزما — الشري — تسلخ الجلد — تشقق وخشونة الجلد — القشب — نقاط السنين — الحكة البسيطة — الحرب — الدمامل — قو با الحى — قشرة الرأس — القرع — الحزاردة

\*\*

### تشوه الرأس

لتغير هيئة الرأس الاصلية من الضغط في أثناء الولادة وهذا التشوه يحدث بعضه من زيان العظم من مكانه وبعض الآخر من انتفاخ جلة الرأس كما ترى في (شكل ٢ من صورة ٤) وقد يتشوّه أيضًا من الضغط عليه بألة المولود وذلك في الاحوال التي تتعسر فيها الولادة ويضطر الطبيب الى سحب الولد من بطن امه وهذه التشوهات تزول في أيام قليلة بدون معالجة وفي بعض الحالات يظهر في الرأس ورم بقدر حجم البيضة ينشأ عن تجمّع

الدم تحت جلدة الراس او يشق الدماغ من فتحة غير طبيعية في الججمة . فيرتفع الجلد فوقها وهو نادر جداً ولا يزول من نفسه وتشير هيئة الراس أيضاً في مرض الكساح والميدروسفلس . في الاول يكون مسطحاً من قته وفي الثاني مستديرًا مر بما ( شكل ١ و ٣ صورة ٤ ) وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه

\*\*

### تشوه الاصابع

قد يخلق الولد وأصابع يديه ورجليه زائدة عن العدد الاصلي أو متتصقة بعضها بعض او بواسطة نسيج يشبه النسيج الذي يشاهد في قدمي البسطة وغيرها من طيور الماء . تعالج بالحرارة باكرًا

\*\*

### اعوجاج القدم

قد يخلق الطفل وقدمه معوجة وقد يكون الاعوجاج اكتسياً يحصل بعد الولادة من سبب آخر وفيه تحرف القدم عن وضعها الطبيعي الى الجهة الخارجية او الداخلية والغالب الاخيره . تعالج بذلك والتمسدو بشدات خصوصية برأي الطبيب تحفظ فيها القدم حتى يتقوّم اعوجاجها على توازي الايام . واذا طالت المدة على غير فائدة فتعالج بالحرارة

\*\*

### تقوس الظهر — التواء العمود الفقرى

تاني هذه العلة على ثلاثة أنواع . الاول تنوّي فيه سلسلة الظهر ناحية

الجانب الايمن او الايسر ويقال له التواء الظهر الحانبي . والثاني على شكل حدبة صغيرة في القسم العلوي أو السفلي من العمود الفقرى ويقال له مرض بوط والثالث في الكساح وفيه يتقوس العمود الفقرى من أوله إلى آخره وليس قسماً منه كافي النوع الثاني ( انظر شكل ٣٧ )

٢٠

### نفرخ السرة

كثيراً ما يعترى السرة فساد فترتخي وتتكسر رائحتها ويرشح منها سائل مصلي ثم تسقط وتنرك قرحة كبيرة . وفي بعض الحوادث يتكون في السرة درنة صغيرة بقدر حجم الحبة فيرشح منها سائل يكون سبباً لتهيج جلد البطن المحيط بها



(ش ٣٧)


التواء العمود الفقرى في الكساح

«العلاج» - تعالج بتحفيتها بذرور مؤلف من مقادير متساوية من حامض البوريك واسيد الزنك يكرر مراراً في النهار . واذ لم تنفع هذه الواسطة فيعتمد على الطيب وهو يعالج القرحة بالادوية الكاوية او يستأصل الدرن بالجراحة

٢١

### نزيف السرة

تنزف السرة دماً بعد الولادة بساعات قليلة او عند سقوطها في اليوم الرابع



١ - صورة ولد كسيح رأسه مسطحة (٢) هير وصفى في اسفله ، المدعنة (٣) رأسه مسطحة (٤) رأسه مسطحة (٥) هير وصفى في اسفله ، المدعنة (٦) هير وصفى في اسفله ، المدعنة

أو الخامس من الولادة . في الحالة الأولى تربط السرة بخيط حرير قوي في مكان أسفل الخل الخارج منه الدم . وفي الحالة الثانية يضغط على المكان النازل منه الدم بين السباقة والآبهام إلى أن يأتي الطبيب

• • •

### السائل -- السنطة

تكثر في الأطفال وتنمو وتزول بسرعة بدون معالجة والفضل أن يتولى الطبيب علاجها ولا يعتمد على أقوال الدجالين في شفائها بالطلاسم والشعوذات وغير ذلك من الأكاذيب

• • •

### نفاط الحر -- نفاط العرق

هو طفح جلدي ينجم عن شدة الحرسواد كان في الصيف ألم في الشهاء من لبس الثياب الصوفية والمرق الذي يحدث بسببها . ويكثر في الموضع التي يفرز منها العرق بكثرة كالعنق وتحت الإبط وغيرها . والنفاط المذكور عبارة عن مللات أو حلقات مجردة مرتفعة قليلاً عن سطح الجلد وقد تكون حويصلات ملتبة بحجم طبعة الدبوس وأحياناً يظهر الاثنان في وقت واحد مما ويظهر النفاط بسرعة زائدة مصحوباً بحرقان وحكمة خفيفة بخلاف الاكزما فإن النفاط بطيء فيها والحكمة شديدة لا تطاق كما سيأتي في انكلام على العلة المذكورة

﴿العلاج﴾ : يعالج هذا النفاط بلبس الثياب على قدر اللزوم والتعويل على لبس القمصان القطنية عوضاً عن الصوفية في أيام الصيف وخصوصاً إذا كان البدن معداً لقبول العلة (راجع لباس الأطفال) . وإذا كان الجلد متبيجاً فيعالج

ومنها شكل كثير الحدوث فيه يجف الجلد ويحمر ويناظ وينشقق وأشكال أخرى كثيرة لا محل لذكرها في هذا المختصر

**الأسباب** — الوراثة وسوء التغذية وعدم مراعاة قوانين الصحة في النظافة والمعيشة . وبالبعض يصابون بها لاستعداد أبدانهم لقبولها من المحراف في امرائهم ومن أسبابها كل ما يهيج الجلد مثل سيلان المخاط من الأنف واحتكاك الثياب وتجفيف البدن بمناشف خشنة واستعمال الصابون الحاوي مواد حريفة مهيجية . وكذلك الرطوبة والحرارة القوية والبرد الشديد . وتأتي على أثر التلقيح بالمحجري في سير الحصبة وفي الاخرية تظهر في الجفون . وتحدث في الأطفال من كثرة الرضاع والطعام وخصوصاً الأطعمة النشائية قبل آكلنا نمو الغدد التي تفرز اللعاب لهضمها (انظر صفحه ٦٤)

**الاعراض** — تشتت الحكة في جميع أشكال الاكزما الى درجة لا نطق . وتزداد في الليل حتى تنهك العليل وتحرمه النوم . ويصاحب العلة ورم في الغدد تحت الفك وارتشاح من الاذن وجرب في الاجفان . والاكرزما اما موضعية تحصر في جلدة الراس والوجه وأسفل الذقن او عامة فتنشر في الجسم والساقيين بقعـاً صغيرة وكبيرة . وقد تكون حادة أي مريعة النبو او تخت حادة فتنمو نمواً بطيئاً . أو مزمنة فتدوم أشهرًا وسنيناً طويلة

**العلاج** — تعطى الملينات من زيت الخروع او المنازيا ولا سيما في أول هجوم العلة . ويقتصر على الطعام الموافق والسهل الهضم حسب العمر والزاج (انظر صفحه ٥٥)

ومن الوسائل النافعة ان تربط يدا العليل الى جانبيه حتى يتنعم عن الحكة التي هي من اعظم الاسباب المهيجة . وكذلك ينبغي ان يتجنب العليل ببس الثياب الخشنة وغسل المكان المأوى بالصابون وغير ذلك من الاسباب التي تهيج الجلد والافضل ان يستعمل لذلك غسول النساء والبوريك (ملحق ٧٨) او ماء الخلالة واذا ظهرت الاكزما بين ثنيات الجلد في العنق او بين الخدين والاتين فيوضع

بدرور مركب من مسحوق الكفور والزنك (ملحق ٨٩) وبالملينات القلوية (ملحق ١٠١) او المنازيا المكاسة . وتحتفظ الحكة بدهن الجلد بمحلول الصودا او النشاء بنسبة ملعقة صغيرة الى ١٦ فنجان ما صغير ويترك حتى يجف

°°°

### الاكزما — الرابعة

مرض جلدي يكثر في سن الطفولة ولا سيما قبل السنة الاولى من العمر وقد يحمر الجلد من الالتهاب وينكون على سطحه قشور ونفاط مختلف الشكل . وهذا النفاط صغير جداً وقلما يتتجاوز حجمه طبعة الدبوس . وهو على ثلاثة أنواع الاول نفاط مملوء مصلاً مصفرأً او سائلاً مائياً لا لون له . والثاني مملوء قيحاً . والثالث جاف لا مصل فيه ولا قيح . فالاول يقال له في اصلاح الطب النفاط الحويصلي والثاني البثري والثالث الحلمي . ومن أجل ذلك ذكروا للاكزما ثلاثة اشكال

الشكل الاول : اكزما حويصالية وفيها يكون الجلد محراً لاماً او مكسواً حويصلات صغيرة ممتلئة مصلاً او سائلاً مائياً كما سبق بيانه . وهذه الحويصلات لا تثبت مدة قصيرة حتى تنفجر ويسهل منها المصل فيندى الجلد ويبرم ويحمر وتنكون على سطحه قشور مصفرة عسلية اللون وأحياناً يتسمك الجلد وتترى البشرة تختنه

الشكل الثاني : اكزما بثوية وفي هذا الشكل تصير الحويصلات بثوراً فيسهل منها القبح وتنكون على سطح الجلد قشور صفراء منضرة لا تثبت ان تجف وتسقط

الشكل الثالث : اكزما حلمية وفيها يظهر النفاط على هيئة حلقات مستديرة حمراً لامعة او قاتمة وفي أكثر الحالات تحول الحلقات الى حويصلات

يینهما القطن البوريكي منا للاحتكاك . واذا كان الجلد محرماً ومرطاً فينف بالبزموت والزنك (ملحق ٩١) وأما القشور فنزل برطبيها بزيت الزيتون التي وغير هذا النوع من الزيت يهيج الجلد ولا بأس اذا كنا نذكر علاجاً مفيداً ومحيراً لاكرزما الراس لانه كثيراً ما تظهر هذه العلة في جلدة الراس ويبدو شفاوها اذا لم تعالج حالاً . اما الصفة فهي :-

|              |              |
|--------------|--------------|
| اوكيدي الزنك | ٨ جرامات     |
| مسحوق النشا  | ٨            |
| حامض سالسييك | ٦٠ سنتكراماً |
| فالسلين      | ١٥ جراماً    |

وكيفية استعماله ان تخلق شعر الراس وتدهن الجبوب بزيت النقي في الماء حتى تلين القشور وتسقط وبعد ذلك يدهن بالمرهم مرتين في اليوم ويلف الرأس بالشاش المطهر وفوقه ورق زيتني وفوق الكل رباط متين ويداوم على ذلك مع الفسل بمحلول البوريك (ملحق ٧٥) الى ان يشفي

°°

### الانحرافية - الشري

نفاط جلدي يظهر على الكيفية الآتية :-

يشعر العليل بشيء يحرقه في ساعده أو ساقيه أو مكان آخر في بدنه فيحكة بأظافره وعند ذلك يظهر النفاط على سطح الجلد بقماً محمرة أو مبيضة مختلفة الحجم وهذه العلة تشبه النفاط الذي يحدث من ملامسة الانحراف وهو النبات المأهوف بالقريص . وقد تظهر سريعاً وتزول سريعاً وأحياناً تدوم ساعات قليلة او يوم أو يومين فاكثر الى ثلاثة أيام . وقد تزمن فتمكث أشهراً وسنيناً . وتصبحها

حكة مزعجة وفي بعض الحوادث حتى جزئية ويكثر حدوث الانحرافية من سوء الهضم وخصوصاً الاطعمة التي لا تتوافق مزاج العليل كالسمك وبعض اصناف الفاكهة والنطر والشاي والقهوة . على ان ما يضر الواحد من الاطعمة المذكورة قد لا يؤثر في الآخر وذلك لتفاوت الاجسام في الاستعداد لقبول الامراض . وتحدث أيضاً من لسع الحشرات كالبراغيث والناموس وغيرها

﴿العلاج﴾ - اذا كانت العلة خفيفة فلا تستدعي اكثر من تخفيض الطعام ومسمى من المنازيا يعقب عليه الدواء المذكور في (ملحق ١٠١) ويذر على النفاط مسحوق الكافور المركب (ملحق ٨٩) اما الحمى فتحتفف بالاشرة المرطبة كشراب التوت والليموناده وبالاستحمام بالماء الفاتر كل يوم صباحاً ومساءً . وما ينفع كثيراً الخل والماء في مقادير متساوية او غسول مبرد (ملحق ٨٤) تبل باحدتها قطعة قطن وتنس بها بقع النفاط بالضغط عليها قليلاً قليلاً . وكذلك حمام النساء والاصودا (ملحق ٤٣ و ٤٤) يفيد فائدة كبيرة . واذا دامت العلة اياماً قليلة فيعتمد على الطبيب حذراً من استغفارها

°°

### تسليخ الجلد - التسميط

يحصل من احتكاك الجلد ببعضه البعض واكترا ما يكون بين الفخذين والآيتين وتحت الابطين ويحدث في ثنيات جلد العنق في الاطفال السماط وقد يستد التسليخ فيحرر الجلد ويتدنى ويصير منظره مثل منظر اللحم الناري .

﴿الاسباب﴾ - الاهمال وخسونة الحفاظ وعدم مراعاة قوانين النظافة .

﴿العلاج﴾ - تغسل التسليخات بماء النساء ثم تجفف بقطعة قطن بوريكي ويذر عليها مسحوق الطلاق . وفي الاهمال يدهن الجلد مراراً ما بين الآيتين بالفالسين لوقايتها من الرطوبة

وما ينفع أيضاً المساحيق القابضة (ملحق ٩١) يرش منها على قطعة شاش  
حال من النشاء وتوضع بين ثنيات الجلد منعاً للاحتكاك الذي يهيج الجلد ويزيد  
العلة وأبالاً

### تشقق الجلد وخشونته

يحصل التشقق من الاسباب التي تقدم ذكرها في تسلل الجلد ويعالج بالوضعيات  
السخنة الرطبة وتحفيف الشقوق على أثرها  
وخشونة الجلد تعالج بزيت الزيتون او الفازلين بعد الاستحمام

### القشب - الشرت

يحدث في قفا اليدين وجلد الوجه وأسبابه التعرض للبرد . يمنع بلبس الكفوف  
وتغطية الوجه ويفرك بزيت الزيتون أو الفازلين  
ومن الوسائل المجردة رغوة الصابون البادي تفرك بها اليدان حتى تشف  
 تماماً ويسعى ان يكرر مراراً فتزول خشونة الجلد

### تفاط التسنين

ويقال له نفاط المعدة يصيب الاطفال عند طلوع اسنانهم او في امراض  
المعدة وهو عبارة عن بقع حمراء يبلغ حجم الواحدة قدر فلقة الحصى مرتفعة قليلاً  
جدلاً عن مساواة سطح الجلد تظهر فجاءة وتدوم ساعات او اياماً قليلة  
فيتسكب عنها هيجان في الجلد . وهذا الشكل من التفاط الجلدي يتبع بنفاط

الحصبة ويمتاز عنه بسرعة زواله وغيابه ثم رجوعه بعد أيام قليلة . ولا يصاحب  
زكام انفي كما هي الحال في الحصبة . تعالج هذه العلة باصلاح المضم اذا ظهر  
في أثناء التسنين فيوجه العلاج إلى السبب

\*\*

### الحكمة

على ثلاثة اشكال (١) الحكمة البسيطة (٢) الجرب (٣) القمل

\*\*

اولاً : الحكمة البسيطة - فيها تنفس حبوب صغيرة على لون الجلد وهي علة  
مزمنة يشتت فيها الاكلان (الكرش) ولا يقدر ان يضبط العليل نفسه عن  
الحراك حتى يسيل الدم من الجزء المصابة . ولها اشكال كثيرة منها حكة المعدة  
وحكة الفرج وحكة الخصيتين وكلها علة واحدة وكثيراً ما تلتبس الحكمة بالجرب  
والقل ولا سيما قل العاني (الطاطي) واحياناً يجتمع الثلاثة في شخص واحد  
متذمّلاً به عذباً شديداً

ثانياً : الجرب - يتميز عن الحكمة بوجود قراحة الجرب وهذه القرادة تثور  
في الجلد وهناك تنفذ وتتضخم بزرها . وقل العانية يعرف عند عامة بر الشام بالطاطي  
وهو اعراض من قل الرأس مقره على الغالب شعر العانية والخصيتين والصدر .  
ويلايق بحدوث الشعرة حتى يصعب نزعه الا بآلة حادة . وسيانه تلتصق بالشعر  
مثل سيبان قل الرأس

اما الحكمة والجرب فال الاولى ان يعالجها الطيب . وقل العانية يعالج بالاستحمام  
(ملحق ٩٥) وفي الكبار يعالج بحلق الشعر والفرك به الزباق والاستحمام  
السخن صباحاً ومساءً حسب مشورة الطيب

\*\*

### الدمامل

الدممل في اصظلاح الطب اتفاخ مسود مائل الى الحمراء يظهر منفرداً وافواجاً على سطح الجلد واكثر ما يكون ظهوره في قفا العنق والجبهة واحياناً في الظهر والفخذين . والعامنة تسمى بالبندقة لانه لا يتجاوز في الغالب ججم البندقة وهو موئم جداً . واذا انفجر خرج منه قيح مدمم وشوهد فيه كيس ايضاً يعرف عند العامة بالشرفة . فاذا استوصل الكيس فرغ القيح وتم الشفاء في قليل من الايام

أسبابه الضعف العام والسفاس و يحدث في الاطفال من التغذية السيئة وسوء الهضم المزمن وبعض من الاولاد معدون لقبوله مع انهم يكونون في صحة جيدة **(العلاج)** يقوم بالتدويات وتغيير الهواء ودهن الدمل بالاكتشيوال والماء تعالجه باللصق السخنة من مسحوق بذر الكتان والافضل ان يمزج بمحول حامض البوريك (ملحق ٧٥) عوضاً عن الماء الصرف او يعوّل على وضعيات مضادات الفساد (ملحق ٦٢)

°°°

### قو بالحمى — عقابيل الحمى

هي نقاط مملوءة سائلاً مائياً يظهر بعد الحميات على الشفتين وحول المخدين واحياناً على الوجه وتحت الذقن . يعالج بدهنه بالاكتشيو او مرهم الزنك والبرزموت (ملحق ٦٨)

°°°

### قشرة الرأس

قشرة الرأس على نوعين زيتية وجافة . فالنوع الاول يصيب الاطفال

كثيراً واذا لم يتدارك بالنظافة منذ الولادة او بالمعالجة تكون القشور على شكل بقع كبيرة مصفرة تسمىها عامنة برالشام «خبزة الرأس» وعامنة المصرىين «جلجخ» وي Zum البعض من العامنة ولا سيما في هذه البلاد وهو Zum باطل ان القشور المذكورة اذا أزيلت من الرأس انفجر اليافوخ ومات الطفل مع انها لو تركت من غير معالجة كانت سبباً لحدوث مرض جلدي في فروة الرأس وكثيراً ما شاهدنا في القطر المصرى مثل هذه الحوادث وكلها تنتهي بمرض جلدي يصعب شفاؤه

**(العلاج)** — يمنع تكون القشور في الرأس بالنظافة التامة على نحو ما تقدم شرحه في استخدام الاطفال . ويعالج بمرهم حامض البوريك (ملحق ٧٠) يفرك به موضع القشور فيمنع ارتشاح المواد الزيتية . وتزول القشور بفرركها بزيت الزيتون في المساء وغسلها بالماء الساخن والصابون الفينيكى في الصباح . ويحترس من تنشيط الشعر باستان المشط الرفيعة لثلاثة تجذيش جلد الرأس او تحرقه . والافضل ان تستعمل أسنان المشط الغليظة ويقص كل الشعر بفرشاة ناعمة بانتباه زائد واذا زالت القشور وشوهدت الادمة تحتها طرية ترشح مادة رطبة فالمرض هو اكراها وليس قشرة الرأس (انظر اكراها)

والنوع الثاني من القشرة يصيب كبار الاطفال وهو عبارة عن قشور جافة مثل تخلة الدقيق تتطاير من شعر الرأس عند تنشيطه او صقله بالفرشاة . يعالج بغسله بالماء والصابون السلسلى وقد تستعصى العلة ويصحبها سقوط الشعر فيما لجأ لها الطبيب

°°°

### القرع — السعفة

مرض ناشئ عن نوام فطرية تظهر في الرأس ولا ترى الا بالمكرسكوب وهو

من امراض الحداثة وشفاؤه صعب جداً ويجب عند ظهور العلة ان يمنع المصاب عن الذهاب الى المدرسة وتجمل أدوات الغسيل كالمناشف والمشط والفرشاة خاصة به ولا يستعملها أحد سواه في البيت خوف العدوى

\*\*

### الحزازة

تظهر في الوجه وسائر اجزاء الجسم على هيئة حلقات وهي علة جلدية مكروية تعالج بالمرهم (ملحق ٦٩) تفرك به بقع الحزازة مرتين في اليوم لمدة أسبوع او اكثر تبعاً لتفصي الحال واذا طالت يعالجها الطبيب

### الفصل التاسع

#### في الامراض العفنية

الحمى التيفودية - الحمى القرمزية - الحصبة - الحصبة البرمانية - جدري الماء او الدجاج - الجدري الاولي - جدري التطعيم - الحمرة - الخناق (الدفتيريا) الشهقة - ابو كريب

معنـ

الامراض العفنية هي الامراض المعدية تنتقل الى الانسان بواسطة الطعام والشراب والهواء والثياب والكتب والتحارير الخ. وبعض منها تسمى بالحمى النفاطية لانها تميز عن غيرها بالنفاط الجلدي كالحمى القرمزية والجدري والحمصة الخ. ولا سبيل الى التخلص من هذه العلل المميتة الا باجتناب اسباب العدوى والمرضى المصابين بها

على ان البعض من هذه العلل يكون تشخيصه على الام والبعض الآخر يصعب عليها جداً وأصعب منه المعالجة بدون ارشاد الطبيب وقد شرحنا ماهية كل مرض من الامراض العفنية في جدول خصوصي تميّزاً تميّز العلل المذكورة (انظر جدول الامراض العفنية وراجع صفحة ٩٦ - ٩٨) لاجل

#### الاصطلاحات الطبية

\*\*

#### الحمى التيفودية

هذه الحمى تصيب الاطفال والاحداث في جميع الاعمار وتختلف في سيرها عن البالغين بخفتها وطأتها وقصر مدتها

ويذهب فريق من الاطباء الى ان الحمى المذكورة لا تصيب الاطفال قبل السنة الاولى من العمر مع ان التحريات الميكروسكوبية اثبتت وجود العلة في جميع اطوار الحياة من غير استثناء. وقد شاهد المؤلف في مستشفيات الولايات المتحدة الاميركية بضعة اطفال أصيبوا بالحمى التيفودية في الشهر الخامس والثاني من العمر وكان سببها ارضاخ الطفل من مرض مصابة بالعلة المذكورة

﴿الاسباب﴾ - سبب العلة هي كروب خصوصي يدخل الجسم بواسطة الماء والطعام والثياب الملوثة بغيرات المريض في الحمى المذكورة ويعيش الميكروب في الماء بضعة أسابيع وقبيل انه يعيش اشهر في الثلج. وكثيراً ما تنتقل العدوى الى المرضية من لمس الثياب الملوثة بغيرات العليل وفي الغالب تنتقل الى الاصحاء بواسطة مياه الشرب الملوثة أو من اللبن المفشوش أو المزوج بالماء الوضحة وكذلك اذا كان من بقرة مصابة بالحمى التيفودية

﴿الاعراض﴾ - ان اعراض هذه العلة تسير في كثير من الحوادث سيراً واحداً في الاطفال والبالغين. وكيفما كانت الحال فهي خفيفة وسليمة العاقبة في سن الطفولة والحداثة مالم يصاحبها تضخم الطحال والتهاب الرئتين

## « جدول الامراض »

| اسم المرض        | مدة الحضانة   | الاعراض المميزة  | تاريخ الاعراض المميزة من بدء المgioom |
|------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| السم التيفودية   | نحو ١٤ يوماً  | بعض حراء وردية منتفعة قليلاً عن مساواة الجلد   | اليوم السابع -                        |
| السم القرمزية    | ١ - ٧ أيام    | فاطح احمر لامع به الجسم كله كأنه بقمة واحدة  | اليوم ١ -                             |
| الحصبة           | ١٢ - ١٤ يوماً | فاطح ارجواني محمر منتفع قليلاً عن مساواة الجلد<br>أو بعضه يظهر على هيئة حلقات        | اليوم ٤                               |
| الحصبة الجرمانية | ٧ - ٢١ يوماً  | بعض وردية محمرة باهته لاتجتمع على هيئة حلقات   | اليوم ١                               |
| جدري الماء       | ١٣ - ١٧ يوماً | فاطح حويصلي متفرق حجمه قدر فلقة الحمص  | اليوم ١                               |
| الجدري الاصلية   | ١٤ يوماً      | { حليمات حراء بارزة ثم تحول الى حويصلة فبرزة<br>السم                                 | { اليوم ٣ وأحياناً<br>اليوم ١ -       |
| جدري التطعيم     | ٢ يوم         | السم الثالث بعد حليمية او نملة حراء تحول الى حويصلة فبرزة<br>وتحاطة بهالة حراء واسعة | اليوم ٣ -                             |
| الحرقة           | ٢ - ٣ أيام    | زهرة جلدية حراء لامعة وأحياناً يصحبها فاطح حويصلي                                    | اليوم ١ -                             |
| الدقير يا        | ٢ - ١٢ يوماً  | { غشاء ايض يظهر على اللوزتين وأحياناً على<br>الحنجرة والبلعوم والاجزاء المجاورة      | اليوم ١ -                             |
| الشهفة           | ٢ - ٧ أيام    | نوبة سعال تشبه صباح الديك  | اليوم ٧ -                             |
| ابو كعب          | ٧ - ٢١ يوماً  | ورم اسفل الاذن وامامها وخلفها واسفل الفكين   | اليوم الاول                           |

ونفرج الاما، وهذا نادر ولا سيما في صغار الاطفال . أما الاعراض فند ذكر منها ما يأتي :-  
الحرارة - ترتفع حرارة الجسم تدريجياً ملائدة أسبوع واحد ثم تستقر على درجة ٣٠ - ٣١° فـ

## الفتي

| الكورتيزينا                          | مدة المرض من بدء المgioom   | اعراض اخرى خصوصية   |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| تشي نهاية المرض                      | ٤ اسابيع                    | جود - اسهال - رعاف - وجع راس  |
| ٦ اسابيع على الاقل                   | ٧ - ٩ أيام ماعدا طرور القشر | وجع الزور - قيء في بدء هجوم العلة   |
| ٣ اسابيع                             | ٧ - ٨ أيام                  | زكام انفي - تدمع العينين - سعال - بحة   |
| ٣ اسابيع                             | ٣ - ٤ أيام                  | { المخيف في الزور وارتشاح حقيقى من الانف والعين                                 |
| ٣ اسابيع                             | ٧ أيام                      | حي خفيفة واحياناً لا توجد   |
| ٤ اسابيع                             | ١٤ يوماً                    | وجع راس وظاهر وقيء  |
| لا شيء                               | ٣ اسابيع                    | في الفالب حمى خفيفة وانحراف قليل  |
| ٤ - ٦ أيام او عدة المعدل نحو اسبوعين |                             | حي - الم حارق   |
| اسابيع اذا انتشرت                    |                             | ضعف - حمى   |
| ٤ اسابيع                             | ٣ - ١٤ يوماً                | قياء - بصاق دموي  |
| ٦ - ٨ اسابيع                         | ٦ - ٨ اسابيع                | الم عند المرض   |
| حياناً تشي الشهفة                    |                             | (٤٠ - ٣٩) نحو اسبوع او اسابيعين . وبعد ذلك تأخذ بالمبوط رويداً الى              |
|                                      |                             | الدرجة الطبيعية . وأحياناً ترتفع الى درجة ٥٠° فـ (٤٠ - ٣٩) فيصاب العليل بالذهاب |

**المسالك التنفسية** — يغدو العليل بالسوائل وأفضلها لبن البقر معقماً (صفحة ٦٠) من الانف ) وزكام انفي والتهاب الشعب الرئوية  
القناة الهضمية — يجف اللسان وتكتو رأسه فروة يضا سميكه ويشاهد  
في وسطه بقعه حمراء على شكل الحرف سبعة هكذا : ٧ : وهو نظيف بالنسبة  
إلى لسان المريض البالغ  
ومن جملة الاعراض غشيان واحياناً في وكذلك التهاب الفم والحلق واللوزتين  
والاعراض الاخيرة تكثر في أولاد القراء الذين لم يغدوا كاملاً ينبع . وفي الغالب  
يصبح العلة امساك في أولها واسهال في أواخرها خلافاً لما هو معروف عند الاطباء  
ويتنفسن البطن وتتأهب الامعاء وفي الحوادث القوية تنزف الامعاء دماً كثيراً  
وتتفتح ثم تنتفخ من شدة الالتهاب فيعقبها الموت . ولهذا السبب يجب ان يغدو  
الليل بالأطعمة السائلة مما سندكره في العلاج لأن الطعام الجامد يهيج الامعاء  
ويؤدي إلى انتقامها على نحو ما سبقت إليه الاشارة

**النفاط** — جبوب حراء وردية مرتفعة قليلاً عن مساواة الجلد  
تظهر أفواجاً افواجاً على الصدر والبطن واحياناً تم سائر اجزاء المجسد . وكل  
فوج لا يزيد عن عشرين حبة ثم يزول ويعقبه فوج آخر جديد ويبيق كذلك  
إلى منتصف الأسبوع الثالث . وبالاضافة على الحبوب المذكورة بالاصبع تزول  
ثم تعود حالاً عند رفعه

**(العلاج)** — يجب في اثناء تفشي الحمى التيفودية ان تعمى مياه الشرب  
ولا سيما مياه البار وذلك بترشيحها ببرشح باستور أو بإغلاقها على النار لقتل  
الميكروب وهو الأفضل . وكذلك يجب ان يعمق ابن البقر قبل شربه  
(انظر صفحة ٦٠) لانه كثيراً ما يحدث ان البقرة تشرب من مياه البار الملوثة  
بحراشيم الحمى التيفودية فتصاب بالعلة المذكورة أو يكون ابن البقر ممزوجاً بمياه الشرب  
الملوثة فتنقل العدوى إلى الذين يشربونه من غير تعميم وهذا مايسى في  
اصطبلاخ الطب بالعلاج الواقي . ودرهم وقاية خير من قطار علاج

**التغذية** — يغدو العليل بالسوائل وأفضلها لبن البقر معقماً (صفحة ٦٠)  
وي المناسب ان يضاف اليه قليل من ماه الشعير او ماء الاوت ميل (ملحق ٢ و ٥)  
وإذا كانت قوة الهضم ضعيفة في العليل فيخشى ان يتجمد اللبن ويكون  
سبباً لهيج الاماء فيضر به ضرراً جسرياً . في مثل هذه الاحوال يجب ان  
يعدل عن لبن البقر ويغوص على مرق اللحم او ماء زلال البيض التي (ملحق ٣)  
او عصير اللحم (ملحق ١٦) لمدة يوم او يومين وبعد ذلك يعود الى اللبن فيتناوله  
بالتناوب مع السوائل الماء ذكرها الى ان تتحسن حالة الهضم فتشصر التغذية  
بالبن فقط ولا يأس اذا كان يتناوله مع مصله (ملحق ١٣) ويحسن ان يضاف  
إلى الغذاء نحوضت فقط من الكونياك أو الروم أو خلاصة الثانية لتحسين نكهته  
ومن الأغذية المقيدة الدندريمه (البوظة) مخففة باء القيشي وفي الغالب يتناولها  
الأولاد بقبول تام

أما مقدار الطعام الذي يجب ان يتناوله العليل في كل يوم فيختلف من ٣٠٠-٦٠٠  
جراماً . وهذا المقدار يكفي لسد رمقه وحفظ حياته بشرط ان يهضم كله في  
المدة وما زاد على ذلك فلا يخلو من المضرة لأن كثرة الطعام تسبب الانتكاس  
فيكون وبالاً على صحة العليل

وبعد أربعة أو خمسة أيام من زوال الحرارة يبدأ بتحفيز الغذاء فيعطي مرق  
اللحم أما صرقاً أو مزوجاً بالبن . ويحسن ان يغسل مع البرق أو البن قليل من  
من الخبز الافرنكي يجفف على النار بعد دهنها بالزيادة او السمن ثم يندرج على  
أكل اللحوم المشوية أو المقليه يضنه ويبلع عصيرها ثم يقص القتل . والموضع يلده  
كثيراً للولد الجائع . وبعد أسبوع أو أسبوعين يا كل البيض (برشت) والرز  
مطبوحاً مع البن وغير ذلك من الطعام السهل الانهضام ويداوم عليه الى ان  
ينتعاف جيداً

**حرارة الجسم** — تخفف حرارة الجسم بماه وذلك بان تبل خرقه باء بارد  
لازيد درجة حرارته عن ٨٠ - ٩٦٠ فـ (٢٦ - ١٥ اس) وتوضع بعد عصرها

على الرأس وبقي أجزاء الجسم

والأفضل أن يلف الجسم بـلاة مبلولة بالماء على الطريقة التي تقدم ذكرها او يلف بـلاة من مشمع ويصب عليها ماء فاترًا قليلاً على درجة ٨٥ ف (٢٤ س) أو بارداً قليلاً على درجة ٧٠ ف (٢١ س) وهذا ما يسمى في اصطلاح الطب بالحمام السطحي

وإذا كان العليل يهدي (يلخبط . يقروش) من شدة الحرارة فيتمس في الماء البارد مباشرة (ملحق ٣٨) وفي أثناء ذلك يجب ان تلاحظ درجة الحرارة فإذا كانت يدا العليل اور جلاه باردة واستمرت على ازدياد فيجب ان يوضع حول القدمين والخذلين زجاجات سخنة (صفحة ١١١) ويعطى الكونياك شرباً أو حفناً بالمستقيم لاجل تتبه القوى ورد الحرارة

**انتفاخ البطن** - يعالج بالحقن باه الثابج المضاف اليه زيت التربنتينا نحو ملعقتين صغيرتين وذلك بعد استخراجه بزلال البيض

**الاسهال** - يوقف الاسهال بالحقن بزيت التربنتينا مع البرمودت والسائل او نقطتين من صبغة الافيون . ولا يجوز ان يقطع بناها ولا ان يعالج الا اذا زاد عدد البراز عن خمسة في اليوم

**الامساك** - يزال بالحقن بزيت الحروع والماء او شرب زيت الزيتون النقي والأخير عدم المفرة يلين الامعاء ويفتحي الجسم ويقي **الجزء الملتهبة**

وإذا حدث نزف مموي فيوقف الطعام او يعطى في كيات قليلة جداً . وقد يتقطع النزف بالحقن بالتربنتينا وهو سريح الزوال في الأطفال

ولما كان البراز يحتوي على ميكروب المرض فمن الواجب ان يرش عليه قليل من كلوريد الجير (ملحق ٩٣) وتظهر الملاة والاغطية قبل غسلها منعاً لسريان المدوى (انظر غرفة المرض)

### الحمى القرمزية

سكارلتينا - نفاط قرمزي

علة حادة شديدة العدوى تصيب الاولاد في جميع الاعمار ويقل حدوثها قبل قام السنة الاولى من العمر . ومتناز بالتفاط القرمزى الذى يهم البدن كله (الاسباب) - ميكروب خصوصى يدخل الجسم بواسطة التنفس والجلد وينتقل باللامسة من العليل الى الصحيح بواسطة الثياب والكتب والزهور والقطط وغير ذلك مما تناقه اليدي كثيراً في البيت . ويقال ان الميكروب يعيش في الثياب نحو سنة . ولا يصاب بها الانسان اكثر من مرة واحدة الا ثادراً وتكثر العدوى من مفرزات الاغشية المخاطية المصابة كالحلق والبلعوم ومن القشور التي تتطاير من الجلد في طور التقرير

(الاعراض) - اول اعراض العلة القى . والحمى وسرعة النبض ووجع في الزور وبعد يوم او يومين ونصف من هجوم الاعراض التي تقدم ذكرها يظهر التفاط الاول ما يكون ظهوره على الرقبة والصدر ثم يتدنى فيسائر اجزاء الجسم ما عدا الوجه . ولو نه احر قرمزي مساو لسطح الجلد وقد يجتمع بعضه قرب بعض حتى يصير الجلد كأنه قطعة حراء واحدة . ويزول التفاط ما بين اليوم السادس والسابع من ظهوره وفي الحوادث الخفيفة يزول في ٢٤ ساعة ويظهر على اثر زواله قشور كبيرة وصغيرة تثار من الجلد وتذوب بضعة اسابيع وهي شديدة العدوى ومن اعراضها التهاب الزور يتدنى في اول الامر بالاحرار ثم يشتدد الالتهاب ويم البلعوم واللوزتين واللهاة ويكون عليها غشاء ابيض يشبه غشاء الدفيهريا . وهذه الاعراض سبعة تقع الطبيب في الحيرة والارتباك . وفي الحوادث القوية ترتفع حرارة الجسم فجأة الى درجة ١٠٤ او ١٠٥ (٤٠ - ٤٠ س) وقد تبلغ اكثر من ذلك فيصاب العليل بالهديان . وقليما تكون الحرارة في هذه

صورة (٥)



صورة بنت مصابة بالحصبة وشاهد فيها النفاط الجلدي الملالي وتورم الوجه وكلامها من مميزات الملة المذكورة

الملة تحت درجة ١٠١° ف (٣٨ م) . وتزول بين اليوم السابع والتاسع الا اذا كانت الملة شديدة فتدوم اكثر من ذلك وتكسو اللسان في اول الامر فروة بيضاء ثم تزول وتظهر حلماً ته نائمة محمرة على هيئة الكوش الحمراء (الفراز) وهذا اللون في اللسان من مميزات الحمى ولا يكون في هذا الشكل الا فيها ويرافق الملة اكalan والتهاب في الاذنين والرئتين والكلية ، والملة الاخيرة تحدث بعد شفاء العليل في الحوادث القوية واسبابها مكث الحمى اكثر من اسبوعين او ثلاثة اسابيع

«العلاج» - يجب ان يحفظ العليل دافئاً وينبع عن مخالطة الاصحاء مدة ستة اسابيع ، ويختبر من تغريضه البرد ثالثاً ترداد حالته وبالاً ، ومن الضروري ان تكون الغرفة جافة الهواء تدخلها اشعة الشمس ويتجدد هواؤها بارشاد الطبيب (انظر غرفة النهار)

وي ينبغي ان يفرك الجسم ببرهم حافظ البوريك (ملحق ٧٠) لخفيف الاكalan (الكرش) ثم يبرع المرض عن الجلد بالقطن البوريكي وبهذه الطريقة ينطف البدن وينبع تناثر القشور التي هي سبب كبير للمعدوى . ولا بأس اذا كان يمسح البدن بقام فاتر بالاسفنجية لاجل القافية نفسها ومن التجارب الجديدة التي شاع استعمالها وعم نفعها هي ان يدهن البدن من ٣ - ٤ مرات في اليوم بزيت اليوكابتوس او ببرهم الاكتيلول (راجع الدفتير يا للتحوطات الصحية )

اما الحرارة فتحتفظ بالماء الفائز مسحًا بالاسفنجية وبالوضعيات الباردة على الراس اذا كانت الحمى شديدة . واذا لم يظهر النفاط بحلاه تام على الجلد فيعالج بالاستحمام بالماء السخن او بغسل القدمين والساقيين بغلق الخردل وشرب السوائل السخنة (ملحق ٤٢ )

ويغذى العليل بالبن ومرق اللحم والشوربة . ويجوز حملها تنخفض الحرارة

عن درجة ١٠٣° فـ (٣٩س) انت بتناول شيئاً من الاطعمة النشائية .  
بقي ان نذكر المعالجة بالادوية وافضلها الکاومل يعطى في جرعات صغيرة  
عند ظهور العلة وهذا من واجبات الطبيب الذي يجب الاعتماد عليه في هذا  
الامر وعليه ايضاً ان يفحص حلق كل عضو من العائلة في كل يوم ويتداركهم  
بالغراجر ل الوقاية من المرض

٤٠

### الحصبة - التشيشه

هذه العلة من علل الحميات النفاطية تحدث غالباً في ايام البرد وتصيب  
بالاكثر الصغار بالسن ويقل حدوثها قبل السنة الاولى واقل منه قبل الشهر السادس  
من العمر وهي شديدة العدوى لا يكاد يسلم منها ولد في اثناء وفودها  
﴿الاسباب﴾ - ميكروب خصوصي يدخل الجسم بواسطه التنفس وتنقل  
العدوى أيضاً بواسطه الثياب وجميع الاشياء التي تلامس العليل وهذا نادر جداً  
ومن جملة الاسباب سوء التغذية وفقاره البيوت والشوارع ولذلك تكثر  
هذه العلة بين الفقراء ونقل في بيوت الاغنياء الذين يراعون قوانين الصحة ويفطئون  
البيوت والشوارع النظيفة والنقيهة الهواء

﴿الاعراض﴾ - تبتدئ بزكام قوي يصحبه سعال جاف وعطاس وجمة  
ودوخة ووجع في الراس وتدمّع في العينين وافراز سائل مصلي من الاف وحى  
ترتفع في المساء وتختفي في الصباح . وبعد اربعه أيام من هجوم الاعراض  
المذكورة يظهر النفاط خلف الاذنين ثم ينتشر على الوجه فالعنق فباقي جزء الجسد  
في مدة ٢٤ ساعة

ونفاط الحصبة يظهر على شكل نقط صغيرة حمراً مستديرة ومرتفعة قليلاً عن  
مساواة الجلد . وقد تصل حوافي النفاط بعضها في بعض حتى تصير على هيئة  
هلالات غير منتظمة كما ترى في (صورة ٥) وهي رسم ولد مصاب بالحصبة

ويمثل هيئة النفاط الملايلي مع التورم الذي يصاحب العلة في الوجه والشفتين وفي الفالب تهيج الاعراض نحو اليوم السادس او السابع وبعد هجومها يوم أو يومين يزول النفاط ويدخل العليل في طور التفسير فيترك على الجلد قشوراً تشبه الخالة (الرحة) تدوم نحو أسبوعين . ويرافق هذا الطور حكة شديدة وفي الحوادث القوية يتزلف الدم من النفاط ويقال لهذا الشكل الحصبة السوداء وهي علامة ردية . وأغلب الناس لا يهتمون بالحصبة كثيراً اذننا منهم انها سليمة العاقبة وهو غلط فاحش لانه اذا أصيب بها الولد وكان ضعيف الجسم فيخشى ان يصاب أيضاً بالتهاب الرئتين والسل وغيرها من الاختلالات المرضية التي تكون سبباً لهلاكه

#### ﴿التخسيص﴾ - تمييز الحصبة عن القرمزية بالعلامات الآتية:-

اولاً : ان اعراض الحصبة بطيئة وأعراض القرمزية سريعة جداً وفي الفالب يسبق اعراض الحصبة او يراقبها نزلة شديدة ثانياً : نفاط الحصبة احمر مرتفع عن سطح الجلد وأحياناً يتجمع على شكل هاللات غير منتظمة . ونفاط القرمزية مساوٍ لسطح الجلد واحمراره أشد لاماً من نفاط الحصبة ثالثاً : يظهر النفاط في الحصبة بعد أربعة أيام من هجوم العلة . وفي القرمزية في اليوم الاول او الثاني

﴿الاختلالات المرضية﴾ - فلما يعقب الحصبة اختلالات مرضية من بعد السنة الرابعة من العمر واكثرها حدوثاً النيمونيا الشعيبة وهي مميتة (انظر صفحة ١٤٠ ) وأحياناً يتأثر القلب والقناة الهضمية

﴿العلاج﴾ - يجب عند ظهور أول علامة من الحصبة ان يحفظ العليل في الفراش ويوضع بينه وبين النواخذ حاجزاً لمنع التور عن عينيه ويبيق الحاجز المذكور الى ان يزول النفاط في اليوم السابع او العاشر . ولا يجوز ان يخرج

من غرفته قبل اليوم الخامس عشر والافضل ان يبقى الى نهاية الأسبوع الثالث ولا يخرج الا بأمر الطبيب وأفضل غذاء للUIL لben الثدي للرضعان ولبن البقر لbabies الأطفال والأولاد ويختبر من تغذيته فوق شبعه لثلا يصاب بسوء الهضم المعدي والمعوي . ويعحسن ان يضاف الى اللبن ماء الصودا أو ماء الجير (انظر صفحه ٦٠) لمنع التجفف واذا كان البراز متقطعاً وشكى العليل شيئاً في معدته فهو دليل على ان اللبن لا يوافقه فيجب ان يعدل عنه ويعول على ماء زلال البيض اليه (ملحق ٣) أو عصير اللحم (ملحق ١٦) أو مرق اللحم لمدة يومين أو ثلاثة أيام الى ان يتحسن هضم العليل فيعود الى اللبن

وما يفيد في بدء العلة مسهل من زيت الخروع أو الكلوامل في جرعات موافقة للعمر (ملحق ١١٠ و ١١١) او الحقن بالماء السخن حذرًا من ان تكون المساهيل سبباً للاسهال

واذا تأخر ظهور النفاط في نفس الماء السخن او يمالج بالوضعيات السخنة على البطن والصدر او القدمين والساقيين لكي يتتبه الجلد ويظهر النفاط بسرعة (ملحق ٣٨) وقد تستد حرارة الجسم فتبليغ درجة (١٠٥° ف) ( $\frac{1}{2}$  م) بدون ان تستد باقي الاعراض المصاححة لها وليس في ذلك ما يوجب الخوف . ويمكن تنفيذه بمسح البدن بماء بارد لا تزيد درجة حرارته عن (٩٠° - ٩٥° ف) (٣٥ م) واذا انقطعت قوى العليل عقب الاستحمام فيعطي قليل من المنبهات الروحية كالكونياك والروم لرد الفعل

ويسكن الاكلان (الكرش) الذي يصاحب طور التفسير عرضاً حامض البوريك (ملحق ٧٠) يفرك به البدن على نحو ما سبقت اليه الاشارة في الحمى القرمزية وتعالج العين بماء حامض البوريك (ملحق ٧٥) يقطر منه في العين مراراً في اليوم واذا كانت التور يوم عيني العليل فيضاف الى ماء البوريك مقدار ٣

ستكرامات من الكوكايين لكل ٦ جراماً من ماء البوريك . ويفصل الحلق بنفس الادوية وفي غير ذلك يشاور الطبيب  
بقي ان حرارة الغرفة يجب ان تكون بين (٦٠ - ٧٠ ف) (١٥ - ٢١ س)  
ويتجدد هواها وتتنفس على نحو ما تقدم بيانه في غرفة المرض

°°

### الحصبة الجرمانية

تتميز هذه الحصبة عن الحصبة الاصلية بدون صعوبة . وهي من الامراض  
المعدية تحدث في أيام البرد الا انها قليلة جداً بالنسبة الى الحصبة والقرمزية .  
وكلما تصبب أحداً أكثر من مرة واحدة في العمر

» (الاسباب) - مثل اسباب الحصبة

» (الاعراض) - في بعض الاحيان تشبه اعراض الحصبة وفي البعض  
الآخر اعراض القرمزية حتى انه يصعب تمييزها تماماً على امهر الاطباء . وكل  
ما يشاهد من الاعراض في بدء العلة نزلة خفيفة جداً يعقبها النفاخ بعد ٢٤ ساعة  
وهو عبارة عن نقط وردية الالون باهتة مرتفعة قليلاً عن مساواة الجلد يلغى  
حجم الواحدة قدر طبعة الدبوس وأحياناً قدر فلقة الحمص . ويظهر بسرعة على  
الوجه والصدر ثم ينتد الى الاطراف السفلية ولا يظهر في الاخرية حتى يزول من  
الوجه وفي اليوم الثالث او الرابع يجف النفاخ ويترك على الجلد قشوراً قليلة  
اما الاعراض التي ترافق النفاخ فهي حرارة خفيفة وتدمّع العينين وافراز  
سائل من الاف ووجع في الزور وكذا خفيفة لا تكاد تستحق الذكر  
ويخترس من تعرض العليل للبرد لثلا يصاب بالتهاب الشعب الرئوية  
او النيومونيا

°°

### جدرى الماء - جدرى الدجاج

علة من العلل الفقاطية الوافية يكثر حدوثها في الصغار ويندر في البالغين .  
وكلما تصبب أحداً أكثر من مرة واحدة في العمر

» (الاسباب) - ميكروب خصوصي يدخل الجسم ويكون في الثياب  
والامتعة مدة طويلة وهي اقصر سائر الحيات الفقاطية زمناً وأخفها أعراضآ ولا  
يكاد يسلم منها ولد . تنتقل بالعدوى من العليل الى الصحيح او بواسطة شخص آخر  
يمحمل جراثيم المرض الى غيره . وقد عدها البعض نوعاً من الجدرى الخفيف وهو  
وهم لأنها ان حدثت بعد الجدرى او حدث الجدرى بعدها فلا هي تقي منه ولا  
هو بقي منها وكل منها علة مستقلة

» (الاعراض) - لا يوجد فيها طور المجموع غالباً فيكون النفاخ أول  
الاعراض الظاهرية يصبحه فقدان الشهية وهي تبلغ درجتها (١٠٢ ف) او  
(٣٩ - ٣٨ س) وتشنجات عصبية الاخيرة لا تحدث الا في  
الحوادث القوية وهو نادر جداً

ويظهر النفاخ أزواجاً على الوجه والصدر وخلف الاذنين غلات صغيرة  
تستحيل الى حويصلات مخاطية بهالة حمراء يبلغ حجم الحويصلة قدر فلقة الحمص  
مرتفعة قليلاً عن مساواة الجلد وملوأة سائلاً مائياً صافياً واداً فقتلت استحال الى  
بشرة وتقبحت وربما تركت ندوياً على الوجه مثل حبوب الجدرى . ثم يجف النفاخ  
ويتبدل بقشور صغيره لا تثبت ان تسقط وتزول وأحياناً تبقى على البدن الى ما بعد  
شفاء العليل الذي يتم في مدة سبعة أيام تقريباً

وفي (صورة ٦) رسم ولد مصاب بهذه العلة وعلى صدره نفاخ العلة ظاهر  
ظهوراً متوضطاً

» (العلاج) - لا تحتاج الى معالجة دوائية . ويكون ان يحفظ العليل في

هادئًا ويختبئ التعرض للبرد والحرارة القوية. ويجب ان يحجب عن الاصحاء مدة أسبوع على الاقل ويفزى باللين ومرق اللحم والاطعمة النشائية وفي أثناء ذلك اذا شوهد الباز منقطعاً او غير منتظم في سيره فيدل الغذا

٩٩

### الجدري

مرض ويل معد حادث من دخول سم خصوصي في الجسم . وئم المدوى بواسطة مفرزات الجلد ولا سيما في طور التفشر فان دقائق القشور تتطاير في الهواء وتعدى الذين يستنشقونها . وقد تعلق بثياب المصابين وتكون فيها أشهراً وستينياً وهذا هو سبب نقل العلة من مكان الى آخر بأمتعة المخدورين أو الذين خالطوه في مدة المرض . ويكثر انتشار الجدري في أيام الشتاء وهو من أمراض الخداعة والبالغين ولا يصيب الاولاد الذين لم يبلغوا السنة الاولى من العمر اقلأ . وقلا تصيب الشخص اكثر من مرة واحدة وفي الاصابة الثانية تكون خفيفة وسليمة العاقبة

**﴿الاعراض﴾** - تبتدئ بوجع في الراس والظهر ودوخة وقيء وحمى قيدية وتشنجات عصبية في الحوادث الحبيثة وتصحب هذه الاعراض زهرة جلدية على شكل نقاط القرمزية او الحصبة وهي غير النفاط المميز لهذه العلة وأكثر ما تكون الزهرة على البطن وأعلى الفخذين واذا اشغلت مساحة كبيرة في الجسم كانت دليلاً على ثقل العلة وشدتها

وفي اليوم الثالث من هجوم المرض يظهر النفاط في أول الامر على هيئة بقع اذا جست بالاصبع شعر بنتو تحت الجلد يشبه حبة الخردق (الرش) وهذا الذي يفرقها عن جدرى الماء . ثم يزداد بروز النفاط حتى يستحيل الى حويصلة

ملوئة مصلاً ثم الى بذرة مملوئة قيحاً . وتنميء بثور الجدري بالاختلاطها من سطحها ويرافق النفاط أ كال شديد لا يطيقه العليل فيضطر ان يحكه بيده . وفي اليوم الحادي عشر او الثالث عشر تجف البثور ويدخل العليل في طور التقشش لان البثور نقش وتجف ويقال له أيضاً طور التفشر وهو أشد أطوار الجدري عدوى

وفي الحوادث الثقيلة أي التي لم يسبها نطعيم بالمادة الجدرية تشتدد الحمى ويصاب العليل بأعراض دماغية تفضي الى الموت . ويظهر النفاط في الوجه فيشوشه ادى في العين فقد البصر . وقد يتجمع في الخبيرة والباعوم والقصبة فيسد مجرى التنفس ويملك العليل خنقاً

اما الحوادث الجدرية التي تعقب النطعيم فهي خفيفة جداً وفي الغالب سليمة ولا يملك فيها الا المصابين بضعف البناء وسوء التغذية واكثر ما يكون ذلك بين الفقراء الذين لم يراعوا قوانين الصحة

**﴿العلاج﴾** - ان النطعيم بالمادة الجدرية خير وسيلة ل الوقاية من هذا الداء الحديث . وفي القطر المصري يطعمون الارواح من اليوم الاربعين فصاعداً مالم يكن الطفل ضعيف البناء، فيرجحاً نطعيمه الى وقت آخر وهو اجباري وكل من يمتنع عن نطعيم ولده في الوقت المعين لغير علة او سبب صحي يفترم بخمسة عشر غرشاً ميرياً . وبناً على ذلك قلت حوادث الجدري في هذا القطر ويرجى ان تقل اكثراً حتى أحكت شروط الصحة ولا يتم ذلك الا بتقويم الاهالي بنور العلم والمعرفة على توالي الايام لان الفلاح المصري عدو للصحة لجهله فوائدتها ومن الضروري ان يعاد التطعيم في كل خمس او سبع سنوات مرة واذا انتشر في قريه او حي من أحياء المدن الكبيرة فيجب ان يطعم الجميع صغيراً وكثيراً حتى من كان مطعماً من عهد قريب

ويجب ان يعزل المرضى عن الاصحاء عزلاماً تماماً ويمول على حسن المداراة اكثراً من المعاشرة بالادوية وتكون الغرفة التي يعزل بها المخدور على نحو ما سبقت

الى الاشارة في «غرفة المرض»  
وما يفيد المعرقات كغلاية زهر الزبزون والبنفسج والتقطيس بالماء السخن  
حتى يظهر النفاط بسرعة وعلى كل حال يجب أن يعتمد على الطبيب

\*\*

### الجدري البكري - التطعيم

الجدري البكري هو في الغالب نوع من الجدري يصيب البقر والقنم آنـه  
خفيف وإذا طعم به الإنسان تختص من الأصابـه بالجدري أو تجدر جدرـاً خفيفـاً  
وعلى ذلك ترى التطعيم بالمادة الجدرية البكريـة منتشرـاً في البلدان المتقدمة  
وهو في غالب الحالـات اجبارـي ولكن الـاهلي قد عرفـوا فوائـده وصارـوا يـقبـلون  
عليـه من تلقـاء انفسـهم فـقلـت حوادـثـه بل كـاد يـنـقطع بتـائـةـ من بـيوـت الـاغـنيـاءـ  
الـذـين يـطـعـمـون أولـادـهـمـ وـيرـاعـونـ معـ التطـعـيمـ قـوانـينـ النـظـافـةـ وـالـصـحـةـ

ويـجبـ أنـ يـطـعـمـ الطـفـلـ منـ الشـهـرـ الثـانـيـ فـصـاعـداًـ مـلـمـ يـكـنـ هـنـاكـ مـانـعـ  
صـحيـ فـيـرـجاـ إلىـ وـقـتـ مـنـاسـبـ عـلـىـ نـخـوـهـ سـبـقـتـ الـيـ الاـشـارـةـ فـيـ الـكـلامـ عـلـىـ  
الـجـدـريـ وـعـلـاجـهـ الـوـاقـيـ .ـ وـيـحـترـمـ مـنـ تـطـعـيمـ الـبـنـاتـ فـيـ الـوـجـهـ اوـ ظـهـرـ الـكـفـ  
اوـ مـكـانـ آخـرـ ظـاهـرـ لـثـلـاـ يـتـرـكـ عـلـىـ الـمـاـضـيـ نـدـوـبـ جـدـريـ فـشـوـهـ جـاهـاـ .ـ وـأـفـضـلـ مـكـانـ لـتـطـعـيمـ هـوـ الـخـذـاـ وـالـسـاقـيـنـ اوـ أـعـلـىـ الـذـرـاعـيـنـ وـغـيرـهـاـ  
مـنـ الـمـاـضـيـ الـتـيـ تـكـوـنـ فـيـهـ النـدـوـبـ مـسـتـورـةـ لـاـ ظـاهـرـةـ

وـبـعـدـ الـيـوـمـ الثـانـيـ اوـ الـثـالـثـ مـنـ الـتـطـعـيمـ ظـهـرـ غـلـةـ اوـ حـلـيمـةـ حـمـراءـ وـنـخـوـ الـيـوـمـ  
الـخـامـسـ تـسـتـحـيلـ إـلـىـ حـوـيـصـلـةـ مـعـلـوـةـ سـائـلـاـ مـاـيـاـ ثـمـ تـنـموـ حـتـىـ يـصـيرـ حـجـمـهاـ قـدـرـ  
الـلـيـلـيـ اوـ أـكـبـرـ وـتـحـاطـ بـهـالـةـ حـمـراءـ .ـ وـفـيـ الـيـوـمـ السـابـعـ اوـ أـكـثـرـ تـسـتـحـيلـ حـوـيـصـلـةـ  
إـلـىـ بـرـةـ مـعـلـوـةـ مـادـةـ لـيـعـيـةـ مـصـفـرـةـ صـالـحةـ لـاـ تـطـعـيمـ .ـ وـنـخـوـ الـيـوـمـ الثـانـيـ عـشـرـ يـجـفـ

الاحرار وتأخذ البثرة بالجفاف حتى يتم شفاها في نهاية الأسبوع الثالث مالم  
يمكـاـ الطـفـلـ اوـ تـنـصـقـ باـثـيـابـ فـتـبـحـ وـيـتـعـوقـ شـفـاـهـاـ اـكـثـرـ مـنـ ذـلـكـ  
وـفـيـ الغـالـبـ يـرـافـقـ التـطـعـيمـ فـيـ الـيـوـمـ الثـالـثـ اوـ الـرـابـعـ حـتـىـ خـفـفـةـ وـشـيـهـ مـنـ  
الـخـولـ وـالـارـقـ وـتـدـوـمـ هـذـهـ الـاعـرـاضـ إـلـىـ الـيـوـمـ الثـامـنـ اوـ الـعاـشرـ  
أـمـاـ كـيـفـيـةـ التـطـعـيمـ بـالـمـادـةـ الـجـدـريـةـ وـمـدـارـاتـهـ فـهـيـ اـنـ يـفـسـلـ الـمـوـضـعـ الـمـعـدـلـ لـالـتـطـعـيمـ  
بـقـطـعـةـ قـطـنـ مـبـلـوـلـةـ بـأـيـاءـ الـبـورـيـكـ (ـمـلـقـ ٧٥ـ)ـ ثـمـ يـوـضـعـ عـلـيـهـ قـلـيلـ مـنـ الـمـادـةـ  
الـجـدـريـةـ وـيـخـدـشـ سـطـحـ الـجـلـدـ تـحـديـشـاـ خـفـيفـاـ أـيـ يـبـرـ جـرـحاـ سـطـحـاـ بـسـكـيـنـةـ  
خـصـوـصـيـةـ فـيـ ثـلـاثـةـ مـاـضـيـنـ وـتـرـكـ الـجـرـوحـ حـتـىـ تـنـشـفـ .ـ وـيـجـبـ اـنـ تـكـوـنـ الـثـيـابـ  
وـاسـعـةـ حـوـلـ الـجـرـوحـ لـثـلـاثـ تـحـنكـ بـهـاـ فـسـلـخـاـ وـيـطـيـ شـفـاـهـاـ  
وـيـكـرـرـ التـطـعـيمـ ثـانـيـاـ اـذـاـ لـمـ يـنـجـحـ مـنـ اـولـ مـرـةـ .ـ وـكـذـلـكـ يـجـبـ اـنـ يـكـرـرـ  
فـيـ كـلـ خـمـسـ سـنـيـنـ .ـ وـعـنـدـ اـنـشـارـ الـجـدـريـ يـطـعـمـ كـلـ اـعـضـاءـ الـبـيـتـ كـبـارـاـ وـصـغارـاـ  
وـيـخـرـسـ مـنـ التـطـعـيمـ اـذـاـ ظـاهـرـتـ فـيـ الـوـلـدـ اـعـرـاضـ الـرـضـ اوـ عـلـةـ أـخـرـيـ مـنـ الـعـلـلـ  
الـنـفـاطـيـةـ كـالـحـصـبـةـ وـالـقـرـمـزـيـةـ وـأـمـاثـلـهـاـ  
وـبـعـدـ الـاـطـبـاءـ يـفـضـلـونـ نـفـطـيـةـ الـجـرـوحـ بـالـقـطـنـ الـبـورـيـكـيـ وـهـوـ اـفـضـلـ مـنـ  
تـرـكـهـاـ عـرـضـةـ لـلـاوـسـاخـ اوـ الـاحـتـكـاكـ باـثـيـابـ الـاـمـرـ الـذـيـ لـاـ يـخـلـوـ مـنـ خـطـرـ تـسـمـ  
الـدـمـ فـيـ غالـبـ الـاـحـيـاـنـ  
وـقـدـ يـظـهـرـ حـوـلـ بـثـورـ التـطـعـيمـ نـفـاطـ صـغـيرـ وـأـحـيـاـنـاـ يـنـتـشـرـ فـيـ الـجـسـمـ كـاـهـ وـيـقـالـ  
لـهـ فـيـ اـصـطـلـاحـ الـطـبـ «ـاـكـزـمـاـ التـطـعـيمـ»ـ (ـاـنـظـرـ صـفـحـةـ ١٦٠ـ)

\*\*

### الحمـرـةـ

علـةـ شـدـيـدةـ المـدوـيـ حـادـثـةـ مـنـ مـيـكـرـوبـ خـصـوـصـيـ وـتـعـرـفـ بـزـمـرـةـ فـيـ الـجـلـدـ

او احمرار قرمزي ينتد بسرعة من مكان الى آخر في البدن وبالضغط تزول الزهرة ثم تعود عند رفعه . وأكثـر ما يكون حدوثها حول الجروح التي لم تراع فيها شروط النظافة وكذلك تظهر حول السرة في صغار الاطفال

**الاعراض** - تبتدئ بجمـىء منفـاتـة وـلـم حـارـقـ فيـ الجـزـءـ المصـابـ وفيـ الفـالـبـ يـسـبـقـ هـذـهـ الـاعـرـاضـ ثـشـبـحـاتـ عـصـبـيـةـ فـيـ صـغـارـ الـاطـفـالـ وـقـشـعـرـ يـرـبةـ فـيـ الـكـبـارـ وـأـحـيـاـنـاـ يـصـحـبـ الـاحـمـارـ نـفـاطـ وـورـمـ خـفـيفـ وـفـيـ الـيـوـمـ الـخـامـسـ يـرـزـوـلـ الـمـرـضـ عـلـىـ الـأـقـلـ مـنـ الـمـكـانـ الـذـيـ اـبـدـأـ فـيـهـ وـقـدـ تـكـونـ الـعـلـةـ قـوـيـةـ فـيـطـولـ مـكـثـهـ اـيـامـ غـيـرـ مـحـدـودـةـ وـهـيـ شـدـيـدـةـ الـخـطـرـ فـيـ طـوـرـ الـطـفـولـيـةـ وـلـاـ سـيـاـ فـيـ الـأـسـبـوعـ الـأـوـلـ وـالـثـانـيـ مـنـ الـوـلـادـةـ

**العلاج** - يـجـبـ انـ يـرـزـلـ الـمـرـضـ فـيـ غـرـفـةـ خـصـوصـيـةـ وـلـاـ يـسـمحـ لـلـاصـحـاءـ بـمـخـالـطـتـهـمـ عـلـىـ الـأـطـلـاقـ وـخـصـوصـاـ اـذـاـ كـانـ فـيـ اـبـدـاهـمـ خـدـوشـ اوـ جـرـوحـ لـاـنـهـاـ مـنـ أـفـعـلـ وـسـائـلـ الـعـدـوـيـ وـاـذـاـ أـصـبـ بـهـ الـطـفـلـ فـيـ مـدـةـ النـفـاسـ فـيـعـبـ اـنـ يـبـعـدـ عـنـ أـمـهـ حـالـاـ لـانـ الـحـمـرـةـ شـدـيـدـةـ الـخـطـرـ عـلـىـ النـفـاسـ وـعـلـىـ الـأـطـبـاءـ اـنـ يـمـتـنـعـوـ عـنـ تـوـلـيدـ النـسـاءـ اوـ عـيـادـةـ النـفـاسـ اـذـاـ كـانـواـ يـمـاـجـلـونـ مـرـيـضاـ بـالـحـمـرـةـ وـيـقـعـ الـعـلـيلـ مـعـزـوـلاـ نـحـوـ أـسـبـوعـيـنـ عـلـىـ الـأـقـلـ اـنـ تـزـوـلـ الـقـشـورـ الـتـيـ تـكـوـنـ عـلـىـ سـطـحـ الـجـلـدـ بـعـدـ الشـفـاءـ

وـيـعـالـجـ مـوـضـعـاـ بـقـادـيرـ مـتـسـاوـيـةـ مـنـ الـاـكـثـيـوـلـ وـلـمـ تـزـجـ جـيدـاـ وـيـدـهـنـ بـهـ الـجـزـءـ الـمـصـابـ بـفـرـشـةـ مـنـ وـبـرـ الـجـلـ أـوـرـيـشـةـ دـجـاجـ مـتـجـاـوـرـاـ فـيـ ذـلـكـ حدـودـ الـاحـمـارـ ثـمـ يـنـرـكـ الدـوـاءـ حـتـىـ يـنـشـفـ وـيـكـرـ مـرـارـاـ عـدـيـدـةـ فـيـ كـلـ يـوـمـ وـمـاـ يـفـيـدـ أـيـضـاـ جـزـءـ وـاحـدـ مـنـ الـكـرـيـوـلـيـنـ وـأـرـ بـعـدـ أـجـزـاءـ مـنـ الـيـوـدـ وـفـوـرـمـ وـعـشـرـةـ أـجـزـاءـ ظـالـمـيـنـ أـوـ لـاـنـوـلـيـنـ تـزـجـ مـعـاـ وـتـدـهـنـ بـهـ الـحـمـرـةـ عـلـىـ نـحـوـ مـاـقـدـمـ ذـكـرـهـ وـقـدـ يـحـثـاجـ الـعـلـيلـ إـلـىـ عـلـاجـ مـنـ الـبـاطـنـ فـيـعـتمـدـ فـيـ ذـلـكـ عـلـىـ الطـيـبـ

### الدفتيري

#### الختان - الخانوق

حدـهـ : عـلـةـ وـبـلـةـ شـدـيـدـةـ الـعـدـوـيـ وـالـخـطـرـ عـلـىـ الـحـيـاةـ يـكـثـرـ اـنـشـارـهـ فـيـ الـرـطـوبـةـ وـالـبـرـدـ وـهـيـ قـلـيـلـةـ جـدـاـ فـيـ الـاـشـهـرـ الـاـوـلـ مـنـ الـطـفـولـيـةـ وـتـعـرـفـ بـالـاـلـهـابـ اـرـتـشـاـحـيـ فـيـ الـبـلـعـومـ وـالـحـلـقـ وـالـاـنـفـ وـمـجـارـيـ الـهـوـاءـ الـعـلـيـاـ فـيـكـونـ عـلـيـهـاـ غـشـاءـ اـيـضـاـ هـوـ الـفـشـاءـ الـدـفـتـيرـيـ . وـيـضـحـ هـذـهـ الـاـلـهـابـاتـ الـمـوـضـعـيـةـ حـتـىـ غـيـرـ مـنـظـمـةـ وـاـنـخـطـاطـ فـيـ الـقـوـىـ وـقـدـ يـمـوتـ الـعـلـيلـ مـنـ التـسـمـ يـمـكـرـوبـ الـعـلـةـ اوـ اـنـخـطـاطـ الـقـلـبـ اوـ ضـيقـ الـنـفـسـ بـسـبـبـ اـنـسـادـ مـجـارـيـ الـهـوـاءـ مـنـ شـدـةـ الـاـلـهـابـ . وـالـاـصـابـةـ الـواـحـدـةـ لـاـنـقـيـ منـ اـصـابـةـ اـخـرىـ

**الاسباب** - مـيـكـرـوبـ خـصـوصـيـ يـنـفـثـ مـنـ الـمـكـانـ الـذـيـ يـسـتـقـرـ فـيـهـ فـيـسـرـيـ اـلـىـ الـدـمـ بـوـاسـطـةـ الـاـوـعـيـةـ الـلـيـمـفـاـوـيـةـ وـالـدـمـوـيـةـ وـيـسـبـ اـعـرـاضـ مـرـاجـيـةـ قـوـيـةـ

وـتـنـقـلـ الـعـدـوـيـ مـنـ الـعـلـيلـ اـلـىـ السـلـيمـ بـاـلـهـابـ وـالـاـمـمـةـ الـمـلـوـثـةـ بـمـفـرـزـاتـ الـفـمـ وـالـاـنـفـ . وـمـنـ الـاـسـبـابـ الـمـهـيـجـةـ الـبـرـدـ وـالـرـطـوبـةـ وـكـذـكـ الـعـمـرـ مـنـ الـاـسـبـابـ الـمـعـدـةـ هـذـهـ الـعـلـةـ وـلـذـكـ تـكـوـنـ فـيـ صـغـارـ الـاـوـلـادـ اـكـثـرـ مـنـ الـمـراهـقـينـ الـبـالـغـينـ

**الاعراض** - خـفـيـفـةـ وـقـوـيـةـ فـاـلـخـنـيـفـةـ تـبـتـدـيـ بـقـشـعـرـ يـرـبةـ وـحـىـ مـتوـسـطـةـ وـفـقـدانـ الشـهـيـةـ وـلـمـ فـيـ الـفـلـهـرـ وـالـسـاقـيـنـ ثـمـ لـاـ تـبـلـثـ هـذـهـ الـاعـرـاضـ اـنـ تـزـوـلـ وـيـنـهـضـ الـعـلـيلـ مـنـ فـرـاشـهـ صـحـيـحـاـ مـعـافـ . وـاـذـاـ كـانـ قـوـيـةـ فـتـرـقـعـ حـرـارـةـ الـجـسـمـ فـيـ مـدـةـ ٤ـ ساعـةـ مـنـ هـجـومـ الـعـلـةـ اـلـىـ درـجـةـ ١٠٢ـ ١٠٣ـ فـ اوـ (٣٨ـ ٣٩ـ سـ)ـ وـيـلـغـ النـبـضـ مـنـ ١٠٠ـ ١٢٠ـ نـبـضـ فـيـ الدـقـيـقـةـ وـنـقـلـ الشـهـيـةـ لـلـطـعـامـ وـتـنـحـطـ الـقـوـىـ اـنـثـادـاـ . وـمـنـ اـوـلـ الـعـلـامـاتـ الـواـضـحةـ الـهـابـ الـلـوـزـتـينـ وـهـوـ يـعـرـفـ مـنـ تـأـلمـ الـعـلـيلـ عـنـ الـبـلـعـ فـيـ أـنـثـاءـ الـاـكـلـ اوـ الـشـرـبـ وـيـتـدـيـ بـاـحـمـرـارـ وـوـرـمـ خـفـيفـينـ وـبـعـدـ يـوـمـ مـنـ ظـهـورـهـ يـشـاهـدـ عـلـىـ سـطـحـ الـلـوـزـتـينـ اوـ الـاجـزـاءـ الـمـجاـوـرـةـ هـاـنـقـطـ يـضـاءـ

مصفرة يتصل بعضها بعض ويكون منها غشاء أحياناً هو الغشاء الدفتيري وتكتسب الغدد تحت الفك ويرشح الألف سائلًا مائياً يدل على امتداد الملة إليه وفي الحرائق تتحفظ الحرارة عن معدلها القانوني وهي علامة محذنة أما الغشاء إلا أيضًا فأخذ بالنزول نحو اليوم السابع من ظهوره إذا كانت الملة خفيفة . ونحو اليوم الرابع عشر يزول بقائه وتهجع باقي الاعراض تدريجيًا ان العليل يبقى ضعيفاً ومنحني القوى وقتاً طويلاً من تأثيرات المرض ويمتد الغشاء إلى الحنجرة إذا كانت الملة قوية وهي حالة سيئة يعقبها الموت ويستدل على امتداد الغشاء إلى الحنجرة من بحة الصوت التي يعقبها تنفس أنفي سريع وسعال ذبحي خصوصي فيجلس العليل في فراشه متلماً التنفس ووجهه مصفر ومرقق ولا يلبث على هذه الحال ساعات قليلة حتى يموت خففاً إذا لم يتدبر كه الطبيب بالعلاج اللازم

وقد يصاب العليل بعد شفائه بشلل يقال له الشلل الدفتيري وذلك بين الأسبوع الثالث والخامس من المرض (صفحة ١٤٩)

**«العلاج»** — على ثلاثة أنواع (١) الواقي (٢) الموضعي (٣) الدوائي  
أولاً : العلاج الواقي — يقوم بالتحاذ التحوطات الصحية لمنع سرمان المرض وعلى الطبيب أن يكون عارفاً بالمشاركة ليكون على استعداد لقاومته وقطع دابرها بالوسائل الواقعية

وأول شيء يجب عمله عزل المريض في غرفة خصوصية إلى أن ينقطع أثر الجراثيم المرضية من الحلق وذلك بعد ١٥ عشر يوماً من هجوم الملة أو أكثر حسب مشورة الطبيب لأنه قد يتفاق بآن الميكروب يستقر في الحلق أكثر من المدة التي ذكرناها . وقد وجد بعض المحققين ميكروب المرض في الحلق بعد أربعين يوماً من شفاء العليل

وعلى الأمل أن تسرع باعلام الطبيب عند أفل التهاب أو أية حالة مرضية ظهر في الحلق منها كانت تلك الحالة بسيطة لأنها قد يتفاق بآن تكون الملة دفتيريا

فيتداركها الطبيب من الأول أو على الأقل يعزل المريض في غرفة خخصوصية حذرًا من نقل المعدوى إلى الأصحاء . وبناه عليه يجب الانتباه إلى هذا الأمر المهم ولا سيما في الأيام التي تكون فيها الدفتيريا منتشرة في المدينة أو البلدة المقيمين فيها .

ويختبر في مدة انتشار المرض من ثقبيل الأولاد وهذه عادة مضرة وكثيراً ما تكون سبباً للعدوى سواء كان في الدفتيريا أم في غيرها من العلل المعدية كالزهري والسل وأشباههما . وأفضل وسيلة لاإقامة من مضار الثقبيل أن لا يسمح للأولاد أن يقبّلوا ويتدرب على ذلك من صغره

ويجب أن تُغلق المدارس في أيام المرض ثلاثة تكون سبباً لنقل المعدوى بثبات التلامذة وكتبهما وامتعتهم . وعند الموت تلف الجثة بخلافة بعد تفليسها بباء السليماني أو الفنيك (ملحقات ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ ) وتطهير الثياب باغلاقها على النار (انظر غرفة المرض) ويستعمل القطن البوريكي عوضاً عن المناشف والمناديل لاستقبال مفرزات الأنف والحلق ثم تحرق حالاً بعد استعمالها

وعلى المرضية أو من يتعهد المريض أن تُغسل فيها وأفواه باقي أعضاء العلة بالأدوية الواقعية حسب ارشاد الطبيب وتغمس يديها بماء مضادات الفساد (ملحق ٩٧ و ٩٨ ) قبل خروجها من غرفة المريض على نحو ما سبقت الاشارة إليه في الكلام على «المرضية القانونية» «وغرفة المرض» (صفحة ٨٨ و ٩٣ ) وعلىها أن تغطي وجهها بمنديل شاش عند غسل الحلق أو مسه بالدواء الذي يصفه الطبيب حذرًا من أن يدخل العليل وينخرج مع السعال بعض المفرزات المرضية من الفم فتصيب العين وينشأ عنها ما يسمى بالرمد الدفتيري وهو شديد الخطورة على البصر

ثانياً : العلاج الموضعي — يقوم بوضع الأدوية على الأجزاء المصابة ويقسم إلى قسمين داخلي وخارجي  
فالعلاج الموضعي الداخلي : له طريقتان الأولى من الحلق بفرشاة ناعمة بعد

تفmisها بالدواء الذي يصفه الطبيب ويستثنى من ذلك صغار الاطفال العصبي المزاج لأن المس يؤلمهم فيكون سبباً لاضطرابهم . وقد شرحنا في فصل تعریض الاطفال كيفية من الحلق (صفحة ١١٣)

والطريقة الثانية غسل الانف والحلق بسائل دوائي وأفضلها ماء ملح الطعام بنسبة ٣ جرامات إلى ٣٥٠ جراماً يغسل به الانف والحلق بالرشاشة (شكل ٣٤) (صفحة ١١٤)

والدكتور جاكوبى يمتحن الغسول الآقى وهو : -

|     |            |
|-----|------------|
| ٥   | ستركامات   |
| ٤   | ملح الطعام |
| ٣٥٠ | ماء مقطر   |

يخرج وينفس به الانف والحلق على نحو ما نقدم يانه

ويجب الاحتراس من استعمال مضادات الفساد بنسبة قوية لأنها تهيج الفشاء المخاطي في الأجزاء المصابة وتعين على تكوين الفشاء الدفتيري فضلاً عن أنه يخشى أن تسبب تسمماً في الدم بواسطة الامتصاص

والغرض من المعالجات الموضعية : -

أولاً : قتل الميكروب أو ابطال فعله

ثانياً : تنظيف الأجزاء المصابة من المفرزات المرضية وإزالة الأسباب المهيجة  
ثالثاً : إزالة الفشاء الدفتيري لأن وجوده يعيق التنفس ويسبب الاختناق  
والعلاج الموضعي الخارجي : يقوم (١) بوضع كيس ثلج تحت الذقن لتفيف الألم (انظر الوضعيات الباردة صفحة ١١١) (٢) يدهن المكان المذكور بهم الا كثيل بنسبة ٣٣ جزءاً منه إلى ١٠٠ جزء فاسلين أولانوين (٣) يهيل العليل يخار التربتينا واليو كالبتوس (ملحق ٩٨) يطلق تحت الذقن من مرشة بخارية (شكل ٣٠ صفحة ١٩٤) وذلك بعد أن يحيط العليل بعلاقة لحصر البخار

ضمنها . ويفيد التبييل في تحليل الفشاء الدفتيري ولا سيما في دفتيريا الحنجرة وفي الحوادث التي يتدفأ فيها المرض إلى الانف يجب ان ينافس بقطعة قطن بوريكي تلف على طرف عود أو بغسله بباء ملح الطعام على نحو ما نقدم ذكره وهو الأفضل

كل هذه يجب ان تستعمل بلطف وحذق زائدین ثلاثة تكون سبباً لتآلم العليل وازعاجه

ثانياً : العلاج الدوائي - منوط بالطبيب . على انه يجوز ان تصف الام بعض المساهل في أول العلة وأخصها الكاومل يأخذن العليل في جرعات صغيرة من نصف ميلكرايم الى ميلكرايم واحد كل ربع ساعة الى ان يظهر فعله ويضاف الى الكاومل قليل من سكر البن . وما يفيد أيضاً ملعقات الستركتين يحقن به العليل تحت الجلد كل ٣ او ٤ ساعات مرة نحو نصف ميلكرايم الى ميلكرايم لا بن سنة واحدة ومن الفروري ان يغذى الولد جيداً ويجبر على الاكل واذا اخْطَطْتْ قواه وضعف نبضه وخفت ضربات قلبه فيعطي المشروبات الروحية كالكونياك والوسكي وعند شفائه تطهر الغرفة والامتنعة التي فيها على نحو ما نقدم شرحه في غرفة المرض



### الشقة

تعرف هذه العلة بنوب سعال متعددة يتخللها صوت شهيق يشبه صياح الديك وهي علة معدية تنتشر بسرعة بين الاولاد الصغار وخصوصاً في فصل الشتاء ويندر حدوثها أكثر من مرة واحدة في العمر وتكثر بين الاطفال الذين يسكنون البيوت القذرة ولم يتجدد هواوها وقلما يصاب بها أولاد الاريات والقرى النقبية الهواء

اما الخطير من هذه العلة فهو أولاً من تواتر النفي الذي ينافي الى الموت جوعاً وثانياً الاختناق من تشنج لسان المزمار فيعقبه الموت بعد بضع دقائق .  
**العلاج** ) - يغسل الحلق والانف كل يوم بباء حامض البوريك ( ملحق ٧٥ ) او باء ملح الطعام على نسبة ٣ جرامات من الملح الى ٣٥٠ جراماً من الماء المقطر وذلك بواسطة المرشة ( شكل ٣٤ صفحة ١١٤ )  
 اما نوب السعال الشديدة فتحتفف بالدواء الآتي :-

|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| كالورفورم   | ٣ | اجزاء               |
| اوثير       | ٥ | اجزاء               |
| اميل نيتريت | ١ | جزء واحد أو نصف جزء |

بنقط من هذا المزيج بضع نقط على منديل وينشق العليل في أثناء نوبة السعال وقد خلصت هذه الوصفة حياة كثيرين من الاطفال  
 ومن الداخل يعطي الکينا محلولاً بحامض الهيدرو بروميك كل ثلاثة ساعات جرعة . وما يفيد أيضاً مسحوق دوفر لسكن السعال وتقليل نوبه ( انظر ملحق ١١٠ و ١١٠ لتحديد جرعة الدواء )

ويجب ان يليس العليل الفانلا عند ما يشعر بابداء العلة وينقطع عن مخالطة الاصحاء منعاً للعدوى ويخرج به الى البراري والمنازل والاماكن الرملية الخالفة بعيداً عن اقدار المدن وجماع الناس لاستنشاق الهواء النقي . واذا كان البرد شديداً فيكتفي ان يليس العليل ثياباً دافئة ثم تفتح نوافذ غرفته وأبوابها ويقيم فيها طول النهار فيتشنق الهواء نقى خالياً من الفساد . واذا كان العليل كبيراً فيجب ان يروض جسمه باللعب والحركة في الهواء المطلق ويخترس من الجلوس في مغارى الهواء وهو عرقان

وهذه العلة مميتة كالدفتيريا والقرمزية وتصيب الاولاد بين الشهر السادس والستة الرابعة الى الثامنة من العمر وما فوق ذلك نادر جداً وهي شديدة الخطورة في الطفولة

**الاسباب** ) - ميكروب خصوصي لم يثبت وجوده الى الان ومن جملة الاسباب العمر وضعف البنية ولذلك تكثر في الصغار ولا تصيب البالغين على الاطلاق . وها علاقة كبيرة بالحصبة لانها تحدث كثيراً على اثر الشفاء من العلة المذكورة

**الاعراض** ) - نقسم الاعراض الى طورين الاول الزكي والثاني التشنجي

الطور الزكي - يعرف بسعال جاف رنان يشبه سعال البرونشيت تصبحه دغدة في الحلق وهي خفيفة ويزداد في الليل حتى يضايق العليل ويحرمه النوم . وفي النهار يكون متراحمًا بالنسبة الى الليل ولكن تظهر عليه علامات التعب وتقل شهية الطعام . ويستمر السعال على ازيد ياد نحو أسبوع او أسبوعين بحسب بنتهي الطور الزكي ويتدنى <sup>٤</sup> الطور التشنجي

الطور التشنجي - يتدنى <sup>٥</sup> بعد نهاية الطور الزكي ويعرف بنوب سعال منعاقة يتخللها صوت شهيق يشبه صياح الديك . ويصبحه زرقة في الوجه وفي <sup>٦</sup> وغشيان ونفث مواد مخاطية

وقد تشد نوب السعال فتحتفظ نزيفاً من الافق واحمراراً في بياض العين من انفجار الاوعية الدموية وأحياناً تصير العين حمراة كالدم

ويختلف عدد نوب السعال من ٤٠ - ٥٠ في اليوم اذا كانت العلة قوية ومن ٥ - ٦ اذا كانت خفيفة وهي في الليل اكثر منه في النهار . ويدوم العليل على هذه الحال نحو أربعة أسابيع او اكثر حسب شدة العلة وخفتها ثم تأخذ الاعراض بازوال رويداً الى ان يدخل العليل في طور النقاوة ويتجه الى

## أبو كعب

يعرف بالتهاب الغدد الكائنة أمام الاذنين وخلفها وتحت الفك . واكثر ما يكون حدوثه في أيام البرد وهو معدٍ ومؤلم جدًا ولكن ليس فيه ما يوجب الحشية الا اذا رافقته امراض أخرى . ولا يصيب صغار الاطفال الا نادرًا جدًا **(الاعراض)** - تبتدئ بتعب وحى خفيفة وألم ونقل حول الفكين يكون غالباً في جنب واحد ثم يظهر الورم خلف الاذن ويتدبر سرعة حتى يبلغ اشدته في ٤٨ ساعة فيعسر على العليل البلع والمضغ والتكلم واحياناً يصعب عليه فتح فمه . وبعد يوم او يومين تنتقل المعدوى الى الجانب الثاني من الوجه ثم تزول العلة بعد مضي اسبوعين من هجومها

**(العلاج)** - يحفظ العليل في فراشه ويعطي مساحل خفيفة ومزيج الجي (ملحق ١٠٣) ولا يجوز ان يأكل غير اللين او المرق فقط ويدهن الورم تحت الذقن بزيت سفن وينفع بالقطن وفوق القطن ورق زبي ثم يربط ويكرر ذلك مراراً واذا كان الالم شديد فيخفف بالوضعيات السخنة او النهايل بخار الماء السخن المضاف اليه زيت التربينا واليو-كابتوس (ملحق ٩٨) . وقد تصاحب العلة اختلالات مرضية فيعتمد في ذلك على الطبيب



## الفصل العاشر

### ٥٥ في امراض عادات مختلفة

الكساحة - الروماتيزم - التهاب الغدد - ضمور الاطفال - التهاب الثدي -  
القواك اي الحازوقة - الحمى - الاستسقاء - حصر البول - البول في النوم -  
الام عند البول - تضيق الغلقة وأنكمائتها - الزرارق الخلقي - التنفس من الفم -  
عص الصبع - عض الأظافر - التمعتمة والمجلجة

### الكساحة - راخىسم

علة من علل سوء التغذية تعرف بالخراف عام في الصحة ورخاروة في العظام ينشأ عنها اعوجاج في الساقين وخلل في نمو عظام الميكل كاه . وهي من العلل الخاصة بالاطفال ويغلب ظهورها فيهم بين الشهر السادس والسنة الثالثة من العمر وفي النادر تظهر في الملودين حديثاً . وقلما تخلو منها بلاد في العالم وقد شاهد المؤلف حوادث عديدة في الولايات المتحدة الاميركانية واكثرها بين المهاجر بين والعبيد الذين لا يرعون قوانين الصحة في منازلهم وتغذتهم . ومثل هذه الحوادث كثيرة في القطر المصري وكثيرون من الاهالي من فقراء وأغنياء يشكرون ما يصيب أطفالهم من الضعف والهزال بحيث يبلغ الولد فوق السنة من العمر فلا يشي ولا تبنت اسنانه في ميعادها الى غير ذلك من علامات الكساحة التي يجهلون مصادرها وسوء عواقبها

**(الاسباب)** - كثيرة نذكر منها ما يأتني :-

اولاً : السكن في البيوت الرطبة والمظلمة وعدم الخروج الى المنازل

لاستنشاق الهواء النقي

ثانياً : عدم كفاية الباس

ثالثاً : سوء التغذية وعدم ترتيب أوقات الرضاع والطعام وهذه من الاسباب الباعثة على انتشار داء الكساحه في الاطفال سواء كان الرضيع يعذى بلبن أمها او بالصناعة لانه كثيراً ما يكون لبن الام غير صالح للرضاع أو الطعام الاصطناعي غير موافق للطفل فيصاب بعرض المعدة والمعوي و يتسلط عليه الاسهال فيهزل جسمه وتسوء صحته

ولا يخفى ان لبن الثدي من الشهر الثاني عشر فصاعدًا نقل فائدته . ولذلك فلا يصلح للتغذية والذين يربون عليه يصابون بداء الكساحه على نحو ما أسلفنا ذكره في فصل الرضاع والطعام (انظر الطعام الاصطناعي صفحة ٥٢ ) (الاعراض) - في أول العلة ينام الطفل نوماً منقطضاً ومضرطاً بما وينجم في الليل حمى خفيفة ويرق وجهه وجبهة . وكثيراً ما ترطب المخدة بالعرق في أثناء النوم كأنها مبلولة بالماء . فيجب الانتباه الى هذه الاعراض واستشارة الطبيب عند ظهورها لان هذه العلة اذا تداركت من أول الامر كما ينبغي في الغالب تشفي في وقت قصير

ويظهر ان الكسيح لا يطيق الحرارة في نفس العطاء برجليه ويكون سبباً لعراضه للبرد واصابته بسوء المضم والاسهال المزمن

ومن الاعراض انتفاخ البطن وكراهة رائحة البراز وقد شهوة الطعام وحمى في آخر النهار وسرعة النبض وضيق الحلق واذا أنهض بك من الام الناشيء عن رخاوة اللحم والعظم ولا يرتاح الا اذا حل على الذراعين أو نام في فراشه وعلى توالي الايام تتكبر المفاصل ويتكبر الراس أيضاً ويستطيع من قته (شكل ١ من صورة ٤) ويتسع اليافوخ

وغالباً يتعدى نبت الاسنان الى ما فوق السنة الاولى من العمر وترتخى العظام فيكون ذلك باعثاً على اعوجاجها وعلى الخصوص اعوجاج الساقين والخذفين .

ويظهر الاعوجاج أيضاً في الصدر فيكتسب من التواء الا ضلاغ ورخاوتها شكلاً نافراً يشبه صدر الطير وربما اعوج المعدود الفقري في صغار الاطفال (انظر شكل ٣٧ صفحة ١٥٨ )

وفي (صورة ٦) رسم ولد كسيح مفاصله كبيرة ولا سيما مفاصل اليدين وبطنه متتفاخ وصدره ضيق المساحة نوعاً

» العلاج « - على نوعين واقٍ وشافي

العلاج الواقي : يقوم باصلاح مزاج الام في مدة الحمل وذلك بغضل بدنهما بالماء الفاتر أو البارد (انظر الاستخدام في الحمل صفحة ٥) وبالتجدية الواقية وترويض البدن في الهواء النقي والتعرض لنور الشمس والابتعاد عن الاشغال العقلية الناهكة والمحصر في البيوت لان الهواء المحصور يحيط القوى فتسوء صحة الحامل لان كل ما يضرها يضر جنينها والملمس

فيجب على الحامل ان تلتقي بصحتها حق العناية على نحو ما تقدم شرحه في تدبير صحة الحوامل في أول هذا الكتاب . وهذا القانون يجري على نساء الاغنياء كما يجري على نساء الفقراء لاني شاهدت في هذا القطر عدداً كبيراً من الكسيحين في بيوت الاغنياء وكان السبب في اعتلالهم انحصر الام في غرفتها طول النهار والليل كلها في السجن فلا تخرج الى النزهة واذا خرجت فترك العربة ولا تمشي لأن المشي عارٌ أو عيب من عيوب العوائد الشرقية الظالمة وهو جهل فاضح لا يهدده الانور العلم الساطع

وعند ما يولد الطفل يجب ان يلبس الفانلا ويجمم في كل يوم على نحو ما مر بنا في ثياب الاطفال والاستخدام (صفحة ٢٨ و ٣٣ )

والتجدية أمر مهم جداً وأفضل غذاء للطفل لين أمها أو لين مرض مئمنة للشروط المتقدم ذكرها في الكلام على المرض (صفحة ٨٣) واذا تمذر وجودها فيغذى الطفل بين البقر المضاف اليه ماء الشعير او ماء الاوت ميل (ملحق ٢ و ٥) لمنع التجفن الذي يليك المعدة وفي غالب الحوادث يصبح جسم الكسيح على لحم

يُمزج جيداً في زجاجة ويُعطى العليل نصف ملعقة كبيرة قبل الأكل مرتين في اليوم بشرط أن يكون زيت السمك حديثاً وخالياً من الفساد ويوجد أدوية أخرى كثيرة كالفصوف والارسنك تؤخذ بعد الأكل في جرعات صغيرة جداً حسب رأي الطبيب

٠٠

### الروماتيزم — داء المفاصل

يعرف هذا المرض بوجع في المفاصل يشعر به العليل عند أقل حركة ويصحبه ورم وألم حول المفاصل وهي من وسطه مختلف درجة بين ١٠١ - ١٠٠ ف أو  $\frac{3}{4}$  -  $\frac{3}{2}$  س إذا كانت العلة خفيفة . وأما في الحوادث الشديدة فتبلغ درجة الحمى أكثر من ذلك كثيراً . وليس في هذا العلة ما يوجب الخوف إلا إذا طالت مدة فانه يخشى عند ذلك انتشار يصحبها مرض في القلب او تنتهي بالمرض المعروف بالخوريا أي رقص القدس انطونيوس (انظر صفحة ١٤٦)

وفي الأولاد يكثر الروماتيزم في الرسغ (مفصل اليد) والكعب (الكاحل) فيتألم العليل عند أقل حركة حتى تظن أنه مصاب بخلع أو وثوة، ولذلك يجب الانتباه إلى هذا الأمر لهم ولا سيما في صغار الأطفال لأنهم كثيراً ما يكونون من الألم إذا أنهضوا ويكون السبب وجع المفاصل

»العلاج« — ينبغي أن يضجع العليل في فراشه من بدء العلة وينعن عن الحركة لثلاثة تكون سبباً مهيجاً لمرض القلب الذي لا بد من حدوثه في سير الأمراض الروماتيزية القوية . ثم يعطي مسحراً ملحياً ويستلقى البراز بقسرية (مستعملة) مخصوصة والعليل نائم على ظهره . ولا يجوز أن يبرز وهو قاعد القرفصاء إلا بعد زوال الخطر من القلب

البقر والفنم حتى في صغار الأطفال  
اما الام المرض فيجب ان يكون طعامها كثير المواد الدهنية والزلالية وتأخذ  
المقويات حسب ارشاد الطبيب

العلاج الشافي : يقوم بمعالجة داء الكساحة في السنة أشهر الأولى من  
العمر او اكثر الى قام السنة لانه بعد السنة الثانية لا يرق من المرض سوى تأثيراته  
فقط في الجسم . وفي الحالة الاولى يعالج الداء وفي الثانية يعالج ما يتراكه في الجسم  
من السقم وهو صعب الشفاء جداً وبناء عليه يجب ان تدارك العلة من أولها قبل  
ان تتمكن في الجسم فيتعد اقلاعها ويعيش الولد مشوهاً طول حياته

ولا يخفى ان الكسيجين يصابون بسوء الهضم المعدي والمعوي وفي الغالب  
يكون حامض المعدة زائداً عن معدله القانوني فيعالج بالقلويات كالصودا مع  
خلاصة البتركيات لتسهيل الهضم . هذا في صغار الأطفال وأما في كبارهم فيفيد  
حامض المورياتيك الخفيف مع اليسين ويجب ان تكون الجرعة موافقة للعمر  
(ملحق ١٠٩ و ١١٠ ) ويعتمد في ذلك على رأي الطبيب

أما سوء الهضم المعوي فيعرف بالاسهال والبراز المتقطع ويعالج بترك  
اوقيات الرضاع او تغييره تبعاً لحالة الرضيع والمرض على نحو ما أوردناه في الطعام  
الاصطناعي (صفحة ٥٢) ويعالج الاسهال حسب ارشاد الطبيب وفي الغالب  
تحسن حال الامعاء من انتظام الغذاء وتدبيره حسب قوانين الصحة واذا طال  
فيعالجه الطبيب

وما يفيد كثيراً الاستحمام بالماء المالح (ملحق ٤٥) . ومن الداخل زيت  
السمك النقي المضاف اليه البيض الذي والفالسرین هكذا :-

|           |     |      |
|-----------|-----|------|
| بيض في    | ١   | عدد  |
| غليسرين   | ١٥  | جرام |
| حمر الشري | ١٥  | جرام |
| زيت السمك | ١٥٠ | جرام |

ويسكن الوجه ببروك الكلورفورم هكذا:-

زيت زيتون ٤ أجزاء

نشادر ١ جزء

كلورفورم ٤ أجزاء

يزج جيداً ويدهن حول المفاصل ثم تلف بالقطن المندولف والورق الزيتي  
وتربط

ومن العلاجات الواقعية لبس الثياب الدافئة منذ الولادة وعدم تعرية الساقين  
والذراعين من اللباس حتى في أيام الصيف الحارة لأن هذه العادة التي اقتبسها  
الشرقيون عن الأفرنج من أقبح العادات وأضررها للصحة وعلى الحصوص اذا  
كان الولد من أبوين أحصيا بداء الروماتزم فإنه يكون في خطر من الوقوع في  
المرض المذكور عند أقل تعرض للبرد ( انظر تغيير اللباس صفحة ٤٤ )

ومما يفيد كثيراً الاستحمام بالماء البارد من السنة الرابعة فصاعداً وفرك البدن  
على أثر ذلك بنشفة خشنة ثم بليس ثيابه حالاً ويتجنب الجلوس في مغارى الهوا  
والنعرض له وهو سخن ولا فرق في ذلك ان كان الفصل بارداً أم حاراً  
ويجب ان يكون غذاء العليل اللبان وغيره من الاطعمة السهلة الهضم بشرط  
ان تكون خالية من الشاء . وفي الحوادث القوية يعتمد على الطيب



### التهاب الغدد - ورم الغدد

يوجد تحت الجلد غدد منتشرة في بعض أجزاء الجسم فإذا أصابها التهاب  
زاد حجمها عن المعتاد وقد يشتد الالتهاب فتقرن وتنتلي ، قيحاً ثم تنفجر  
فإذا كانت هذه الغدد تتقيّح يبظو الواحدة بعد الأخرى فتكون في الغالب  
من النوع الدرفي المعروف بالختازيري



صورة (٦)

ولد من السود مصاب بداء الكساح ومفاصله منضخمة وفي بدنـه نفاط جدري  
ماء على هيئة بقع يضا.

وإذا ظهر الورم بخفة فيكون حادّاً من التهابات في الفم والحلق كأفي الدغير يا والقرمزية فان الغدد تحت الفك ترم في هذين العذتين . والغدد الواقعة في قفا العنق ترم وتتكبر من مرض الاكزما . والتي خلف الاذنين من التهاب فيهما او في الالوزتين . والغدد التي تحت الابط ترم من سبب في اليدين والتي في الحاشم من أسباب في الطرفين السفليين أو داء الزهري

﴿العلاج﴾ - يزول الورم بزوال السبب . ومن العلاجات مروخ الصابون أوزيت الزيتون السخن يفرك به فركاً لطيفاً في كل يوم . ولا يأمن من وضع لصق بزر الكتان مرات متواتلة . وأحياناً يتنهى الورم بخراج فينجر او يعالج بالجراحة .  
وإذا طالت العلة فشاور الطبيب

٥٠

### ضمور الأطفال - ذبول الأطفال

هو ضعف زائد يعتري الأطفال تدريجياً فيصغر الوجه ويتجعد حتى يصدر الطفل كأنه هيكل من جلد وعظم وشكله يقرب من شكل المصابين بالامبال البطيء .  
( انظر صورة ٢ )

﴿الأسباب﴾ - تنقسم الأسباب إلى ثلاثة أقسام ( ١ ) الأسباب الناشئة عن الطفل نفسه ( ٢ ) نقص في لبن الأم ( ٣ ) سوء التغذية الصناعية فالقسم الأول يحدث في بعض الأطفال المصابين بضعف المضم الناشيء عن ضعف عام في الجسم فيصعب عليهم هضم الطعام حتى لبن الثدي . وأكثر هؤلاء الأطفال من والدين مسلولين أو مصابين بداء الزهري وأمراض أخرى حادّة من الفقر وسوء التغذية والمعيشة فirth الاولاد من والديهم هذا الضعف الذي يؤدي إلى ذبول أجسامهم

والثاني عدم صلاحية لبن الثدي للتغذية وهو اما ان يكون كثير الموارد الدهنية

تغيره اذا لم يكن موافقاً للرضيع او الفطيم  
والحوادث البسيطة يتوقف شفاها على التغذية اكثر منه على الدواء والطفل  
الذى لا يوافقه لبن امه يجب ان يغذى بلبن البقر بعد تطهيره وتحضيره على نحو  
ما أسلفنا يياه في الطعام الاصطناعي (صفحة ٥٦ - ٦٠) او يصلاح لبن الام  
بتغذية الوا فيه كما نقدم (صفحة ٤٨)

ومما يفيد الاستخدام بالماء البارد مسحًا بالاسفنجه واذا كان مصاباً بالامساك  
فيضاف الى غذائه عصير لحم البقر (ملحق ١٨ و ١٩) او البيسبن ليساعد على  
الهضم ويلين الامعاء . والطعام المضوم يفيد الاطفال كثيراً في هذه العلة (انظر  
ملحق ٢٣ و ٢٤) وما يليهما

\*\*

### التهاب - الثدي

يفقد أحياناً ان يرم الثدي في اليوم الاول او الثاني من الولادة ويفرز منه  
سائل يشبه اللبن . ويحدث في الذكور والإناث من غير استثناء  
يعالج بهذه بزيت الزيتون سخناً وبالقاسمين لمدة أسبوعين . ويخترس من  
عصر الثدي لثلاثة نفسي الحال الى تكون الاجرة ومعالجتها بالجراحة . واذا اشتد  
الورم واحر الجلد حوله فيسرع باعلام الطبيب

\*\*

### الفواق - المازوفة

هو انفصال آشنجي في الحاجب الحاجز ( هو الذي يفصل بين احشاء الصدر

او الزلازل فلا تقوى معدة الطفل على هضمه ولا سيما اذا كانت قوة الهضم فيه ضعيفة . واما ان تكون مواده المغذية ناقصة فلا يوافق الرضيع فينزل ويذبل اذا لم يتغير غذاؤه

وقد يكون لبن الام صالحًا للتغذية لكنها ترمع طفلها اكثر مما يحتاجه جسمه من الغذاء فتفقد معدته عن هضمها ويصاب بما يسمى في الطب « بسوء التغذية » (انظر صفحة ٥٣)

والثالث التغذية الصناعية الغير موافقة وقد شاهد المؤلف في مستشفى الولايات المتحدة الاميركية حوادث كثيرة في ذبول الاطفال ناشئة عن الرضاع من الزجاجة وعلى الخصوص للبن الحمد والاطعمة النشائية ولبن البقر من غير تطهير او تدبره على الطريقة التي نقدم ذكرها في الطعام الاصطناعي (صفحة ٦٤-٥٢) والاطعمة النشائية (صفحة ٦٤)

**﴿الاعراض﴾** - تندى بالهزال ويشعر الطفل بجوع مستمر فيطلب الاكل على الدوام وعند الرضاع من الثدي يمص الحلمة بشوق زائد وتراء نكداً ضيق الحلق يكثي بدون انقطاع من شدة الجموع . ثم لا يلبث قليلاً من الزمان حتى ينزل وثير اضلاعه من تحت الجلد ومثل ذلك مفاصل يديه ورجليه واكثر ما يظهر الضم夫 على الوجه والذراعين والساقيين فتفرق العينان وتبرز الجبهة الى الامام ويتمدد البطن وتضمر عضلات الجسم ويتجمد الجلد ويظهر عليه نفاط يعرف بنفاط سوء التغذية

ويكون اللسان ميضاً والدفع من الامعاء غير منتظم فتارة يحدث اسهال وطوراً امساك وأما لون البراز فاخضر مائل الى الصفرة . ويصاب العليل بغض مستمر في الليل يقوى عليه كثيراً فيحرمه النوم . وفي هذه العلة تكثر الاضطرابات العصبية وخصوصاً الارق وخوف الليل

**﴿العلاج﴾** - من الفلط ان يعطي الطبيب علاجاً من الداخل قبل ان يدرس العلة دراساً دقيقاً ويقف على الاسباب فيزيلها بترتيب اوقات الطعام أو

واحشاء البطن ) يحدث في الغالب من اختلال الهضم وأسباب أخرى كثيرة وهو مزدوج جدًا يزول الفوافق من صغار الأطفال بتناوله من مركز إلى آخر أو بالهدوء (الضرب باليد على الظهر قليلاً) أو بشرب الماء السخن المضاف إليه ماء العناصر والصودا (ملحق ١٠٠) وفي كبار الأولاد يزول بشرب الماء البارد جرعات متقطعة أو بقطع النفس على قدر ما يتحمله الولد أو باستعمال طريقة أخرى تهيج فيه الضيق أو الغضب أو البكاء على ما هو معروف عند العامة

٦٠

### الحمى

الحمى عرض لأمراض عديدة . وبما أنها تحدث في الغالب بفترة بدون أعراض أخرى فيمكن أن تعالجها الألم قبل مجيئ الطبيب في أول الأمر ينبغي أن تُنْسِي حرارة الجسم بميزان (شكل ٥ صفحة ١٦) لكي تكون على ثقة من وجود الحمى وعدها لأن سخونة الرأس واليدين لا تدل على وجودها وكذلك عرق الجسم وبروادة الأطراف لا تدل على زوالها والأفضل أن يمْول في ذلك على ميزان الحرارة كما نقدم

وفي الحمى نقل شهية الطعام ويضعف الهضم ولذلك يجب أن يقطع الطعام عن العليل ببعض ساعات في بدء الامر أو يتناول شيئاً قليلاً من مرق اللحم وإذا حصل في فوجب ان يمنع عنه الطعام شيئاً ويعطى مهلاً من المنازلا أو زيت الخروع (انظر ملحق ١٠٩ و ١١٠) ويعقب عليه مزدوج الحمى (ملحق ١٠٣)

ويحسن أن يغسل به الحرجل السخن (ملحق ٤٢) لكي يظهر النفاط الجلدي إذا كانت الحمى من أمراض الحميات التفاعالية كالجلدية والقرمزية وغيرها . ولا يُنْسِي إذا كان يحتمم بالماء السخن وحده (ملحق ٣٦)

وإذا لم يعرق جسم الطفل بعد خمس ساعات من بدء الحمى واستعمال الورم ظهر التي تقدم ذكرها فيجب أن يجعل الغطاء خفيفاً لاته كثيراً ما يكون ثقله يأثث على ارتفاع درجة الحمى . ومن الواجب أن يكون الغطاء في الحميات أخف منه في أثناء الصحة

وفي أثناء ذلك يسقى الماء البارد فقط لا الماء المثلوج في كميات معتدلة والذين ينعنون شرب الماء في الحميات يفاظون كثيراً لأن النار لا تطفأ إلا بالماء وفي الغالب يصحب الحمى وجع شديد في الرأس فيعالج بالماء والخل تبل بهما خرقة نظيفة وتوضع على الرأس وتكرر إلى أن يخف الألم أو يزول

٦١

### الاستسقاء

هو تجمّع سوائل مائية في الجسم وقد ينحصر في جزء واحد منه كالبطن أو القدمين وقد يهم الجسم كله وأسبابه مرض الكلمي والقلب وأما استسقاء البطن فيغالب حدوثه في أمراض الكبد والبريتون ويعالجه الطبيب

٦٢

### برودة اليدين والرجلين

تحدث في الغالب من ضعف الدورة الدموية الحاصلة من سوء الهضم وعدم كفاية الدماغ وتحريك الدم بالرياضة البدنية وأسباب أخرى كثيرة . ويكثر حدوثها في الزمن الذي يتدنى فيه الطفل بلبس الجوارب والخذاء تعالج بلبس الثياب الدافئة على الجسم كله وغسل اليدين والرجلين بالماء البارد مسحًا بالاسفنجة ثم تفرك جيداً بمنشفة خشنة . وما يفيد أيضاً تقبيل الأطراف بمقادير متساوية من التربينة وزيت الزيتون لنفيه حرارة الدم السطحية . وفي

وقت النوم يوضع حول قدمي الطفل ويديه زجاجات سخنة او قرميد ( طوب )  
سخن لحفظ الحرارة اذا لم تتفق الوسائل السابقة الذكر

°°

### حصر البول - اسر البول

يحبس البول في المثانة لاسباب كثيرة منها قالم الطفل عند التبويل وهو كثير  
الحدث في سن الطفولية . ويحدث ايضاً عقب المغص فيصرخ الطفل من الام  
ويرفس برجليه ويطويهما فوق بطنه

يعالج بتغميسه في حمام سخن او يوضع كادات سخنة فوق المثانة لتسهيل البول  
واذا كان الولود حديثاً لا يبول بعد ٢٤ ساعة من ولادته ولم تؤثر فيه الوسائل  
التي نقدم ذكرها فيسرع باعلام الطبيب

°°

### البول عند النوم - سلس البول

هو التبويل في الفراش والولد نائم . وهو مرض في صغار الولاد لاعادة فيهم  
كما تزعم العامة . ومن القسوة ان يعاقبوا من اجل ذلك  
اما الوسائل التي يمكن استعمالها في هذه الاحوال فهي ان يجعل طعام الولد  
خفيفاً في المساء وينعن عن شرب الماء او أي سائل كان قبل ميعاد النوم وان  
يبول قبل النوم تماماً ويوقظ لاجل ذلك نحو مرتين او ثلاث مرات في الليل  
ويختبر من الطعام القليل لانه يعيق الحرارة التي هي من جملة الاسباب الاعادة  
على التبويل

ويقتضي ان ينام العليل على احد جنبيه وينعن عن النوم على ظهره لثلا يكون

باعثاً على التبويل ايضاً ولذلك ينبغي ان يشد الى ظهره على محاذة العمود الفقري  
اسطوانة فارغة مسطحه على شكل عصا قصيرة فاذا قلب في الليل على ظهره  
وخرزته فيمود الى النوم على احد جنبيه  
هذا كل ما نقدر الام على استعماله واذا كان هنالك سبب مرضي

فعالجه الطيب

°°

### الام عند التبويل

قد يحدث في غالب الاوقات ان الطفل يصرخ بخفة صراخاً حاداً بدون  
سبب ظاهر او اعراض اخرى واضحة . وهو يشبه صرخ المقص والتهاب الاذن  
الا انه في هاتين الحالتين تصحبه اعراض اخرى وأما في الحالة الاولى فلا يصحبه  
عرض من الاعراض مطلقاً ويمحى فقط في اثناء التبويل لان الطفل يتأنم  
فيصرخ بشدة صراخاً خطأً حاداً

على انه اذا لم يصحبه سبب واضح او علامة ظاهرة فيحتمل ان يكون  
البول هو السبب الوحيد لهذا الصراخ وعند النظر الى الحفاظ يشاهد عليه راسب  
مصغر او محمر اذا عرك بطرف الاصبع شعر بحاده دقيمه خشنـه حصوية وهي السبب

°°

### تضيق الغلفة

فيموس - اختناق جلد القضيب

في هذه الحالة تكون الغلفة مختلفه وزائده في طولها كثيراً وبها انها تفرز  
من غشائها المخاطي مادة بيضاء فيختفي ان تسب تلك المفرزات هيجاناً يمذب

العليل اذا لم تنفف جيداً . والطريقة الوحيدة للخلاص من هذا المذاب هي شق الجلدة شقاً مستطيناً او تطهير الولد وهو أصح علاج واجمعه على كل حال

٥٠

### انكاش الغلفة - برافيوسن

في هذه الحالة تندكش الغلفة وينكشف رأس القضيب وهي حالة مرضية حادثة من سبب يعرفه الطبيب

٦٠

**(العلاج)** - يعالج القضيب بالكمادات السخنة من ما، الخبازى او بتفعيسه بالملاء السفنون عراراً في النهار . ويمكن ان ترد الغلفة الى موضعها وذلك بان نقبض على رأس القضيب بين أصابع اليدين اليسرى ثم تجذب الغلفة باصابع اليدين حتى ترجع الى مكانها ويكرر ذلك عراراً . واذا لم تقدر هذه الواسطة فليس لها دواء الا سكين الجراح .

٧٠

### الزراق الحلقى - سيانوسن

يولد الطفل ويشاهد جلد مزرقاً في الغالب يظهر هذا الزراق في اليوم الاول من الولادة واذ لم يرجع لون الجلد الى حالته الطبيعية بل بقي مزرقاً فهو دليل على مرض في القلب

وفي الحوادث الخفيفة يظهر الزراق عند البكاء فقط واذا كانت قوية فربما تكون سبباً لموت الطفل في أيام او أشهر قليلة . على انه في كثير من الحوادث تسفر العلة الى سن الحداة فيصاب العليل بضيق النفس وخفقان القلب ويقع لون الجلد مرققاً او يظهر الزراق فقط عند ما يشعر بالبرد او يتعب جسمه

### التنفس من الفم

اذا أصيب الولد بالتهاب اللوزتين او علة في الافق انسدت مجاري الهواء . وهذا السبب يتفس من فمه ويشعر في نومه . واذا لم يشاهد في الحلق ولا الافق التهاب او سبب آخر يعيق التنفس في الغالب يكون الشخير وفتح الفم عادة في الطفل وعندئذ يجب ان يربط من تحت ذقه برباط شاش حتى يطبق فيه في أثناء النوم ويتمدد التنفس من افهه لان وظيفة الفم هي مضغ الطعام واذا استعمل للتنفس كان سبباً لحدوث امراض سيئة في الحلق والافق . وفي مثل هذه الاحوال يشاور الطبيب

٨٠

### مص الاصبع

مص الاصبع او ابهام الياد عادة سيئة في الاطفال تبديء في الاسابيع الاولى من الولادة وقد تتمكن في الطفل فيص ابهامه في اليقظة والنوم واذا لم تدرك الام هذه العادة بالوسائل الالزامية من أول الامر فلا بد من ان تلارمه الى سن الرشد وتكون سبباً لبروز الفك الاعلى الى الامام حتى يصير على شكل الحرف ل وذلك من ضغط الاصبع على حافة الفك عند المص . وكذلك تبرز الاسنان الى الخارج فصیر مثل اسنان الارنب . وينخدف الفك السفلي وربما يتشوّه الافق من الضغط على سقف الحلق

**(العلاج)** - اذا رأيت الولد يص أصبعه وكان كبيراً فاخرجه من فمه ببطافة وحوال افكاره الى شيء آخر او يدهن الابهام بمادة مررة او حريقة كالصبر والحلبيت الخ . وقد لا تفع هذه الوسائل وعلى الخصوص في الحوادث المزمنة ولذلك يجب ان تربط يده الى جانبيه او تدخل اليدي في كم القميص ويربط

من طرفه بخيط مكين . ويجوز استعمال هذه الواسطة في الليل والنهار معًا حتى يقلع الولد عن هذه العادة المضرة

\*\*

### عض الاظافر

عادة سبعة تشوّه شكل الاصبع وتكثر في الاطفال من السنة الثانية فصاعدًا وقد يكن ابطالها بتعديس اطراف الاصابع باداة مرأة او استعمال الوسائل التي نقدم ذكرها في مص الاهام . واذا كان الولد كبيراً فربما يقلع عن هذه العادة بالوعظ والارشاد او بمقابلة اطراف اصابعه المشوهة بأصابع اخرى سليمة

\*\*

### التمتمة - المجلجة

التمتمة او السكنة هي نقص في النطق بحيث يعجز الولد عن لفظ الكلمة بتمامها او بصرامة تامة

والملجحة خلاف التتممة وفيها يلفظ الولد كلامه بحلاه تام ولكنه يثرثر (يؤوي) قبل ان يتم لفظ الكلمة . فاذا أراد متلًا ان يقول خالي او عمي ابتدأ هكذا خ - خ - خ خالي او ع - ع - ع عمي

وهذه العادة عل رأي بعض الاطباء نوع من الامراض العصبية . وفي الغالب تحدث من السنة السادسة فصاعدًا وهي في الذكور اكثر منه في الاناث . وأحياناً تكون موروثة شأن سائر العادات والصفات التي يرثها البناء عن آبائهم وتزول هذه العادة بتعاميم الولد ان يلفظ الكلمة بتحمل ووضوح تام ومنعه عن خالطة المعلمين والاهل والاصدقاء الذين ياجلجون في أحاديثهم للا يقتبس هذه العادة من كثرة السمع ويساعده على ذلك قوة التقليد والاقتباس البالغة أشدها في صغار الولاد

ويُنْبَغِي ان يعني بصحته ويُبعد عن الاسباب التي تهيج اعصابه ولا يسمح له ان يتكلم بعجلة ولا في ساعة الحدة والغضب لان لسانه لا يطأوه في مثل هذه الاحوال على التكلم بطلاقة فيكثر من الجلجة . ولا يجوز ان يوبخ لان التوبيخ يؤثر في اعصابه فتزداد حالته وبالاً

ويحسن ان يتمرن على النطق في بدء الامر بصوت واطي . او همساً ثم يرفع صوته تدريجياً حتى يصير يلفظ الكلمة بصوت عال بدون ثرثرة . وعلى الام ان تراجعه في الكلام وتجعله يعيد الكلمة بتحمل تام حتى يلفظها بطلاقة من غير صعوبة . ولا يخفى ان الجلجة لا تحدث في أثناء التكلم همساً ولهذا السبب اذا كان الولد يلفظ الكلمة اولاً بصوت واطي . جدًا ثم يكررها كل مرة بصوت أعلى من الآخر على نحو ما نقدم فلا بد من الفائدة على تولي الاهام والا فيرسل الى احدى المدارس التي تدرّب الولاد على النطق الفصيح وهي كثيرة في البلاد المتعددة

### الفصل الحادي عشر

#### في الآفات الجراحية وأشباهها

الجروح القطعية - الجروح الرضية والمزقية - الجروح الورخية - الجروح المسمومة - عضة الكلب - لدغ الحية - لسع القعرب والهوم - الرضوض - الخلع والكسر - الحرق والسلق - حرق الشمس - التثليج - الاجسام الغريبة في العين - جروح العين - الاجسام الغريبة في الاذن - بلع الاجسام الغريبة - زيف افني - الفرق - الاحتناق - التسمم ومضاداته

### الجروح القطعية

هي الجروح الحاصلة من الآلات القاطعة كالسكاكين ويصاحبها نزف دموي وإن حارق

**» العلاج » :** يغسل الجرح بقطعة قطن بوربكي أو شاش نظيف تبل بالماء البارد أو السخن (كلاهما نافمان في قطع الدم) ثم تؤخذ رفادة من شاش نظيف تطوى على مرتين وتوضع على الجرح بعد تفريتها باءة الفينيك أو السليماني (ملحق ٧٦ و ٧٧) ثم يربط الجرح بالغافة نظيفة ويترك بدون غيار بضعة أيام إلا إذا كانت رائحته كريهة والجروح يشكو الالم أو عرضاً آخر كالحمى فعندئذ يجب ان يغسل كل يوم ويصمد على الطريقة التي تقدم ذكرها

أما الملافة أو المصابة المستعملة لضم الجروح وربطها فتختلف باختلاف طول الجرح وعرضه . وأفضل الملافات ما كان من نسيج المصلينا الدقيق أو الشاش السليماني . وعند استعمالها يقيض عليها باليد اليقى بعد لفها وزرع الخيوط من حافتها وبدار بها حول المضو المراد ربطة على نحو ما ترى في (شكل ٣٨)



(ش ٣٨) الملافات وطريقة استعمالها

ويبدأ دائمًا من الاسفل إلى الأعلى فإذا كان الجرح متلاً في قصبة الرجل فيبدأ باللف من الكعبين (الكافيين) وفي كل دورة ثقل الملافة إلى الاسفل وبهذه الطريقة تقلد هيئة المضو تمامًا ولا يظهر فيها تحكم وعند الفراغ تتم بدبوس أو تخاط

وقد تلتصق الملافة بالجروح ففصل عنه عند الغيار بسكب الماء السخن عليها  
واذا كان متقيحاً فيغسل ب محلول الفينيك او السليماني

وأحياناً ينفذ الدم من الملافة وعندئذ يضغط عليه بالاصبع او الكف ضغطاً  
متوسطاً حتى يتقطع والا فيسرع باعلام الطبيب لثلا يكون التزيف سبيلاً لانخطا

#### القوى والأغماء

وكثيراً ما يقطع الواد أصبعه قطعاً كاملاً . في مثل هذه الحال يجب ان  
ينغسل جيداً ويرد إلى مكانه ثم يلف بقطعة مشمع لها محكاً ويستدعى الطبيب  
وفي غالب الحوادث يلتجم الاصبع ويرجع إلى أصله

\*\*

### الجروح الرضية

تحصل من أجسام راضة كالحجر والطوب وما أشبه ذلك وهي في الغالب  
غير مؤلمة تعالج مثل الجروح القطعية  
وأحياناً يتسلخ الجلد او تنسج البشرة فيستعمل لذلك مرهم البوريك والزنك  
(ملحق ٧١) يوضع قليل منه على قطعة تبل (كتان) ويربط بالملافة

\*\*

### الجروح الوخزية

هي الجروح الحادثة من آلة مرآسة كالابرة والمربة والدبوس والشوك والحسك  
وما أشبه ذلك وهي مؤلمة جداً ويصاحبها ورم كثير . تعالج بنزع الآلة الظاهرة  
وعصر الجرح حتى يخرج منه الدم حاماً المواد الموجودة فيه . ويزول الورم  
بوضع لق سخنة مضادة للفساد (ملحق ٦٢)

\*\*

## الجروح المسمومة

تحصل من لسع الحشرات وعض الكلاب الخ وهي :-

(١) **لسع الزنور** - هو من الجروح المسمومة ولكنه غير مخطر ويعالج بنزع الحمة وغسل المكان بإباء الشادر او دهون الكافور ويزول الورم بالكمادات الباردة

(٢) **لسع الناموس** - لا يعتمد به ما لم تكن الساعات عديدة فتولم الطفل وتزعبه وأحياناً يتبيّج سطح الجلد ويرم ويتشوه منظر الوجه . يمنع الناموس من الدخول الى الغرفة بوضع حواجز (شعرية) من السلك الدقيق في النوافذ والابواب أو باستعمال الناموسية في أثناء النوم بشرط ان تكون من نسيج التول ليختلاه الهواء . ويقال ان الريحان (الحبق) في الغرفة يطرد الناموس . ويرافق اللسعات حكة فتحتفف بعها بازيت الفينيكي (ملحق ٧٦) او بإباء الشادر او دهون الكافور او بالوضعيات المبردة (ملحق ٨٤)

(٣) **عضة الكلب** - وغيره من الحيوانات كالقط والفار يحدث في بعض الاحيان التهاباً شديداً وانحرافاً في الصحة . ويندر حصول داء الكلب على اثر عضة الكلب او حيوان آخر ولا يجوز ان يقتل الكلب الذي يعيش بل يجب ان يراقبه الطبيب حيناً من الزمان حتى اذا وجد سليماً اي غير مصاب بداء الكلب فيكون ذلك راحة للعليل واهله

والجروح الحاصل من حيوان غير كلب يعالج مثل سائر الجروح التي مر ذكرها . واما اذا كان الحيوان مصاباً بداء الكلب فيجب ان يقطع الجزء المصابة حالاً او يكوى بمجديد محى على النار او بحامض الفينيك القوي او حامض السلفوريك وغيرها من الحوامض المعدنية الكافوية

(٤) **لدغ الحيات - قرص الثعبان** - يعالج بربط العضو المصابة من فوق الجرح ربطاً شديداً بخيط ماكن لينفع سريان الاسم في الجسم ثم يصر

الجروح تحت الماء او يمتص بالفم ويقصى الدم حالاً . ويختبر عند مص الجرح ان تكون الشفة مشقة او مجرورة ثلاثة يدخل السم منها الى الجسم . ويقوى الجرح بمسمار او قطعة حديد تحمي على النار الى درجة البياض وتتنفس في اعمق الجرح . وبغسل باءة برميقات البوتاسي بنسبة غرام واحد منه الى ٣٠ غراماً من الماء المقطر او المرشح ويعطى المنبهات لانتعاش القوى وتفوية القلب (٥) **لسع القعرب** -- موئم جداً ويؤوت منهم كثيرون ولا سيما في صعيد مصر . يعالج على الطريقة التي نقدم شرحها في لسع الحشرات الخ

\*\*

## الرضوض

الرضور يحدث من اصطدام احد اعضاء الجسم بجسم آخر كالبروز ان يرق الجلد . ثم يكبر رويداً ويصبحه كدم حزق في أوله وباهت في آخره . يعالج الورم بالضغط عليه باليد او بكادات من الماء المثلوج او الماء الهايدروكربون السائلة .

\*\*

## الخلع والكسر

الخلع هو تزحزح طرف العظم من مفصله ويندر حدوثه في اصغر الاولاد ما عدا مفصل الكوع والكسر : اما ان يكون جزئياً او كاملاً فيقسم المظالم الى قسمين . ويغلب حدوث الكسور الجزئية في الاطفال لان عظامهم طرية تشبه الغصون الاخضر فاذا لوت انكسر بعضه ولا ينكسر كله **(العلاج)** : الافضل ان يتمتمد على الطبيب في معالجة الكسور والخلوع .

و قبل نقل المصاب بالكسر من مكان الى آخر يجب ان يوضع له جهاز وقية بلا  
يتحرك و تندد شظية من العظم المكسور في الجلد فتنبه او ترقى احد الاوعية  
فازداد الحالة خطرًا

وتؤخذ الجماجم من الخشب او ورق الكرتون السميك او من الورق المادي  
يطوى مرار حتى يصير سمكه كافيا ثم تربط الجبيرة باللفافة او رباط آخر مما  
تصل اليه اليدي في ذلك الوقت

واذا كان الكسر في الفخذ فترتبط باللفافة مع الفخذ الاخر اذا كان  
بالذراع فيربط الى جانب المصاب وبهذه الطريقة تنتهي الحركة ويكون العليل  
في مأمن من الخطر الى ان يأتي الطبيب

\*\*

### الحرق والسلق

يمحدث الحرق من النار والاجسام الحامية والسوائل السخنة والحوامض  
وهو على ثلاثة درجات الاول يحمر فيها سطح الجلد ويصبحها ألم شديد .  
والثانية يحدث فيها مع الاحمرار نفاط هو يصل ميل مائة . والثالثة يصاب  
فيها الجلدوما تحته من الانسجة الرخوة

وليس في الحروق ما يوجب الخوف على الحياة الا اذا كانت متسعة او منتشرة  
في الصدر والبطن والظهر لانه يخشى عندئذ ان يحدث بسببيها التهاب سريع في  
الاحشاء يكون سببا لموت العليل في ساعات قليلة . وكذلك شدة الالم تفضي الى  
الموت أيضا واكثر ما يكون ذلك في حروق الدرجة الاولى المتسعة  
وقد وقع في يد المؤلف حوادث كثيرة في درجات مختلفة وكانت حروق  
الاطراف اسلم عاقبة من حروق الصدر والبطن والظهر وعلى الحصوض اذا كانت  
في الموضع الثلاثة جميعها

(العلاج) : اذا رأيت ثياب الولد مشتعلة فبادر الى اطفالها بصب

ماء البارد عليها او بلف الجسم بعباءة او ملائمة او لحاف حتى ينقطع الهواء  
وتخمد النار . ومن الوسائل المقيدة ان يدللي رأس المصاب الى الاسفل حتى تتجه  
النار في سيرها الى الجهة المخالفة وبذلك يتخلص الرأس من الحروق وما يحدث  
بسبيها من التشوه في الوجه والذراعين . ثم يلقى العليل في الغراش ويستوي اشربة  
منبهة كالشاي المضاف اليه قليل من الكونياك اذا كان منحط القوى او مغميَاً  
عليه . ثم يعرى العضو المحرق من الثياب وتتممس قطعة شاش ناعم باه ملح  
ال الطعام او كربونات الصودا على نسبة ملعقة صغيرة الى كمية ماه وياف بها الحرق  
فيسكن الالم . وبواسى أيضا محلول الفينيك النقي (ملحق ٧٦) على الطريقة التي  
تقدمن ذكرها . وما يفيد كثيرا مرحهم اكسيد الزنك يد على قطعة نسيج ويضمد بها  
الحرق ثم يوضع فوقها قطان بوريكي وفوق القطن ورق زيق ويعصب فوقها  
بلفافة وتوضع زجاجات سخنة حول الاعضاء الحالية من الحروق اذا كانت القوى  
منخفضة . ومن افضل الوسائل نفعا محلول الحامض البكريك نتممس فيه قطعة من  
النسيج ثم تصرع عصر اخفينا ويضمد بها القسم المحرق على نحو ما يبق يانه  
اما الحروق الحادثة من الحوامض فتغسل باه الصودا فاترا التجريد الحوامض  
من فعلها وتواسى على الطريقة التي اسلفنا ذكرها  
هذا كل ما تقدر الام ان تعلمle قبل حضور الطبيب اذا كان الحرق خفينا  
فلا بأس من مواساته بمعرفتها واما الحروق البالغة فيعالجها الطبيب

\*\*

### حرقة الشمس

تحدث اشعة الشمس احرارا في الوجه . واحيانا ينفتح ويظهر عليه نفاط  
يوم العليل

(العلاج) - يعالج ببرهم او كسيد الزنك فيشفى في أيام قليلة

\*\*

### التشيج - التجليد

هو نصيغ الاطراف وفيه ينسل الجلد وبياضه ويغلب حدوته في الاصبع  
وابهام الرجل والاذن من التعرض الطويل للبرد القارس  
﴿العلاج﴾ - ينقل المصاب إلى مكان بارد لا دافئ ثم لا يحمر  
الجلد ويرم بسبب الدفء فتهدى بذلك حكة تنتهي بنفاط مثل نفاط الحروق  
فيؤلم العليل ويعذبه . وتفرك الاجزاء المصابة بضم ساعات فركاً متواصلاً بالثلج  
او بحرقة مبلولة بالماء البارد وبعد ذلك ينقل إلى غرفة دافئة تدر يجها  
وقد يكون التشيج عاماً وهو ما يعرف بالدقن او الكزاز وعلاجه مثل سابقه  
٠٠٠

### الاجسام الغريبة في العين


نهى بذلك الاجسام التي تقع في العين كالغبار والرمل والهوام الخ . ولاستخراجها  
طريقتان الاولى ان تطبق الجفن العلوي فوق السفلي فتدفع العين وتندف الجسم  
الغربي مع الدموع . والطريقة الثانية هي ان تجلس الام وراء الطفل وقسّك  
الجفن العلوي من الاهداب بين السبابه والا بهام من اليديسرى وتتجذبه الى الامام  
ثم تضغط عليه من الوسط بالسبابة اليمنى او بعود كبريت او صنارة وما شاكل  
ذلك فيقلب الجفن (شكل ٣٩) وعندئذ يستخرج الجسم الغريب بفرشاة  
من وبر الجمل مبلولة بالماء او بقطعة قطن ماءوفة على طرف الاصبع  
وقد تُنجي العين على اثر ذلك فتنصل بنسول فائز (ملحق ٨٠) يذكر  
مراها في النهار حتى تررق العين . واحياناً يشاهد الجسم الغريب لاصقاً ببياض  
العين فيستخرجه الطبيب بالآلة

### جروح العين

تحدث جروح العين من تأثير أجسام حادة مرأسه كالمقص والشوكه او من  
قطع صغيرة حادة من المعدن او الحجارة تدخل العين فتخرقها . ويستدل على ذلك  
من تشوه هيئة الحدقة - يعالجها الطبيب  
٠٠٠

### الاجسام الغريبة في الاذن

من عادة الولاد ان يضعوا في اذانهم زرماً او حصة وما اشبه ذلك وطريقة  
استخراجها هي ان يتكي الولد على الجنب المصاب ثم تجذب الاذن بقوه الى الخارج  
والخلف فيسقط الجسم الغريب منها



(ش ٣٩) طريقة قلب العين

والطريقة الثانية هي ان تتحققن الاذن بالماء الفاتر بمجنحة كوشوك طري  
(شكل ٣٦ صفحة ١٥٥) . أما كيفية الحقن فهي ان تدخل انبوبة المجنحة في  
الجزء العلوي من قناة الاذن حتى يمر الماء من فوق الجسم الغريب ويصل خلفه  
فيقذفه الى الخارج

واحياناً يدخل الاذن هوا م كالبرغوت فيزعج الولد بحركته وملامسته طبلة  
الاذن . يستخرج بصب زيت الزيتون فيها وبعد نصف ساعة تتحققن بالماء  
الفاتر فيخرج الهوا

## بلغ الاجسام الغريبة

اذا بلغ الولد درهاً او زراً وما اشبه ذلك فيجب ان يتناول كية وافرة من البطاطس او الخبز حتى ينزل الجسم الغريب مع الفانط . وليس من الضروري ان يعطى مسهلاً

واذا بلغ جسمًا حادًا كالدبوس او الحنك في الغالب ينفرز في الحلق ويسبب الاختناق وعند ذلك يجب ان يقلب الولد رأساً على عقب بأسرع ما يمكن من الوقت ويضرب على ظهره حتى يتقلل الجسم الغريب من المكان الغارز فيه فان لم يسقط من نفسه فيستخرج بعد الاصبع اليه . واذا علق الدبوس في المريء (القناة الواصلة بين المعدة والفم) فيأكل الولد خبزاً حتى ينزل الدبوس الى المعدة وينخرج منها عن طريق المستقيم



## نزيف انفي - الرعاف

ينزف الدم من الانف في بعض الاطفال بدون سبب وفي البعض الآخر يحدث من آفة خارجية كالسقوط والاصدام او هيجان انفي موضعي ويأتي في سير الحمى الملارية والتيفودية وأمراض القلب والكبد

**العلاج** - يضجم العليل في فراشه ورأسه على مخدة عالية مندفع الى الوراء . ويقطع النزف بالضغط على الشفتة العليا ملاصق المخربين أو على جذر الانف محاذاة موقعي العينين او بوضع الثلج على مقدم الجبهة أعلى جذر الانف أو على قفا العنق . واذا لم تفع هذه الوسائل فيحقن الانف بمحلول حامض التنيك (ملحق ٨٢) وتغسل قدماء بقلي الحرجل (ملحق ٤٩) وفي الحوادث المستعصية يستدعي الطبيب



## الفرق

الفرق من الحوادث التي يجب ان تكون الام ملحة بشيء من طرق علاجها قبل حضور الطبيب . فحالما ينشل الغريق من الماء تخل ثيابه من حول عنقه ويقلب رأساً على عقب حتى يستفرغ الماء الذي في جوفه . ثم يجب لسانه الى الخارج بمنديل او قطعة ثياب قديمة بين الاصبعين . واذا كان التنفس مفقوداً فيضجع حالاً على ظهره ويوضع تحت الكتفين مخددة واطنة جداً او قطعة ثياب مطوية بحيث يرتفعا قليلاً ويكون الرأس ملقى على الارض . ثم يباشر التنفس الاصطناعي على طريقة سلفستر وهي ان ترکم الام وراء رأس العليل وهو مضطجع على الصورة التي تقدم ذكرها وتحذب ذراعيه يديها الى الوراء على مساواة رأس العليل حتى يلحقا الارض وتحفظهما نحو ثانية (شكل ٤٠) . وبهذه الحركة يتسع الصدر فيدخله الهواء ثم تردهما الى جانبي الصدر ويضغط على لاضلاع ضغطاً خفيفاً نحو ثانيةين على نحو ما ترى في (شكل ٤١)



(ش ٤٠) الحركة الاولى من التنفس الاصطناعي

وبذلك يخرج الهواء من الرئتين وتنتمر على هذه الطريقة نحو ساعتين الى ان تتحقق بأن حركة القلب لا النبض وفوت تماماً ولا رجاء في الحياة

وفي أثناء هذا العمل يجب ان يكون مع الام مساعد فينزع الثياب المبلولة عن الفريق ويفرك البدن براحة اليد فرحاً متواصلاً ويوضع حوله زجاجات سخنة لرد الحرارة الى الجسم . وما يفيد أيضاً جذب اللسان ودفعه خارجاً وداخله مراراً عديدة وهذه من العمليات المستخدمة ولا يأس من اجرائها في أثناء التنفس الاصطناعي لما فيها من الفائدة



(ش ٤١) الحركة الثانية من التنفس الاصطناعي

وهذا العلاج أي تقليل التنفس الطبيعي يستعمل في جميع الحوادث التي يفقد فيها التنفس كالاختناق من رائحة الفحم او الغاز او من الحرارة العالية

\*\*

### الاختناق

سواء كان من رائحة الفحم او الغاز او الحرارة العالية يعالج بتعريف العليل الى الهواء النقي والتنفس الاصطناعي على نحو ما نقدم ذكره في الفرق

\*\*

### التسمم ومضاداته

الوقاية من التسمم خير من معالجه ويجب على الام ان تبعد عن اولادها

الاشياء السامة كالكبريت والاعيب الاطفال الملوونة . والادوية الموجودة في البيت (انظر غرفة المرض)

وكثيراً ما يحدث ان الولد يلقط من الارض حبة من حبوب الدواء فيظلمها من الحلويات فيبتلعها وتكون سبباً لتسممه وعلى الخصوص لأن أكثر الادوية في هذه الايام مصنوعة حبوباً على شكل الملبس وقد شاع استعمالها في البيوت واحياناً يقع البعض منها على الارض فلا تهتم الام بذلك مع انه يجب ان تفتش عن الحبة حتى تجدوها وتفتي اولادها من مخاطرها

هذا هو العلاج الواقي . وأما اذا نفذ القدر وتسمم الولد فعل الام انت سرع في طلب الطبيب المجاور لها وتخبره عن تسمم ولدها ونوع السم اذا امكن لكي يأتي بالدواء المضاد له وهذا ضروري جداً

وفي غضون ذلك تشرع في المعالجة . فاذا كان السم مجهولاً فيجب ان تعطي الولد مقيتاً (ملحق ١٠٦) ثم تسقيه من ترياق جونس (ملحق ١٠٥) وهو مفيد جداً في التسمم بالحوامض والزرنيخ والدجنه والزنك وله فائدة أيضاً في التسمم بالخاس والمورفين والستركين . وليس لهذا الترياق تأثير في التسمم بالقصور ويفيد قليلاً في التسمم بالسليلاني

وبعد ذلك يتناول الاشربة الماء وهي اللبن ورلال البيض التي وحده او ممزوجاً بالملاء الصرف او ماء الشعير او الدقيق (الطحين) والماء . ويوضع حول العليل زجاجات سخنة اذا كانت اطرافه باردة . وقد يتقطع التنفس من فعل التسمم فيعالج على طريقة سلفستر وهي التنفس الاصطناعي على نحو ما نقدم ذكره في الفرق والاختناق في الصفحة السابقة  
وفي الجدول الآتي بيان أنواع السموم والادوية المضادة لها انه ذكرها تعميماً لفائدة

\*\*

## جدول السموم وتربيتها او مضاداتها

| اسم السم                           | ضده او تربيتها  |
|------------------------------------|---|
| مجهول .....                        | مقيٌ ويشفع بتربيق جونس والاشرة الملطفة  |
| اكوينت                             | مقيٌ يشفع بالدجتال : منبهات بكثرة . لا يوجد<br>الرأس على مخددة  |
| الكحول (كونياك . عرق)<br>الاخ )    | مقيٌ يصب الماء البارد على الرأس . دفأً . تنفس<br>اصطناعي  |
| اتروبين                            | (انظر بلادونا)  |
| افيون (يشمل الماودن<br>والمورفين ) | مقيٌ (في الغالب لا ينفع) برمانجنات البوتاسي في<br>اول التسمم بجرعة ٢٥ - ٣٠ سنتكرام . يعطي قهوة<br>ثقيلة . احفظ الولد مستيقظاً بصب الماء البارد على<br>رأسه وظهره وبالمشي أيضاً ولكن ليس الى درجة<br>منهكة . اتروبين وتنفس اصطناعي |
| انثيمون                            | (انظر طربير مقيٌ)   |
| بوتاسي كاوي                        | (انظر نشادر)  |
| بلادونا (اتروبين)                  | مقيٌ وحامض تنيك ومكمدات باردة على الرأس<br>وقهوة . منبهات دفأً اذا كان الولد باحتياج اليها  |
| تبغ (نباك)                         | مقيٌ يشفع بحامض تنيك . قهوة ثقيلة أو كونياك<br>ينشق روح النشادر . زجاجات سخنة حول الجسم .<br>تنفس اصطناعي   |

## ضده او تربيتها

| اسم السم  | ضده او تربيتها  |
|---|---|
| جوز القيء   | (انظر ستركتين)  |
| حوامض - خليك .<br>وهيدروكلويك .<br>وسلفوريك . ونيتريك | { القلويات كالمنازيا والطباشير والصودا والصابون<br>ويعقب عليها زيت الزيتون او الاشربة الملطفة   |
| حامض فينك (كريوليک)                                   | { ملح انكاليزى بكثرة . صابون . لا يعطى الزيت  |
| كريازوت   | { حامض اكساليك (يشمل مقيٌ ثم الطباشير أو المنازيا يشفع بالاشارة المرطبة<br>امالاح الليمون ) (لا يعطى البوتاسي والصودا)  |
| حامض بروسيك   | { الهواء النقي . تنشيق النشادر . صب الماء البارد على<br>الجسم . تنفس اصطناعي  |
| زرنينج (سائل فول)                                     | { مقيٌ يشفع حالاً بكية وافية من كلوريد الحديد<br>والمنازيا المكلسة او الصودا او ماء النشادر او<br>تربيق جونس . ثم يعطي بلال البيض النقي . واسرة<br>مرطبة او زيت زيتون وزيت الخروع لاطلاق<br>المعي |
| سليفاني   | { مقيٌ يشفع بلال البيض النقي ، أو الحليب او<br>الاشارة المرطبة او حامض تنيك تم زيت الخروع<br>لاطلاق المعي   |
| سيانور البوتاسي                                       | (انظر حامض بروسيك )   |

| اسم السم         | ضدّه او ترياقه  |
|------------------|---|
| كالوروفورم (بنج) | { حمام بارد . فرك الجلد . يقلب الولد على راسه<br>تنفس اصطناعي               |
| كيريت . . . .    | (انظر فصفور)  |
| لودنم            | (انظر ايفون)  |
| نشادر            | { خل أو عصير الليمون ثم أشربه مرطبة أو زيت<br>زيتون                         |
| بوتاسي كاوي      | نيترات الفضة (حجر جهنم) { ملح الطعام يشفع بقى . حليب أو زلال البيض<br>النبي |
| بود              | { نشادر أو دقيق يمزج بالماء ويُعطى حنه كية وافية<br>مقى . أشربه مرطبة       |



| اسم السم                       | ضده او ترلياقه  |
|--------------------------------|---|
| ستركدين ( جوز القيء ) او كورال | مقيء يشفع بحامض التنيك او برومور البوتاسي<br>( انظر زرنيخ )   |
| شائل فول ..                    | طعام فاسد او منتن   |
| طريق طير مقيء                  | مقيء يشفع بسهل من زيت الخروع لتنظيف<br>المعى  |
| غاز                            | يذق الهواء النقي . وروح الشاذر . تنفس<br>اصطناعي . حمام بارد  |
| فطر                            | مقيء من سلفات النحاس نحو ٦ - ١٥ سنتكراماً<br>يذوب بالماء ويتناوله الولد كل عشر دقائق حتى<br>يتقيأ . ثم ملح انكايزي او منازيا لاطلاق المعى<br>ويمحترس من المساهل الزينة من أية الانواع |
| كورال                          | مقيء وحامض تنيك . قهوة قوية او كونياك .<br>تنشيق روح الشاذر . زجاجات سخنة . تنفس<br>اصطناعي<br>( يعالج مثل الايفيون )   |

## الملحق

يقسم هذا الملحق إلى أربعة أقسام (١) التغذية (٢) العلاجات الخارجية  
(٣) العلاجات الداخلية وطرق استعمالها (٤) تحديد الحبريات وأمور شرق

### أولاً : التغذية

يمحتوي هذا القسم على بعض الأطعمة الخصوصية لصغرى الأطفال وكبارهم وعلى  
الخصوص في مدة المرض • وترك تحضير المرق والشوربة وما شاكل ذلك لحذافة  
الآم وكتب الطبع

### (ملحق ١) منزج لبني للدكتور ميكلز Meigs

|  |       |
|--|-------|
| كرايم (قطشه سائلة)   |       |
| لبن بقر  | ٢ جزء |
| ماء الحير (الكلس)  | ١     |
| ماء السكر  | ٢     |
| يحضّر ماء السكر من ١٧ درهماً من سكر اللبن ١٢ فنجاناً صغيراً من الماء | ٣     |

المرشح ويحفظ منه كمية وافية لحين الحاجة

### (ملحق ٢) ماء الشعير

يؤخذ من الشعير ملء ملعقة كبيرة بعد ان يتنقّى من الاوساخ ثم يوضع في إناء  
نظيف ويضاف اليه كمية وافية من الماء ويغلى على النار نحو خمس دقائق وبعد ذلك  
تُنزَع منه الماء ويضاف اليه نحو ١٦ فنجاناً صغيراً من الماء المرشح ويترك على  
النار الى أن يغلي ويُبقي من الماء نحو ١٦ فنجاناً أي ان يفقد بالتبخر نحو  
فناجين • ثم يصفى بقطعة شاش ويستعمل عوضاً عن اللبن في قيء الأطفال

### (ملحق ٣) ماء زلال البيض

خذ بياض بيضة واحدة أو بيضتين وذوبه تدريجياً بكمية ماء بارد •

ولا بأس اذا كان يخلّى قليلاً بالسكر أو يصفى بقطعة شاش حتى يسهل مروره في ثقب  
حلمة زجاجة الارضاع  
 يستعمل موقتاً في الاحوال التي لا يوفق فيها الحليب صحة الرضيع

### (ملحق ٤) ماء الشعير والزلال

هو منزج من (ملحق ٢ و ٣) يحضر كما يأتي :

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ٣٠٠ غراماً      | ماء الشعير       |
| ٣٠              | بياض البيض النيء |
| ٢-١ ملعقة صغيرة | سكر ابيض ناعم    |

### (ملحق ٥) ماء الاوت ميل

يوضع ملء ملعقة صغيرة من الاوت ميل في ١٢ فنجاناً من الماء الفالي • يحرك  
جيداً حتى يتذوب ثم يوضع الوعاء بعد تقطيعه على نار خفيفة نحو ساعة • وفي أثناء ذلك  
يضاف اليه من الماء ما يعادل الكمية التي يخسرها بالتبخر • يصفى ويضاف الى اللبن  
عوضاً عن الماء في الامساك (القبض أو الكتمان)

### (ملحق ٦) ماء الاراروط

خذ من الاراروط مقدار ملعقة صغيرة ورش عليه قليلاً من الماء البارد وافركه  
حتى ينعم ثم ضعه في ١٢ فنجاناً من الماء الفالي واغله نحو خمس دقائق وحركه بالملعقة  
طول الوقت • يستعمل مع اللبن في الامساك

### (ملحق ٧) ماء الحبز (البيش)

سخن على النار نحو ثلاثة قطع حبز افرينيكي حتى تحرر اي تتحمص ولا تخترق  
وبعد ذلك ضعها في ٢٤ فنجاناً صغيراً من الماء الفالي واترك الماء حتى يبرد في  
الوعاء • صفت • يستعمل في بعض حوادث وجع المعدة

## (ملحق ٨) ماء الرز

يحضر كاياني : —  
رز (بعد غسله)

ماء سخن

يوضع في وعاء ويترك في مكان دافئ نحو ساعة واحدة ثم يغلى على النار حتى يص

ماء ١٢ فنجاناً صفراء يعطي مع الحليب في الأسهال

## (ملحق ٩) ماء الصمغ العربي

يحضر هكذا : —

صمغ عربي

ماء غالى

بذوب الصمغ بتحريكه بالملعقة ثم يخلى بالسكر ويضاف إليه عصير الليمون الخامض  
لبار الأطفال . يستعمل في سن الطفولة عوضاً عن ماء الشعير

## (ملحق ١٠) مغلي بزر الكتان

يحضر هكذا : —

دقيق بزر الكتان

ماء غالى

يوضع في وعاء ويترك سخناً نحو ساعة ثم يصفى ويخلى بالسكر . وتصب إليه  
عصارة الليمون لبار الأطفال . يفيد في الرشوات

## (ملحق ١١) ماء الجناتين (القراء)

يؤخذ من صفيحة الجناتين نحو ثلاثة قوارير طرفة عين وتتفق في الماء البارد مدة قصيرة  
ثم توضع على النار ويضاف إليها نحو ٦ فناجين صغيرة من الماء الغالى وتحريك  
حتى تذوب . تستعمل عوضاً عن ماء الشعير

## (ملحق ١٢) الطعام الجناتين

يحضر ماء الجناتين على نحو ما نقدم شرحه في الملحق السابق ويضاف إليه وهو  
يغلى على النار نحو ملعقة صغيرة من الاراروط بعد أن يبلع بقليل من الماء البارد  
ويفرك حتى يصير بخينة . وفي الوقت نفسه يضاف إليه الحليب والكرام فتائف منه  
طعام مفيد للأطفال حين لا تتوافق باقي الأطعمة صحهم

## (ملحق ١٣) مصل الحليب

خذ نصف كابية حليب سخن واضف إليها ملعقة صغيرة من سائل اليدين أو  
ملعقتين صغيرتين من حامض الليمون أو المسوة واتركها حتى يتفصل المصل عن  
القريحة . صفراء بقطعة شاش . يستعمل لاصحاب المعد الضعيفة التي لا تقبل اللبن

## (ملحق ١٤) مزيج المصل والكرام

|   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| ١ | فنجان صغير  | كرام      |
| ٢ | »           | مصل       |
| ٢ | »           | ماء سخن   |
| ١ | ملعقة صغيرة | سكر اللبن |

## (ملحق ١٥) خمر مصل الحليب

أضاف إلى الحليب حالاً يفور نحو فنجانين من خمر الشرب إلى كل ٦ فناجين  
منه . صفراء

## (ملحق ١٦) شاي لحم العجل

يؤخذ مقدار رطل (مصري) من لحم العجل الخالي من الدهن ويقطع قطعاً  
غيرة ثم يوضع في ١٦ فنجاناً من الماء البارد ويُسخن على النار نحو ٤ ساعات بحيث  
لا يصل الماء إلى درجة الغليان وعندما يبرد ينزع الدهن الطافي على وجهه . يستعمل  
في الحالات التي يتعذر فيها هضم الأطفال

## (ملحق ١٧) كرمة دقيق

يوضع رطل (مصري) من الدقيق (طحين) في كيس ويربط جيداً ويغلي في الماء نحو ١٠ دقائق ثم يؤخذ من الكيس بعد ان يبرد ويحلف نحو ١٠ دقائق أيضاً وبعد ذلك تترنح الطبقة الخارجية أي القشرة من كرة الدقيق ويؤخذ الباب مع اللبن على نسبة ملعة أو ملعقتين صغيرتين من مسحوقه الى ٢٥ جراماً من اللبن • تستعمل لامعدة الضعيفة الهضم

## (ملحق ١٨) شاي لحم البقر

يؤخذ رطل (مصري) من لحم البقر ويقطع ويذبح نحو ٣٥٠ جراماً من الماء البارد ويترك نحو ساعة في الوعاء وبعد ذلك يسخن على نار خفيفة نحو ساعة بدون غليان • يصف بقطعة شاش ويترك حتى يبرد وعند استعماله يسخن ويماج بعد ان يزيل الدهن الطافي على وجهه

## (ملحق ١٩) شاي لحم البقر المشغول

يغلى نحو ٦ فناجين ماء في وعاء من الخزف أو الصفيح المذهب ثم يوضع فيه رطل لحم بقر هبر بعد تقطيعه قطعاً صغيرة ويغطي الوعاء ويترك على نار خفيفة مدة عشر دقائق • يصف بقطعة شاش ويحفظ في الثلاج أو الماء البارد وعند استعماله يزيل الدهن عن وجهه ويستعمل مثل سابقه

## (ملحق ٢٠) لحم في مبروش


يؤخذ قطعة لحم في هبر ثم تبرش بالسكينة أو تهرس أو تقطع قطعاً صغيرة ناعمة جداً وتدق بالماون حتى تصير عجينة وبعد ذلك تفرك جيداً براحة اليدين على سطح منخل شعر وتملح بقدر اللزوم ثم تعمل أفراساً صغيرة وعند الاستعمال يذوب القرص في الماء حتى يصير في قوام القشطة السائلة (الكريام) ويغذى بها صغار الأطفال بالملعقة لا بالزجاجة

يفيد في الامراض الناهكة ولا يجوز ان يعطى من السائل أكثر من ثلاث

ملaque صغيرة في النهار لابن سنة فما دون

ولما كان اللحم الذي يؤخذ الديدان فيحسن ان تطبخ افراص اللحم نصف طبخة ثم تترنح القشرة ويستعمل الباب على نحو ما تقدم

## (ملحق ٢١) عصارة لحم البقر



يملح اللحم البارد ويشوى على النار ثم يبرد ويقطع قطعاً صغيرة ويضرر بالالة (شكل ٤٢) وقد تقوم مقامها الآلة المستعملة لعصير الليمون ولا بأس اذا كانطلاق على الاولى عصارة اللحم وعلى الثانية معصرة الليمون

تفيد عصارة لحم البقر مثل المغذيات التي تقدمتها ويتساوهما الولد بعد تسخينها قليلاً

## (ملحق ٢٢) ماء الجير (الكلس) (ش ٤٢) معصرة اللحم

خذ قطعة جير حبي قدر حجم اليضة وذوبها بمقدار ٣ اترات ماء في وعاء من الزجاج أو الخزف المدهون واترك الماء حتى يرسب الجير في قاعه وعندئذ يبدل الماء القديم بعاء آخر جديد ويغطى الوعاء ويهز ويحرك من وقت الى آخر • وعند الحاجة يؤخذ من وجہ السائل ويضاف اليه قدره ماء جديداً ويحرك كما قدم

## (ملحق ٢٣) الطعام المضروم

يهضم الطعام بواسطة البكتيريا الصودا وهو مفيد جداً في ضعف الهضم المعدي والمعوي وخصوصاً في الاصناف التي يخرج في الطعام غير منهضم مع البراز ويجب ان تحمل حرارة الطعام في أثناء هضمه على درجة ١١٥° فـ ٤٦° سـ ويستدل على هذه الحرارة بتغميس الاصبع في الطعام وتحمّل سخونته نحو دقيقة بدون ازعاج

ولا ينفع ان الماء الغالي والماء الثلوج بوقفان المضم وذلك يجب أن تكون حرارة  
خداء المراد هضمه على درجة معلومة لكي تم عملية الهضم  
وفي ما يلي من الملحقات أنواع كافية من الاطعمة المضومة يغذى بها الطفل عن  
طريق الفم والمستقيم في أثناء المرض

## (ملحق ٢٤) الحليب المضوم

يحضر هكذا : -  
خلاصة البنكرياس  
في كربونات الصودا  
ماء  
حليب بارد

|    |              |
|----|--------------|
| ٢٥ | ستكراماً     |
| ٧٥ | "            |
| ٦  | فناجين صغيرة |
| ١٢ | فنجاناً      |

يوضع في زجاجة ويهز جيداً حتى يذوب البنكرياس والصودا ثم تغمس الزجاجة  
في ماء حرارة ١١٥° ف أو ٤٦° س نحو ١٠ دقائق وبعد ذلك يوضع في الثلوج أو  
يسخن إلى درجة الغليان حتى يتوقف عمل المضم  
على أن الحليب المضوم لا يخلو من طعم مرّ فيحل بالسكر أو يؤخذ مع الكوينياك  
أو ماء القشيش حتى يختفي طعمه وفي الطريقة الأخيرة يوضع ماء القشيش في الكابية أولاً  
ثم يسكب فوقه الحليب المضوم بسرعة ويشربه العليل حالاً يفور

## (ملحق ٢٥) هضم الحليب المطهر

يعقم الحليب اي يظهر حسب (صفحة ٩٠) ويحضر حسب الطريقة المذكورة في صفحة  
٥٨ و٥٩ ماء الماء والسكر ويضاف إلى كل ٨ فناجين صغيرة نحو ٢٥ ستكراماً  
من خلاصة البنكرياس و٧٥ ستكراماً من يكربونات الصودا ويوضع حسب (ملحق ٢٤)  
ثم يخلي بسكر اللبن ويضاف إليه قدر ما يلزمه من الماء الصرف . وفي هذه  
الطريقة يستغني عن ماء الحير أو ماء الصودا . ويحترس من مكثه كبيرة في  
الحرارة ثلاثة أيام يصبر طعمه مرّاً

## (ملحق ٢٦) تعقيم الحليب المضوم

يهضم الحليب حسب (ملحق ٢٤) ثم يوضع ما يكفي لكل نوبة رضاع في زجاجة متينة  
وتغمس نحو ١٠ دقائق في الماء الغالي ثم يترك الحليب حتى يصير فاتراً ويتناوله  
للطفل بالملعقة أو بزجاجة الرضاع

## (ملحق ٢٧) الحليب المضوم قليلاً

خذ الحليب والمواد الهاضمة وأمزج على نحو ما أسلفنا ذكره في الملحقات السابقة  
وضع الزجاجة في الثلوج حالاً بدون أن تعرضاً لحرارة النار  
يستعمل للمعدة الضعيفة وليس له طعم خصوصي

## (ملحق ٢٨) شاي لحم البقر المضوم

يقطع لحم البقر قطعاً صغيراً بعد أن يتنق من الدهن والالياف والعظم الح ويفضاف  
إلى كل رطل مصرى (٩٦ درهماً) نحو ١٦ فنجاناً صغيراً من الماء ثم يوضع على  
نار خفيفة ويحرك دائماً بالملعقة ويحترس من وصول الحرارة إلى درجة الغليان . وبعد  
ساعتين يرفع الإناء عن النار ويوضع في الثلوج أو الماء البارد حتى تخفف حرارة  
السائل إلى درجة ١١٥° ف - ٤٦° س - ٤٣° س (تعرف هذه الحرارة  
بتغميس الاصبع في السائل نحو دقيقة بدون ازعاج) وبعد ذلك يوضع في زجاجة  
ويضاف إليه البنكرياس والصودا (ملحق ٢٥) ويذوب بهز الزجاجة جيداً . وينبغي  
أن تخفف حرارته على الدرجة المدار ذكرها نحو ساعتين وتهز الزجاجة أيضاً من وقت  
إلى آخر ثم يغلى على النار نحو دقيقة واحدة فقط ويصفى ويملح . وإذا وجد طعمه  
مرّاً فيحترس في المرة الآتية من مكثه على النار أكثر من المزوم

## (ملحق ٢٩) المخار المضوم

يؤخذ نصف دزينة مخار (باتيلينوس) مع عصارتها ويضاف إليها ٦ فناجين ماء صغيراً وبعد

اغلاها على النار تؤخذ من الماء وقطع قطعاً صغيرة ثم تهرس وتوضع مع المرق في قطر ميز زجاج ويضاف إليها خلاصة البنكرياس وهي كربونات الصودا من كل صنف ٧٥ سنتكرااماً . وبعد ذلك ينفس القطر ميز نحو ساعة ونصف في حمام ماء على درجة ١١٥° ف - ٤٦° س ويخترس من بقائه كثيراً في الحرارة ثلاثة يصير طعمه مرّاً . وبعد نهاية العمل يضاف إليه ٦ فناجين حليب صغيرة ويغلى على النار ويعلّح يستعمل هذا الغذاء لصغار الأطفال وكبارهم في فقد الهمم أو ضعفه على أثر القيام من صرخ طويلاً كالملي التيفودية وأمثالها

#### (ملحق ٣٠) الدقيق المضوم

خذ من الدقيق أو الاراوط أو الاوت ميل ملء ملعقة صغيرة واضف إليها ٦ فناجين صغيرة من الماء ذوب واغلي على النار حتى يعتقد جيداً ثم أضيف إليه ١٢٤ غ فنجاناً من الحليب البارد وصف في قطر ميز زجاج وضع فيه ٢٠ سنتكرااماً من خلاصة البنكرياس و ٧٥ من بي كربونات الصودا واغس القطر ميز نحو ٢٠ دقيقة في ماء حرارة ١١٥° ف - ٤٦° س أو أقل إذا وجد طعمه مرّاً ثم ارفع حرارة الماء حالاً إلى درجة الغليان لتوقف عمل الهمم

#### (ملحق ٣١) هضم الحليب والخبز

يُجفف الجبز على النار بعد دهنها بالسمن أو الزبدة ثم يفت في الحليب ويُهضم بالبنكرياس والصودا على نحو ما تقدم في (ملحق ٢٥)

#### (ملحق ٣٢) عربات اللبن المضوم

املاً نحو ثلث كوبية بالثابع بعد تقطيعه قطعاً صغيرة واضف ما يكفي من الكوينيك أو البروم أو غيرها من المشروبات الروحية حسب عمر الطفل (انظر ملحق ١١٠ و ١٠٩ لتحديد الجرعة) ثم املاً الكوبية حليباً مضوماً واضف من السكر وعصارة الليمون حامض ما يوافق الذوق ولا بأس إذا كان يرش عليه قليل من مسحوق جوز الطيب لاجل تحسين نكهته

#### (ملحق ٣٣) حفنة للتغذية عن طريق المستقيم

ينفذ الطفل بحقن الطعام في المستقيم في الأحوال التي لا تستطيع بها التغذية عن طريق الفم وذلك في أمراض المعدة أو حالة أخرى مرضية وتتألف الحفنة الغذائية من جميع الأطعمة المضومة التي سبق ذكرها في الملحقات السابقة . ويجب قبل استعمالها أن ينخلف المستقيم من البراز بحقنة من الماء الساخن أما الكمية التي يحقن بها فتحتختلف باختلاف الأعمار . فيحقن ابن سنة واحدة بنصف ملعقة إلى ملعقة صغيرة وابن ستين أو أربع سنين بملعقة صغيرة إلى ملعقة كبيرة . وابن ٨ - ١٢ سنة من ملعقة واحدة إلى ٨ ملاعق كبيرة وتكرر الحفنة كل أربع ساعات مررة

ويجوز أن ينذر بالحليب المضوم (ملحق ٢٤) أو يسخن الحليب ويضاف إليه البنكرياس والصودا ويحقن به حالاً . وأفضل الماء الموجود رسماً في (صفحة ١١٢ و ١١٣)

#### (ملحق ٣٤) حفنة من اللحم المضوم

خذ ملء ملعقة كبيرة من لحم البقر النيء المقطع قطعاً صغيرة واضف إليه أربعة ملاعق كبيرة من الماء . سخن إلى درجة الغليان ثم امرئه وحالاً تخفض درجة حرارته أضف البنكرياس والصودا واحقن

#### (ملحق ٣٥) حفنة من البيض المضوم

خذ زلال بيضة واحدة وذوبه بثلاثة أضعافه ماء فاتراً ثم أضف البنكرياس والصودا واحقن حالاً . وهذه الحفنة مفيدة جداً

## ثانياً: العلاجات الخارجية

### (١) الحمامات

#### (ملحق ٣٦) الاستحمام في المرض

الحمامات في اصطلاح الطب هي غسل الجسم كله او بعضه بالماء وتقسم باعتبار نوعها الى كلية وجزئية

فالمجامات الكلية تشمل : -

(١) حمام الاسفنجية وهو مسح البدن بالاسفنجية

(٢) التقطيس

(٣) الرش

(٤) حمام الملاة • وهو الاف بللامة مبلولة بالماء

(٥) الحمام البخاري

(٦) الحمام الدوائي (يتكون من الحرجل والنشاء والصودا والملح والكبريت والنخالة ومضادات الفساد)

والحمامات الجزئية تشمل : -

(٧) حمام القدمين

(٨) الوضعيات الرطبة

وتقسم الحمامات ايضاً باعتبار حرارتها كالتالي : -

(١) حمام قارس (بارد جداً) حرارة من ٤٠° - ٤٣° ف =  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{4}$  س

(٢) « بارد قليلاً » ٢١° - ٧٠° ف =  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{2}{3}$  س

(٣) « فاتر » ٣٢° - ٩٠° ف =  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{2}{3}$  س

(٤) « ساخن » ٣٢° - ٩٠° ف =  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{2}{3}$  س

(٥) « حار » ٣٧° - ١١٠° ف =  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{4}$  س

#### (ملحق ٣٧) حمـامـاـتـ الـاسـفـنجـيـة

هو مسح البدن بالاسفنجية او خرقه مبلولة قليلاً او كثيراً تبعاً لمقتضى الحال .  
ويستعمل في الصحة والمرض على السواء

اما الطريقة التي يمسح بها العليل بالاسفنجية فهي ان يعرى من الثياب ويوضع بين احر امين ل الوقاية من البرد ثم يمسح بدنه بالماء مبتدئاً باليدين فالوجه فالرأس فالعنق فالصدر فالظهر فالبطن فالرجلين وكما مسح جزء من اجزاء الجسم المذكورة ينشف حالاً قبل ان يبدأ بالجزء الاخر

ويستعمل لذلك الماء الفاتر او البارد قليلاً وكلها نافعه لخفيف الحمى . على انه اذا كانت حرارة الجسم بالغة درجة ٤٠° س فـا فوق فالافضل ان يحتم بالماء البارد لا الفاتر ولا يغطي في اثناء ذلك على الاطلاق بل يكفي ان يفرش تحته احرام صوف وتحت الاحرام ملاة مشمع (مكتوس)

ومسح بدنه بحرقة او اسفنجية كبيرة بعد يدها او تشيعها بالماء جيداً ويكسر كل ساعتين مرة . ولا يجوز ان تطول مدة الاستحمام اكثر من عشر دقائق  
ويضاف الى ماء الحمام نحوربع او النصف سير توقي او كونياك واذا كان لعليل يعرق بكثرة وخف عليه من تقرح الايتين لطول مكثه في الفراش فيضاف اليه ايضاً قدر ما يذوب فيه من مسحوق الشبايب (ملحق ٣٨) والشب لا يذوب بالسيربتو وحده

اما الاستحمام بالماء البارد في الجهات التفاطية كالحصبة واماتها فالاولى ان يتولاه الطيب ولا يجوز استعماله الا بعد ظهور التفاط بهاته واما قبل ذلك فيعمول على الماء السخن لانه يسرع ظهوره

#### (ملحق ٣٨) التقطيس

خفف الحمى بتقطيس العليل بالماء السخن مع الاحتراض الكلى على العليل ثلاثة بيرداً او يصب بقشر رزرة متواترة . واكثر ما يكون استعماله في الجهات التفاطية كالحصبة والقرمزية لا سيما في بدء العلة حينها يتأخر ظهور التفاط عن ميعاده او كان

ظهوره غير واضح تماماً • ولا بأس من استعماله أيضاً في بدء الحميات الحادة وهي السريعة الاعراض

ويفيد التقطيع في الماء السخن في الاحوال التي يطلب فيها تعرق العليل وليس بمحاجة ان التعرق على هذه الطريقة يخفف الحرارة المتوسطة ويسكن الاضطرابات المعصية وينبع النزولات والرشحات ويصد حبوم التشنجات العضلية

وبعد عشر دقائق يؤخذ المريض من الماء ويلف حالاً باحرام صوف بـ ١٠° تدفته قليلاً على النار بدون ان يجفف بدنه ثم يضع في الفراش وينظر حيناً فيعرق عرقاً عزيزاً • على انه اذا كان المراد تنويم العليل لا تمريمه فيجب ان ينسف بدنه على اثر انتقاله من الماء

اما في الحميات النفاطية كالحصبة وامثلها قسطنطين المفاطس الساخنة في بدء العلة وذلك في الاحوال التي تتأخر فيها ظهور النفاط الجلدي عن ميراده القانوني كما تقدم الاولى ان يشاور الطبيب

اما التقطيع في الماء القارس او البارد قليلاً فالأفضل ان يتمدد فيه على الطبيب وقلما يستعمل لصغر الاطفال الا اذا كانت الحرارة قوية جداً وذلك بعد ان يجرب المسح بالماء البارد ولا يحصل منه على فائدة ظاهرة

على ان التقطيع في الماء البارد يفيد كثيراً في اواخر سني الحداثة بل هو افضل طريقة معروفة الى هذا اليوم لمعالجة الحمى التيفودية • والأفضل ان لا يغمس العليل في الماء مباشرة بل يوضع في حمام سخن ثم يضاف اليه الماء البارد تدريجياً حتى يصل الى الدرجة المطلوبة من البرودة وهذا ما يسمى في اصطلاح العرب بالحمام التدريجي

والثانية في الماء الحار اي الذي حرارته اعلى من الماء السخن على نحو ما اصلحنا على تسميتها في ١ ملحق (٣٦) فيفيد فقط لاجل تبيه القوى الضعيفة ولا يجوز استعماله الا برأي الطبيب

وكثيراً ما يكون الصافل ضعيفاً من حيث القوى او اطراقه باردة او تفسه ضيقاً من مرض في الرئتين فإذا اغمى في الماء الحار على درجة ١٠٠ - ١١٠ فـ (٣٩ - ٣٨° س) نحو ١٥ دقيقة ثم اخذ من الماء ولف بدنه بششفة بدون ان

يجفف استفاده فائدة كبرى • وقد أحيت هذه الطريقة اطنالاً كثیراً على انه في كثير من الحوادث اضرّ الحمام اخار ضرراً جسماً وفي الغالب يحدث الضرر من الذين يتولون امام العليل بسبب اغفالهم قوانین المطافة بحيث يدبرون العليل ويقطبونه بلا رفق واحتراس تكون الحشونة باعثة على ضرره امانواع المفاطس ففضله (شكل ١٠ صفحه ٣٠)

#### (ملحق ٣٩) حمام الرش (دوش)

يقوم بصب الماء على الجسم من وعاء متقويب فهو بـ ٢٠ كيلوغراماً كالمراشة المستعملة لستي الجنان • ويستعمل له الماء البارد قليلاً في اواخر سني الحداثة فيه المصب وينشط العضل واما الماء البارد جداً فلا يجوز استعماله الا برأي الطبيب

#### (ملحق ٤٠) حمام الملأة

تطوى الملأة (الشرشف على قدر طول الولد من رأسه الى اخره قد يزيد بمقدار ثلثة امتار) بالماء البارد وتفرش بعد عصرها على قطعة مشمع ويلف بها كل جسم العليل ما عدا رأسه ولا بأس اذا تركت قدماه بدون غطاء وذلك لاجل وضع زجاجات سخنة حولهما في الاحوال التي تنخفض فيها حرارة الجسم عن قرارها القانوني في أثناء الحمام ويعرف ذلك من ازرقان الوجه والشفتين

وبعد لف العليل بالملأة المنشورة يجب ان يلف فوقها باحرام صوف جاف ويترك ملفوظاً نحو ساعة اذا نام والا فيؤخذ من الملأة بعد ١٥ دقيقة ويلف حالاً بـ ٢٠° صوف جافه بعد تدفتها قليلاً على النار • يستعمل هذا النوع من الحمامات لاجل التتويم وتسكين الاضطرابات المعصية • ويفيد أيضاً في تخفيف الحمى المتوسطة الا انه يجب عند ذلك ان يكرر عشر دقائق لمدة ساعة حتى تتحصل الفائدة وحمام الملأة الحار يستعمل لاجل التعريف ويكرر كل نصف ساعة

#### (ملحق ٤١) الحمام البخاري

يستعمل لافراز العرق ويقوم باطلاق بخار الماء على الجسم كله وذلك بـ

يُعطى للمريض وهو في فراشه بمقلاة صوف وترفع الملاة عنه بواسطة كرسي حتى يصير كأنه في خيمة صغيرة ثم يغلى الماء في قدر يحصل بانبوب ويوجه طرف الانبوب السائب إلى الفراش ضمن الملاة فينطلق منه البخار وإنمرا جسم العليل كله فيعرق وهذا ما يقال له التهيل العام

#### (ملحق ٤٢) حمام خردي

يضاف إلى ماء المقطس السخن نحو ملعقة كبيرة أو ملعقتين من دقيق الحمرد لكل ٨ لترات ماء وهذا النوع من الحمام أكثر فائدة من حمام الماء الساخن البسيط ولا سما في الأحوال التي يتاخر فيها ظهور النفاط الجلدي في الحصبة والجدري وغيرها من الحميات التفاطية ويستعمل أيضاً لأجل تبييض القوى المنحطة من آية الاصاب وآكثر ما تظهر فائدته في الطفوابة والخدامة

#### (ملحق ٤٣) حمام نثائي

ماء النساء — يحضر على نسبة فنجان صغير من النساء المغلي إلى كل ٨ لترات ماء وينبغي ان يكسر النساء بفركك باليد او يلف بقطعة نسيج ثخين ويعصره جيداً حتى يبرز النساء من خلال النسيج ناعماً فيذوب بهدوء يستعمل لخفيف حرارة الجلد وتسلخته

ويحضر ماء النساء على هذه الطريقة اغسل الجلد او لاحقنه عن طريق المستقيم وينبغي ان يكون ماء النساء كثيناً حتى اذا اخذ بين الاصابع يشعر بذلك زوجة

#### (ملحق ٤٤) حمام صودا

يُحضر على نسبة ملعقة كبيرة من الصودا الى ٨ لترات ماء وفائدته مثل فائدة الحمام النثائي ويجوز ان يمزج الصودا مع ماء النساء

#### (ملحق ٤٥) حمام ملح

يُحضر على نسبة اربعة ملاعق كبيرة من ملح الطعام الى ٨ لترات من الماء البارد

أو الفاتر بعد نهاية الاستحمام ويفرك البدن في كأ كافياً بمنشفة خشنة يستعمل لقوية الجسم وخصوصاً للأولاد المصاين بداء الكاح

#### (ملحق ٤٦) حمام كبريتني

يحضر على نسبة جرام واحد من البوتاسي المكبرت الى ٨ لترات ماء وبحسب ان يكون المقطس من الخشب او الزنك المدهون يستعمل في الروماتزم المزمن المعروف بداء المفاصل ويفيد ايضاً في بعض الاصراض الجلدية

#### (ملحق ٤٧) حمام الرضة (النخالة)

يزج كمية وافية من الرضة لجعل الماء ميسياً مثل اللبن تقريباً او يوضع نحو رطل مصرى (٩٦ درهماً) من الرضة في قطعة قاش وتغلق على النار نحو ربع ساعة حتى تدخل جيداً ثم يضاف المحلول إلى مياه المقطس حتى يصير لونه لبنياً يستعمل غسولاً في بعض امراض الجلد

#### (ملحق ٤٨) حمامات مطردة

(انظر ملحق ٩٥)

#### (ملحق ٤٩) حمام قدمي

يحضر باغلاء ملء ملعقتين كبيرتين من دقيق الحمرد في ٨ لترات ماء وله فائدة عظمى في الرشوفات والتزوّلات الصدرية وتحمم قدما العليل في غرفة دافئة وتلف باحرام صوف حالاً تخرج قدماه من الماء

#### (ملحق ٥٠) الوضعيات او الكادات الرطبة والجافة

أولاً : الكادات الفاترة — تؤخذ قطعة نسيج عتيق وتطوى على ثلاث مرات ثم تتمس بالملاء الفاتر وتوضع على الجزء المراد معالجته من الجسد وبعد ذلك تعطى بورق زيتني وترتبط

تُسْعَمِل لِتَحْفِيفِ الْأَلْهَابِ فِي وِجْهِ الْحَلْقِ وَامْتَالِهِ

نَائِيًّا: الْكَمَادَاتُ الْحَارَةُ — تَطْوِي قَطْعَةً نَسِيجٍ عَيْنِقَ على ثَلَاثَ مَرَاتٍ وَتَقْمِسُ فِي الْمَاءِ الْفَالِيِّ ثُمَّ تُؤَخَذُ عَلَى مَشْفَةٍ وَتَعْصَرُ وَتُوَضَّعُ عَلَى الْمَكَانِ الْمُقْصُودِ مَعَالِجَتِهِ . وَقَبْلِ استِعْمَالِهَا يَجِدُ عَلَى الْمَرْضَةِ أَنْ تَضَعَهَا عَلَى خَدِّهَا ثَلَاثًا تَكُونُ سَخْنَةً كَثِيرًا فَتُحْرِقُ الْعَلِيلَ . وَيَنْبَغِي أَنْ تَغْطِي بُورْقَ ذِيْقَيِّ وَفَوْقَ الْوَرْقِ مَشْفَةً جَافَةً مَطْوِيَّةً عَلَى مَرْتَبَتِينَ وَتَغْيِيرُ كُلِّ نَصْفِ سَاعَةٍ . تُسْعَمِل لِتَسْكِينِ الْأَلْمِ

ثَالِثًا: الْكَمَادَاتُ الْحَارَةُ الْجَافَةُ — تَقْوِيمُ بُوْضُ الزَّجَاجَاتِ السَّخْنَةِ أَوْ بِاحْمَاءِ الْقَرْمِيدِ أَوِ الرَّمْلِ أَوِ الرَّمَادِ عَلَى النَّارِ وَتَوْضِعُهُ فِي كِيسٍ

تُسْعَمِلْ حَوْلَ الْقَدْمَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لِأَجْلِ تَتِيهِ الْقَوَى وَرَدِ الْحَرَارةِ إِلَى الْجَسمِ إِذَا كَانَتْ مَتْخَضَةً عَنْ قَرَارِهَا الطَّبِيعِيِّ أَوْ كَانَتِ الْأَطْرَافُ بَارِدَةً فِي فَقْرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ

رَابِعًا: الْكَمَادَاتُ الْبَارِدَةُ — يَطْوِي الْمَنْدِيلَ عَلَى ثَلَاثَ مَرَاتٍ وَيَفْمِسُ بِالْبَارِدِ أَوِ الْمَثْلُوجِ الْمَضَافِ إِلَيْهِ قَدْرَهُ سِيرَتِهِ ثُمَّ تَوْضِعُ عَلَى الْمَكَانِ الْمُقْصُودِ وَتَكْرَرُ كُلُّ دِقْقَيْنِ حَلَّا تَسْخَنُ أَوْ يَصْبَرُ الْمَاءُ عَلَيْهَا قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى تَحْفَظُهَا رَطْبَةً وَبَارِدَةً وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَغْطِي

تَفِيدَ كَثِيرًا فِي الْأَلْهَابَاتِ الْمَوْضِعِيَّةِ كَالصَّدْعِ وَالْوَنْوَهِ وَفِي وِجْهِ الرَّأْسِ فِي الْحَيَاتِ

## (٢) الْلَّصْقُ وَاللَّبْخُ وَاسْبَاهُهُمَا

### (ملحق ٥١) الْلَّصْقُ

تَخْسِرُ الْلَّصْقُ مِنْ بَزْرِ الْكَتَانِ أَوِ الدَّقِيقِ أَوِ الْخَبْزِ أَوِ الْزَّرْدَةِ أَوِ الْفَيْحَمِ كَمَا يَسِيَّأُ بِالْتَّابِعِ

وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْلَّصْقُ سَخْنَةً وَسِمْكُهَا نَحْوُ قِيرَاطٍ أَوْ أَقْلَى . وَكَمَا كَانَتْ سِمْكُهَا دَامَتْ حَرَارَتِهَا أَكْثَرَ وَلَكِنَّهَا إِذَا وَضَعَتْ عَلَى الصَّدْرِ فَيَجِدُ أَنْ لَا يَكُونُ سِمْكُهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيرَاطٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا تَضَرُّرُ الْعَلِيلِ وَلَا سِيَّا إِذَا كَانَ مَصَابًا بِأَسْرَاضِ الرَّئَيْنِ فَيُضَيِّقُ نَفْسَهُ . وَعَلَى الْمَرْضَةِ أَنْ تَمْتَحِنَ حَرَارةَ الْلَّصْقِ بِوَضْعِهَا عَلَى خَدِّهَا قَبْلِ استِعْمَالِهِ ثَلَاثًا تَكُونُ حَارَةً كَثِيرًا فَتُؤَلِّمُ الْعَلِيلَ . وَيَجِدُ أَنْ تَوْضِعَ الْلَّصْقَ تَدْرِيْجًا وَلَيْسَ دَفْعَةً

وَاحِدَةً . إِذَا صَنَعَ الْلَّصْقَ وَأَنْواعُهُ فَهُوَ كَيْأَنِي فِي الْمَلَحَقَاتِ التَّالِيَّةِ

### (ملحق ٥٢) لَصْقُ بَزْرِ الْكَتَانِ

هَذِهِ الْلَّصْقَةُ مِنْ أَفْدَى أَنْواعِ الْلَّصْقِ الْمُعْرُوفَةِ . وَطَرِيقَةُ صَنَاعَتِهِ أَنْ تَسْخَنَ مَقْدَارًا كَافِيًّا مِنِ الْمَاءِ فِي وَعَاءٍ مِنِ الصَّفِيفِ أَوِ الرَّزْنَكِ الْمَدْهُونِ إِلَى درَجَةِ الْغَلِيَانِ تَقْرِيْبًا وَتَضَيِّفُ إِلَيْهِ دَقْيِقَ بَزْرِ الْكَتَانِ تَدْرِيْجًا . وَفِي أَنْسَاءِ اسْتِفَافِهِ يَجِدُ أَنْ تَحْرِكَهُ دَائِمًا بِاللَّعْقَةِ حَتَّى يَمْتَزِجَ بِالْمَاءِ حَيْدًا وَيَصِيرُ قَوَامُهُ مِثْلَ قَوَامِ الْعَجِينِ الرَّخْوِ . ثُمَّ تَمْتَدِ الْلَّصْقَةُ عَلَى قَطْعَةٍ نَسِيجٍ رَقِيقٍ وَطَطْوِيَّ مِنْ جَانِبِهَا وَتَغْطِي بِهِ تَنْدِيلَ عَيْنِقِهِ وَبَعْدِ ذَلِكَ تَوْضِعُ عَلَى الْمَكَانِ الْمُقْصُودِ وَتَقْطُلُ بِالْوَرْقِ الْزَّيْبِيِّ وَتَرْبِطُ رِبَطًا خَفِيًّا . وَيَحْسَنُ أَنْ يَضَافَ إِلَيْهَا قَلِيلٌ مِنِ الْزَّيْتِ لِكِي يَحْفَظَهَا رَطْبَةً وَتَغْيِيرُ كُلِّ بَعْضِ سَاعَاتٍ وَبَقْلِ استِعْمَالِهَا يَجِدُ أَنْ تَمْتَحِنَ سَخْوَتَهَا بِوَضْعِهَا عَلَى خَدِّهِ ثَلَاثًا تَكُونُ سَخْنَةً كَثِيرًا فَلَتَنْزَعُ الْعَلِيلُ

### (ملحق ٥٣) لَصْقُ الدَّرَدَارِ

تُؤَخَذُ مِنْ قَشْرِ شَجَرِ الدَّرَدَارِ وَتُصْنَعُ مِثْلَ لَصْقِ بَزْرِ الْكَتَانِ

### (ملحق ٥٤) لَصْقُ النَّدْرَةِ

تُصْنَعُ مِنْ النَّدْرَةِ الصَّفِيرِاءِ بَعْدِ سَلْقَهَا وَسَخْنَهَا وَلَكِنْ لَا تَفِيدُ فَائِدَةً بَزْرِ الْكَتَانِ

### (ملحق ٥٥) لَصْقُ بَزْرِ وَلِينِ

يُوَضَّعُ فِي الْلَّبَنِ قَدْرٌ كَافِيٌّ مِنِ الْخَبْزِ الْمُفْتَوَّتِ وَيَسْخَنُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَلِينَ الْخَبْزِ

وَيَصِيرُ فِي القَوَامِ الْمُطْلُوبِ ثُمَّ يَدْعُ عَلَى قَطْعَةٍ شَاشِ سَمِيكَ . وَيَقْوِيمُ الْمَاءَ مَقْمَمِ الْلَّبَنِ

### (ملحق ٥٦) لَصْقُ الرَّضَةِ (النَّخَالَةِ)

تُوَضَّعُ النَّخَالَةُ فِي كِيسٍ مِنِ الْفَانِيلَا وَيَفْمِسُ فِي الْمَاءِ الْفَالِيِّ ثُمَّ يَعْصَرُ بِالْمَشْفَةِ .

تُسْعَمِلُ عَوْضًا عَنْ لَصْقِ بَزْرِ الْكَتَانِ فِي وِجْهِ الْبَطْنِ حِينَما يَكُونُ الْأَلْمُ شَدِيدًا وَلَا يَحْتَمِلُ الْعَلِيلُ الْلَّصْقَةَ التَّقْلِيَّةَ

### (ملحق ٥٧) لَصْقُ حَشِيشَةِ الدِّينَارِ

تُصْنَعُ مِثْلَ لَصْقِ النَّخَالَةِ وَلَا مُنْزِيَّةٌ لَهَا عَلَيْهَا سُوَى أَنْهَا أَخْفَى

( ملحق ٥٨ ) لصقة النشاء

يؤخذ النشاء المغلي سخناً وبعد على قطعة نسيج ويوضع مباشرة على الجلد بدون غطاء ينهمماً و تستعمل لخفيف هيجان الجلد في بعض امراضه

( ملحق ٥٩ ) لصقة خردل

انظر ( ملحق ٦٥ )

( ملحق ٦٠ ) لصقة فحم

مزج لصقة بزركن بمقدارها من دقيق الفحم الناعم ثم يرش على وجهها من الدقيق المذكور وتستعمل في الحروق والقرح الكريهة الرائحة

( ملحق ٦١ ) لصقة للصدر والظهر

تؤخذ قطعة من نسيج المصيلينا او التيل يكون طولها كافياً ليحيط بالصدر والظهر من الجانب الواحد الى الآخر وعرضها بعد ان تطوى على مرتين كافياً لتفطية الصدر من الاصدال السفلي الى عظم الرقبة ثم تتم اللصقة وهي سخنة على النصف الاسفل منها ويطوى فوقها الصدر الآخر وتجعل الحافة المفتوحة الى الاعلى والمسدودة الى الاسفل حتى لا تسقط اللصقة منها ثم تلف بورق زيتى ويجب ان تكون اللصقة الجديدة مجهزة قبل ان تزرع القديمة عن صدر العليل

وإذا كانت اللصقة من النخالة فيصنع لها كيس من النسيج السابق الذي على قدر مساحة الصدر والظهر كما تقدم شرحه ويكون له فتحة صغيرة من جانب واحد لاجل ادخال النخالة فيه ثم يغمس بالماء الغالي ويضغط عليه بعد ذلك براحة اليد فوق منشفة حتى يرش الماء وتصير اللصقة متساوية في جميع جهاتها وتوضع على الصدر والظهر عند ما تبلغ الدرجة المطلوبة من الحرارة وتكرر كل بضع ساعات بتغييرها تانية في الماء الغالي بدون ان تغير النخالة

تستعمل في التبؤونيات اي التهاب الرئتين واحياناً تقييد فالدورة كبرى اذا احكت

لام تدبرها واحتضرت من تعرض العدل للبرد

( ملحق ٦٢ ) كادات مضادات الفساد

خذ قطعة شاش واجملها بضعة طبقات ثم انعمها في محلول مضادات الفساد سخناً ( ملحق ٧٥ ) وضمه بعد عصرها على الجرح ثم غطتها بورق زيتى واربط بالفافة شاش

( ملحق ٦٣ ) كادات البر بنثينا

نؤمن قطعة من الفانلا في الماء الحار ثم تنصر ويرش عليها من زيت التربنتينا نحو ملعة صغيرة لكل قدم مربع من الفانلا وتوضع على الصدر نحو ساعة او ساعتين حتى يظهر فلها على الجلد وينبئ ان تعطى بورق زيتى وفوق الورق منشفة حافظة احتراساً من البرد وتفيض هذه الكادات في انتفاخ البطن في الحمى التيفودية

( ملحق ٦٤ ) لصقة عطرية

تُفيد جداً في المرض ولا سيما في الاشهر الاولى من الطفولة وطريقه صنعها على ما يأتي  
تؤخذ مقادير متساوية من كل من مسحوق الزنجيل وكبس القرنفل والقرفة وسائل البارات ويوضع الجميع في كيس ثم يغمس في سيرتو او كونياك سخن جداً ويوضع على بطن العليل فيسكن المرض وتماد اللصقة بتغييرها تانية على نحو ما تقدم ذكره الى ان تخسر البارات قوتها فعندها تبدل بواحدة جديدة

( ملحق ٦٥ ) كاد الخردل - لصقة خردل

يصنع على نسبة جزء واحد من مسحوق الخردل الى ٣ او ٤ اجزاء ولصغار الاطفال حصة اجزاء من الدقيق ( الطحين ) او مسحوق بزركن  
امزج بالماء الغالي وحركه بالملعقة حتى تصير اللصقة في القوام المطلوب ثم تتم على

شاش أو مصلينا وتوضع على الجلد مباشرة وإذا كانت تحرق كثيراً فيوضع بينها وبين  
الجلد قطعة قماش وترك حتى يحمر الجلد تحتها

(ملحق ٦٦) كادات البار

جوز الطيب — يستعمل في البرونشيت ووجز الزور وطريقة صنعها هي أن  
ندهن قطعة شاش بدهن الفم أو شحم الخنزير ورش عليها كفاية من مسحوق البار  
الأسود أو جوز الطيب وتوضع على الصدر في البرونشيت أو حول العنق في وجع  
الزور وترك بضعة أيام

(ملحق ٦٧) صدرة قطن

يُستعمل بأمر الطبيب في التهاب الرئتين وذلك بان تحيط صدرة من نسيج  
المصلينا تقفى الصدر والظهر وثبتت من جانبها وعلى الكتفين بالدبابيس ثم توضع  
بين الصدرة والجلد طبقة سميكة من القطن

(٢) المرهم والمرwoxات

(ملحق ٦٨) مرهم البزموت والزنك

|                   |               |       |
|-------------------|---------------|-------|
| تحت نترات البزموت | $\frac{1}{3}$ | грамм |
| أكسيد الزنك       | $\frac{1}{3}$ | "     |
| لانولين           | $\frac{1}{3}$ | "     |
| فاسلين            | $\frac{1}{3}$ | "     |

(ملحق ٦٩) مرهم للحزاز

|              |    |       |
|--------------|----|-------|
| كبريت        | ٢  | грамм |
| مرهم القطران | ٤  | "     |
| شحم بنزويني  | ٣٠ | "     |

فرك به للحزاز حيداً نحو ثلاثة مرات يومياً

(ملحق ٧٠) مرهم البوريك

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| Boric acid, | ٤  | جرامات |
| Vaseline,   | ١٥ | "      |
| Lanolin     | ١٥ | "      |

(ملحق ٧١) مرهم البوريك والزنك

|               |    |       |
|---------------|----|-------|
| Boric acid    | ٢  | грамм |
| Oxide of zinc | ٢  | "     |
| Lanolin       | ١٥ | "     |
| Vaseline      | ١٥ | "     |

(٤) محلائل وامزجة

(ملحق ٧٢) زيت كربوليكي (فينيكي)

|                    |    |       |
|--------------------|----|-------|
| Pure carbolic acid | ٢  | грамм |
| Olive oil          | ٦٠ | "     |

يلصق على الزجاجة ورقة مكتوب عليها «سم»

(ملحق ٧٣) غسول الغلسرين والتنيك لحملة الثدي

|                          |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| Glycerite of tannic acid | ٣٠ | грамм |
| Water                    | ٣٠ | "     |

ندهن حملة الثدي بعد كل رضاع

(ملحق ٧٤) غسول البزموت

|                     |    |       |
|---------------------|----|-------|
| Bismuth sub nitrate | ٣٠ | грамм |
| Castor oil          | ٣٠ | "     |

يزعم مثل سابقه

|   |                    |              |        |
|---|--------------------|--------------|--------|
| Glycerin,   |                    | ٤            | كاسرين |
| Water   |                    | ٢٠           | ماء    |
| يُستعمل في التهابات الفم والقلاع (القالوع) ويكرر مراتاً في اليوم        |                    |              |        |
| (ملحق ٨٠)   | غسول للعين         |              |        |
| Boric acid  | ١ جرام             | حامض بوريك   |        |
| Camphor Water   | ٦٠                 | ماء الكافور  |        |
| تفصل العين من الداخل أو تبلل به قطعة شاش وتوضع على العين مراتاً متواتلة |                    |              |        |
| (ملحق ٨١)   | غرغرة قابضة        |              |        |
| Tannic acid   | ١ ملعقة صغيرة      | حامض التينيك |        |
| Water   | ٢ كوبية            | ماء          |        |
| ذوب واستعمل غرغرة في التهاب الزور والاجزاء المجاورة له                  |                    |              |        |
| (ملحق ٨٢)   | محلول حامض التينيك |              |        |
| Tannic acid,  | ٨ جرامات           | حامض تينيك   |        |
| Glycerin,   | ٣٠                 | غلسرин       |        |
| Water   | ٦٠                 | ماء          |        |
| يحقن به الانف أو يتنشقه العليل في الحوادث التي يصعب فيها قطع الدم       |                    |              |        |
| من الانف بالوسائل المألوفة  |                    |              |        |
| (ملحق ٨٣)   | غسول الشب الاييض   |              |        |

يقطّن أو يمسح به الجسم لأجل توقيف افراز العرق الفزير ويفيد أيضاً لمنع القرح في الاليتين في الاماراض الطويلة وتعريف بقروح الفراش

|  |                                |                  |
|--|--------------------------------|------------------|
| Boaic acid   | ١٥ جراماً                      | حامض بوريك       |
| Water  | ٣٥٠                            | ماء              |
| يُستعمل لفصل الجروح ضد الفساد                                      |                                |                  |
| (ملحق ٧٦)  | محلول حامض الكربوليک (الفينيك) |                  |
| Pure carbolic acid   | ٢ جرام                         | حامض كربوليک نقى |
| Water  | ١٨٠                            | ماء              |
| يُستعمل مثل سابقه ويكتب عليه « سم »                                |                                |                  |
| (ملحق ٧٧)  | محلول السلياني                 |                  |
| Corrosive Sublimate  | ٧ سنتكرامات                    | سليني            |
| Tartaric acid  | ١٤٢                            | حامض طرطريك      |
| Distilled Wter   | ٢٤٠ جراماً                     | ماء مقطر         |
| يُستعمل مثل سابقه ويكتب عليه « سم » ويختبر من تغميس المعادن فيه    |                                |                  |
| واسهل طريقة تحضير هذا محلول هي ان تشتري من الصيدلية اقراساً من     |                                |                  |
| السليني كل قرض قدر نصف جرام يذوب في ٦ لترات ماء حتى يصير محلول على |                                |                  |
| نسبة ٦ - ٣٠٠٠  |                                |                  |
| (ملحق ٧٨)  | محلول النساء والبوريك          |                  |

يذوب النساء في محلول البوريك (ملحق ٧٥) على الطريقة التي تقدم شرحها في (ملحق ٤٣)

(ملحق ٧٩) محلول البورق والغلسرین

|                    |             |           |
|--------------------|-------------|-----------|
| Borax              | ١ جرام      | بورق      |
| Tincture of myrrh, | ٢ صبغة المر | صبغة المر |

انفع نحو ٢ أو ٣ ساعات واحقن في المستقيم قدر ما يتحمل الولد

(٥) المساحيق (البودر)

(ملحق ٨٩) مسحوق الكافور المركب

|                |             |          |
|----------------|-------------|----------|
| Camphor,       | كافور       | ٤ جرامات |
| Oxide of Zinc, | اكسيد الزنك | ١٥ »     |
| Starch,        | نشاء        | ١٥ »     |

يصنع منه مسحوق (بودر) ناعم جداً

(ملحق ٩٠) مسحوق البوريك والزنك

|               |             |           |
|---------------|-------------|-----------|
| Boric acid    | حامض بوريك  | ١٥ جراماً |
| Oxide of zinc | اكسيد الزنك | ١٥ »      |

يصنع منه مسحوق (بودر) ناعم جداً

(ملحق ٩١) البزموت والزنك

|                      |                   |           |
|----------------------|-------------------|-----------|
| Bismuth sub nitrate, | تحت نترات البزموت | ١٥ جراماً |
| Oxide of zinc        | اكسيد الزنك       | ١٥ »      |

يصنع منه مسحوق ناعم جداً وتستعمل هذه المساحيق للتجفيف في الاكزما  
والتسخيط

(٦) المواد المطهرة او مضادات الفساد

(ملحق ٩٢) حامض الكربوليك (الفينيك)

|                |                  |            |
|----------------|------------------|------------|
| Carbolic acid, | حامض كربوليك نقى | ١٩٤ جراماً |
| Glycerin,      | غليسرين          | » ١٢٠      |
| Water          | ماء              | ٤ لترات    |

(ملحق ٨٤) غسول مبرّد

|                    |                  |        |
|--------------------|------------------|--------|
| Pure carbolic acid | حامض كربوليك نقى | ٢ جرام |
| Ether              | »                | ٨      |
| Alcohol            | الكحول (سيرو)    | ١٨٠ »  |

يوضع منها على الاجزاء المصابة لتلطيف الحرارة الموضعية — يكتب  
على الزجاجة «سم»

(ملحق ٨٥) غسول للفتشة غرة (١)

|                              |                     |          |
|------------------------------|---------------------|----------|
| Compound tincture of benzoin | صبغة الجاوي المركبة | ٤ جرامات |
| Glycerin                     | غليسرين             | » ٢      |
| Rose Water                   | ماء الورد           | » ٩٠     |

(ملحق ٨٦) غسول للفتشة غرة (٢)

|                    |                    |          |
|--------------------|--------------------|----------|
| Borax              | بورق               | ٤ جرامات |
| Dilute acetic acid | حامض الخليل المخفف | » ٢      |
| Rose Water         | ماء الورد          | » ١٥     |

(ملحق ٨٧) حقنة للتنشجات العصبية (هزة الحيط)

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| Bromide of potash  | برومور البوتاس | ٦٠ ستركراماً |
| Hydrate of chloral | كلورال         | » ١٨         |
| Milk of asafetida  | لبن الحليبت    | ٦٠ جراماً    |

يحقن الطفل الصغير بملعقة كبيرة او ملعقتين في المستقيم وتكرر بعد نصف ساعة  
عند الحاجة

(ملحق ٨٨) للدود الخطي

|               |                  |                       |
|---------------|------------------|-----------------------|
| Quassia chips | خشب المر (كواسي) | ٣٠ جراماً (فنجان شاي) |
| Water         | ماء              | » ٣٥٠                 |

يتألف من هذا الدواء محلول على نسبة ١ - ٥٠٠ يستعمل لتطهير الصحفون والثياب وميزان الحرارة والأواني المعدنية ويدى المريض . فالثياب تغمس في محلول المذكور بضع ساعات ثم تصر وتحوذ على طبق مغطى وتللى على النار - ويجوز أيضاً أن تغمس فيه الملاة التي تعلق على باب غرفة المريض

(ملحق ٩٣) كاوريديد الجير (الكلس)

|              |     |        |
|--------------|-----|--------|
| كلوريد الجير | ١٢٠ | جراماً |
| ماء (رائق)   | ٤   | لترات  |

يؤخذ مقدار نصف لتر أو لتر واحد ويمزج جيداً بالبراز والقيء وجميع المفرزات في الحمى التيفودية وغيرها من العلل العفنية وتترك في الوعاء نحو ٣ ساعات ثم تفرغ في الكنيف أو في حفرة في الأرض ويرد فوقها التراب

(ملحق ٩٤) كاوريينات الصودا

|                        |     |        |
|------------------------|-----|--------|
| محلول كاوريينات الصودا | ١٨٠ | جراماً |
| ماء كافية لعمل         | ١   | لتر    |

يستعمل لتطهير الأيدي وأواني الطعام (ماعدا الفضة) ألحانه ولا يناسب استعماله لتطهير الثياب مثل ملحق ٩٢ على أنه يمكن استعماله لتفعيل الملاة التي توضع على الباب في غرفة المرض

(ملحق ٩٥) حمام مطهر أو مضاد للفساد

يؤخذ محلول ملحق ٩٢ ويضاف إليه قدره ماء أو يؤخذ محلول ملحق ٩٤ ويضاف إليه أربعة أضعافه ماء ويستعمل لاستحمام الأولاد على اثر هجوم الحمى القرمزية وغيرها من الامراض العفنية

(ملحق ٩٦) محلول السليماني غرة (١)

|            |     |        |
|------------|-----|--------|
| سليماني    | ٦٠  | جراماً |
| حامض طرريك | ٧٠٠ | »      |

|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| Carminate of soda | ٥٠ | ستكراماً |
| Water             | ١  | لتر      |

يضاف مقدار ٤ لترات ماء إلى كل ١٢٠ جراماً من المزيج المذكور (١ - ٥٠٠) ويستعمل لغسل أرض الغرفة والخشب الخـ ما عدا الأواني المعدنية . ويجوز أن تغمس فيه الثياب نحو ساعتين على نسبة ١٥ جراماً من محلول المذكور إلى ٤ لترات ماء . وتبـلـ في ملاة الباب على نسبة ٦٠ جراماً من محلول المذكور إلى ٤ لترات ماء . أما كارمينات الصودا فتجعل محلول ملوثاً تميـزـه على أنه مادة سامة

(ملحق ٩٧) محلول السليماني غرة (٢)

في الصيدليات أفراد ملوثة من السليماني وفي كل قرص نحو نصف جرام فإذا ذوبـ في لتر ماء يكون محلول على نسبة ١ - ٥٠٠ ويمكن استحضاره على أي نسبة شـتـ وهو أهون من ملحق ٩٦

(ملحق ٩٨) بخار مطهر أو مضاد للفساد

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| pure carabolic acid, | ٣٠  | جراماً     |
| Oil of eucalyptus,   | ٣٠  | »          |
| Turpentine           | ٢٥٠ | تربيـتـينا |

يوضع نحو ملعقتين كبارتين من المزيج المذكور في وعاء قليل الفور يحتوى على لتر ماء ويترك الوعاء دائماً على النار في غرفة المريض في الدفريـا حتى يتـبـخـ الماء ويرطبـ هوـاءـ الغـرـفـةـ ويـطـهـرـهـ منـ جـرـائـيمـ المـرـضـ . ويـجـدـ دـائـماـ بـحـيثـ يـبـقـيـ الـبـخـارـ مستـمرـاـ إـلـاـ وـنـهـارـاـ عـلـىـ درـجـةـ خـفـيـةـ وـمحـوـلـةـ وـمحـرـسـ منـ انـيـاحـهـ هـيـبـ النـارـ رـأـساـ

(ملحق ٩٩) مطهرات جافة

يؤخذ مقدار وافر من كبريتات الحديد أو كلوريد الجير ويوضع في الكنيف واقية المياه الحـ

(ملحق ١٠٤) مزيج للذبحة (التهاب الحنجرة)

|                    |                 |         |
|--------------------|-----------------|---------|
| Syrup of ipecac    | شراب عرق الذهب  | ١٠ جرام |
| Bromide of potash, | برومور البوتاسي | ٢       |
| Hive's syrup,      | شراب هيف        | ٤       |
| Cinnamon Water     | ماء القرفة      | ٥٠      |

ملعقة صغيرة كل ساعة أو ساعتين على اربع جرعات لابن سنتين

(ملحق ١٠٥) ترياق جوناس ضد التسمم

|                    |              |           |
|--------------------|--------------|-----------|
| Calcined magnesia, | منازيد مكمله | ٦٠ جراماً |
| Animal charcoal,   | فحم حيواني   | ٣٠        |
| Water              | ماء          | ٣٥٠       |

ثم يضاف اليه :-

|                   |                   |    |
|-------------------|-------------------|----|
| Monsel's solution | محلول موسل الحديد | ٦٠ |
|-------------------|-------------------|----|

يُمزج المزيجين معاً من جماً تماماً بهز الزجاجة هزّاً قوياً ويعطى العليل فجعاً صغيراً ويكرر مراراً

(ملحق ١٠٦) انقياثات

(١) ملعقة صغيرة من شراب عرق الذهب تكرر كل ١٥ دقيقة

(٢) كمية ماء سخن مشبعة يملح الطعام

(٣) نصف ملعقة صغيرة من الشب الإيض ممزوجة بالشراب او الدبس

(٤) ملعقة صغيرة من دقيق الخردل في كمية كافية من الماء السخن اذا لم تفع المقياثات السابقة الذكر

وابها : تحدير الجرع ومواد شتى

(ملحق ١٠٧) المسيد او التكيس

هو من الفاظ العامة ويعرف في اللغة بالتفمير وهو جنس اقسام الجسد العضلية اما بالدلك او بالعصر او بالتربيت والتدليس والدعك والفرك الخ وذلك براحة اليد بعد

ثالثاً: العلاجات الداخلية

(ملحق ١٠٠) الصودا والنعناع

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| بيكاربونات الصودا           | ٢ جرام |
| روح الشادر المطري           | ٢      |
| ماء النعناع - كفاية لعمل ٦٠ | »      |

ملعقة صغيرة في ماء سخن لابن سنة واحدة يشربها في أثناء المرض

(ملحق ١٠١) مزيج قلوبي مليء

|                     |        |
|---------------------|--------|
| بيكاربونات الصودا   | ٢ جرام |
| شراب الرواند المطري | ١٦     |
| ـ السنا             | » ١٦   |
| ـ البرقال           | » ٣٥   |

يؤخذ ملعقة صغيرة ثلاث مرات في اليوم لابن سنة واحدة وتزداد الجرعة او تقلل حسب فعلها

(ملحق ١٠٣) مزيج الطباشير والبزموت

|                   |          |
|-------------------|----------|
| تحت نترات البزموت | ٦ جرامات |
| ـ الطباشير        | ٦٠       |


ملعقة صغيرة كل ثلاثة ساعات لابن سنة واحدة واقل من ذلك بشيء قليل لمن كان دون السنة من العمر . يستعمل في الاسهال

(ملحق ١٠٣) مزيج الحمي

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| روح ملح البارود الحلو | ٦ جرامات |
| ـ شرات البوتاسي       | ٢        |
| ـ شراب الليمون        | ١٦       |
| ـ ماء كفاية لعمل      | ٦٠       |

ملعقة صغيرة كل ساعتين او ثلاثة ساعات لابن سنة واحدة لتخفيض الحمى

او كونياك وكان عند الام مكيال للدميات فلا يأس من استعماله على حساب النقطة  
نصف منم . وهذا الفرق الكائن بين الماء والنقطة في الوزن مهم جداً ولا يجوز  
اغفاله على الاطلاق



( ش ٤ ) قصارہ

اما الجرارات الكبيرة فستعمل لها الملاعن والفناجين وهذا الاصطلاح لا يخلو من التقصي وذلك لاختلاف الملاعن والفناجين في الحجم . والافضل ان يستعمل لذلك المكال (شكل ٤٥) بحيث اذا وصف الطبيب الدواء باللغة او غيرها كان المكال المذكور احسن واسطة لاضططاعه على العام كاسلفنا ذكره في الجدول



( ۱۰۹ ) ملحق

## جدول تحديد الجرع بحسب الاعمار

يختلف مقدار الجرعة باختلاف عمر الطفل وزنه  
وطوله وطبيعة المرض ونوع الدواء . وفي الواقع لا يوجد  
استعمال الجرع ضابط او قانون يصح السير بموجبه بانتظام  
تام وذلك لأن بعض الأطفال لا تؤثر فيهم جرعة الدواء  
الآن إذا كانت كبيرة قدر جرعة الولد البالغ . والبعض الآخر

يستفيدون من جرعٍ صغيرةً جداً . وبناءً على ذلك لا يجوز أن تحدد الجرعة بحسب العمر فقط بل يحسب الطول والوزن والمرض وهذا منوط باختبار الطيب ودقة الاحفظة . وفي الدول الآتى سان الجرعات في اطوار مختلفة من العمر

( انظر الجدول في الصفحة التالية )

دهنها بالزيت أو مادة أخرى دهنية ليسهل مروها على الجلد ، وهو مفيد في كثير من العلل والاسقام العصبية وشلل الاطراف والنفس والضعف العام والامساك المستعصي (انظر صفحة ١٣٠) فتنبه الدورة الدموية ويشعر العليل بالراحة والقوه وقد يمكن ان تقوم الام بهذا العمل بارشاد الطيب

( ملحق ١٠٨ ) جدول لوزن الادوية و كيلها بوجه التقرير في الجدول الآتي بيان مقادير المم والنقط الملاعق والفاتجين والجرامات ونسبتها بعضها الى بعض بوجه التقرير هكذا : — من واحد = نقطة واحدة من الماء او نقطتين من الصبغات والثور كصبغة اليود والوسيك والكونياك الخ

|    |              |   |      |   |                   |
|----|--------------|---|------|---|-------------------|
| ٣٠ | فنجان صغيراً | = | ١٠٠٠ | = | لتر او كيلوغرام   |
| ٢  | ملعقة كبيرة  | = | ٣٢   | = | فنجان صغير (قهوة) |
| ٤  | ملعقة صغيرة  | = | ٦٦   | = | كيرة (شوربة)      |
| ٦٠ | ملعقة صغيرة  | = | ٤    | = | صغيرة (شاي)       |
| ٣٠ | ملعقة بن     | = | ٢    | = | جرام              |

على ان الاطباء يعتمدون في الفالب على النقطة عوضاً عن المتم . وليس بمحافف ان حجم النقطة يختلف باختلاف السائل وسعة الموضع الذي تنزل منه . ولذلك يتبعني ان تستعمل القطارة (شكل ٤٤) وتطلب من الصيدليات وقبل استعمالها يجب ان يتحققها الصيدلي بحيث يبلغ وزن كل ٦٠ نقطة ماء او كل ١٢٠ نقطة من الصبغات والمشروبات الروحية نحو ٤ جرامات كما تقدم في الجدول

(شكل ٤٣) ميكال للميم

|                  |   |
|------------------|---|
| البالغ           | ١ (جرعة كاملة)                              |
| ١٨ سنة           | $\frac{1}{2}$ او $\frac{1}{3}$              |
| ١٢               | $\frac{1}{3}$                               |
| ١٠ سنين          | $\frac{1}{4}$                               |
| ٦ سنين           | $\frac{1}{5}$                               |
| ٤                | $\frac{1}{6}$                               |
| ٣                | $\frac{1}{7}$                               |
| ٢                | $\frac{1}{8}$                               |
| ١ سنة            | $\frac{1}{9}$                               |
| ٩ أشهر           | $\frac{1}{10}$ = $\frac{1}{2}$ جرعة ابن سنة |
| ٦                | $\frac{1}{11}$ = $\frac{1}{3}$ « « «        |
| الولادة - ٣ شهور | $\frac{1}{12}$ = $\frac{1}{4}$ « « «        |

(ملحق ١١٠) بيان جرع الادوية لابن سنة واحدة

يظهر من الجدول السابق (ملحق ١٠٩) ان جرعة ابن سنين تبلغ بوجه التقريب نحو مائة ونصف من جرعة ابن سنة وابن ثلاث سنين نحو مائتين وابن ست سنين نحو ٣٠٠ ملليلترات . وابن ٨ - ١٠ سنين نحو ٤٠٠ ملليلترات .  
اما الجرع التي تحت السنة الاولى فيعتمد فيها على الجدول السابق الذي يحجب الاحتراس من تكرار الايفيون لانه يسبب عادة مضرة في الابناء وكذلك يجب الانتباه الى الفرق بين الملم والنقطة

جرعة الدواء لابن سنة واحدة

|                            |                                |   |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| Antimony, wine             | ٤ - ٢                          | انتيمون + حمره                                    |
| Antipyrin                  | ٣ - ٢                          | انتيپيرين سنتكرامات                               |
| Ipicacuanha                |                                | اييكاك (انظر عرق الذهب)                           |
| Ammonia                    |                                | امونيا (انظر نشادر)                               |
| Belladonna, tincture       | $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$ مم | بلادونا، صبغته                                    |
| Bismuth, sub nitrate       | ٦ - ٣٠ سنتكراما                | بزموت + تحت نزات                                  |
| Bromide, of potash or soda | ٣٥ - ٣                         | برومورالبوتاسي او الصودا                          |
| Brandy                     |                                | برندي (انظر كونياك)                               |
| Pepsin                     | ٦ - ٢                          | بيسين   |
| Squill, comp syrup         | ١ - ٣                          | بصل الفصل + شرابه المركب                          |
| Squill, syrup              | ٥ - ١                          | البسيط  |
| Tannic, acid               | ٦ - ٢                          | نيك + حامض سنتكرامات                              |
| Mux vomica, tincture       | $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$ مم | جوز القيء + صبغته                                 |
| Gin                        | ١٥ - ٥                         | جن  |
| Asafdtida                  | ٤ - ٢                          | حلبيت + حلبيه                                     |
| Iron, citrate              | ٣ - ٢                          | حديد شرات   |
| Iron, reduced              | ٣ - ٢                          | محوال   |
| Iron, syrup of iodide      | ١ - ٣                          | شراب اليودور                                      |
| Iron, tincture             | $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$    | صبغة الكلوريد                                     |
| Digital, tincture          | $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$    | دجال + صبغته                                      |
| Dover's powder             | ٧ - ٣٠                         | دوفر + مسحوقه ميلكرام                             |
| Nitre, sweet pirit of      | ٦ - ٢                          | روح ملح البارود الحلو (معرق) ٦ - ٢                |
| Rhubarb, syrup             | ٢ - ١                          | راوند + شرابه                                     |
| Castor oil                 | ٦ - ٤                          | زيت الخروع  |
| Olive oil                  | ٦ - ٤                          | الزيتون   |
| Calomel                    | ٣ - ٥                          | رُبِّيَّةُ الْحَلْوَ (جرعة واحدة) ٣ - ٥ سنتكرامات |

|                   |                                |                |
|-------------------|--------------------------------|----------------|
| استيلد (انتفيرين) | ٣٢ سنتكرامات                   | اكونيت + صبغته |
| Acetanilid        | $\frac{1}{8} - \frac{1}{4}$ مم |                |
| Aconite, tincture |                                |                |

|                   |                |                       |                                  |
|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| Laudanum          | لودنوم         | صبغته                 | $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{8}$ من |
| Magnesia          | منازيا         |                       | ١٣ - ٣٠ سنتكراماً                |
| Malt extract      | مولت           | خلاصه                 | ١٥ - ١٠ من                       |
| Marophine         | مورفين         |                       | $\frac{1}{2}$ - ١ ميلكراوم       |
| Manna             | من             |                       | ٦٠ - ٣٠ سنتكراماً                |
| Peppermint water  | عناع           | مماوه                 | ٤ - ٢ جرامات                     |
| Port wine         | نبيذ الورت     | (انظر منبهات)         |                                  |
| Sherry            | نبيذ الشري     |                       |                                  |
| Hoffman's anodyne | هوفن           | سائل مسكن             | ١ - ٥ منبات                      |
| Hive's syrup      | هيق            | شراب بصل العسل المركب |                                  |
| Hydrochloric acid | هيدروكلوريك    | حامض مخفف             | ١٠ - ٥ منبات                     |
| Iodide of potash  | يودور البوتاسي |                       | ٩ - ٤ سنتكراماً                  |
| Stimulents:       |                | منبهات                | -                                |
| Brandy            | كونياك         |                       | ٣٠ - ٥ من                        |
| Port wine         | نبيذ الورت     |                       | ٣٠ - ٥                           |
| Sherry            | الشري          |                       | ٣٠ - ٥                           |
| Gin               | جن             |                       | ١٥ - ٥                           |
| Whisky            | وسكي           |                       | ٣٠ - ٥                           |
| Tannic acid       | حامض تينيك     |                       | ٣ - ٦ سنتكراماً                  |
| Wine              | خمر            | (انظر منبهات)         |                                  |

## (ملحق ١١١) صندوق الأدوية

ويقال له الأجزخانة البيطانية يحتوي على بعض الأدوية والادوات الطبية التي لا يستغني عنها في البيت . وينبغي ان يجعل لازجاجات السامة علامه فارقة لتفريح عن غيرها من الزجاجات الغير السامة على نحو ما تقدم تفصيله في غرفة المرض (صفحة ٩٥)


|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Cod liver oil                  | زيت السمك                         |
| Ginger, tincture               | زنجبيل . صبغته                    |
| Salicylate of soda             | سللات الصودا                      |
| Senna                          | سنانكة (مسهل)                     |
| Senna, syrup                   | سنانكة شرابه                      |
| Sulphoric acid ( dilute )      | سلفوريك . حامض مخفف (انظر منبهات) |
| Liquorice,                     | بيوس . مسحوقه                     |
| Magnesia, citrate              | شترات المنازيا                    |
| Citrate of potash              | البوتاس                           |
| Soda, bicarbonate              | صودا . بيكربونات                  |
| Chalk, mixture                 | طباشير . منتجه                    |
| Ipecac, syrup or wine          | عرق الذهب . شرابه او نبيذه        |
| Fowler's solution              | فولر . سائله                      |
| Phenacetin                     | فناستين                           |
| Cinnamon, water                | قرفة . ماوتها                     |
| Cascara sagrada, fluid extract | كسكاره سكرادا . الخلacea السائلة  |
| Chloral                        | كلورال                            |
| Chlorate of potash             | كلورات البوتاسي                   |
| Calomel                        | كاومل (انظر زريق الحلو)           |
| Catechu, tincture              | قاد الهندى . صبغته                |
| Quinine                        | كينا                              |
| Paregoric ( tincture )         | كافور . صبغته المركبة             |
| Kino, tincture                 | كينو .                            |

اما بيان الأدوية الازمة في البيت فهو كا ياتي : -

مكال للهبات والنقط والجرامات • قطارة • حقنة كوشوك سعنها نحو ١٨٠ جراماً اي مقدار ستة فجاجين صغيرة • ميزان صغير لوزن الأدوية • فرشاة من وبر الجمل واحدة صغيرة والآخر كبيرة ذات قبضة طويلة لمداواة الحلق • ملقط لاجل غيار الجروح • مقص • قطن طبي • عدة لفائف شاش عرض الواحدة نحو قيراطين وطوهما نحو ٣ يردادات • مشمع بسيط • قطعة نسج ابيض قديم • ورق زيق او ورق بارافيني • الكحول (سيرتونتي) • وسكي او كونياك • زيت الزيتون • ماء الشادر • تربتنا • خلاصة الهماميل السائلة لاجل الوتؤ • صروخ الصابون لاجل الصدع • صبغة اليود • محلول حامض البوريك (ملحق ٧٥) • مسحوق بزر الكتان • منازيا • فاسلين • زيت الخروع • مرهم الزنك • ماء العناع • صودا • روح ملح البارود الحلو • روح الشادر المطري • برومور البوتاسي يوضع في كل ورقة جرام واحد ونعطي الجرعة حسب العمر (ملحق ١١٠ و ١٠٩) • صبغة الدجتان • شراب هرق الذهب (الإيكاك) • حامض التينيك ضد السموم • سلفات النحاس كل ورقة ١٥ ملليلتر ضد التسمم بعيдан الكبريت • ترياق جونلس ضد السم ١ ملتحق ١٠٥ انتهي

### ٥٥ الخامدة

كان الفراع من طبعه في اليوم الاول من شهر اغسطس (آب) سنة ١٩٠٣  
 المسيحيه • وقد وقع فيه غلطات مطبعية لا يخلو منها كتاب ولا يخفى اصلاحها على  
 القاريء اللذيب والله المسؤول ان يوفقنا الى خدمة الانسانية وتحقيق مصالح بي  
 الانسان آمين



## فهرست الكتاب

( قبل الولادة )

صفحة

١ المقدمة

٣ تدبر صحة الحوامل — امراض الحمل — علامات الخاض — كلة الى  
المولد والمولدة  
١١ تدبر صحة الاطفال والاحاديث

( غوا الاطفال والاحاديث )

١٨ القوة — الحواس — العقل — الاصوات والتكلم — تساطع الطفل على  
وظائف جسده — الوزن — الطول — الصدر والرأس — اليأفوخ —  
الدمع — الاسنان

( الاستحمام والنظافة )

٢٨ حرارة الماء — كيفية الاستحمام بالماء الساخن — الحمام والمعطر —  
الاستحمام بالماء البارد وماه البحر المالح — نظافة الفم — نظافة الاليتين  
والفحذين — نظافة الرأس — نظافة الاسنان

( ثياب الاطفال )

٣٣ كلام عام على انواع الانسجة وازياء الثياب — حزام البطن — الحفاظ —  
الجوارب — القميص — التورة والسلطة — الكبوت — ثياب النوم —  
الطاقة — كيفية الباب الطفل ثيابه — ثياب القصيرة — سروال  
بحذين — حالة الحفاظ — الحذاء — صدرة لاستقبال العاب — مريول  
المبددية — الوان الثياب — تغير الثياب من السنة الثالثة فصاعدآ — حذاء  
كبار الاولاد —

(غذاء الاطفال وطعامهم)

« وتدبر صحة المرض »

٤٥ لب الام — ترتيب اوقات الرضاعة — كيفية الارضاع — تدبر صحة المرض — تدبر الندى وحملته — الفطام القانوني — الفطام الفجائي — الفطام الباكر — الطعام الاصناعي — تطهير حليب البقر — الحامنة الصناعية — الحليب الجمد — الطعام الجلاتيني — ماء زلال اليضن — شاي حم المجل — الطعام المهزوم — الطعام النشافي — الطعام بعد الفطام — الاطعمة الممنوعة

٦٨ نوم الاطفال

(التربية)

٧١ التربية الجسدية — التربية العقلية والادبية

(خدمات الطفل)

٧٢ الحادمة الشهرية — المرض — الحاضنة او المريضة — المرضة القانونية

(غرف الطفل)

٩٠ غرفة المبار — غرفة النوم — غرفة المرض

(تدبر الاطفال والاحاديث في المرض)

٩٦ تعريف الاصطلاحات الطبية

(دلائل المرض)

٩٩ الوجه — الجلد — مركز الجسم — الاشارات — الرأس والصدر — البطن الصراح — السعال — التنفس — النبض — حرارة الجسم —

الاسنان — صرير الاسنان — الرضاع والبلع والشرب — البوال — البراز — الشهوة — القباء

(تمريض الاطفال)

١٠٧ كيفية شرب الادوية — شرب زيت الخروع — الدواء الحامض — جبوب الدواء — جرعة الدواء (ملحق ١١٠ و ١١٩) • تغذية المريض — نوم المريض — غطاء المريض — لباس المريض — غرفة المريض — الحمام الموضعي الكادات السخنة والباردة — الحافظ والحقن — كيفية الحقن — وضعيات الحلق —

(عمل الجهاز الهضمي)

١١٥ الشفة الارتبطة — التهاب الفم — القلاع — البستين — خراج اللهة — التهاب اللوزتين المزمن — مرض المعدة الحاد — عسر الهضم — المزمن — القيء — الاسهال — المغص — الامساك — انسداد المجرى — هبوط المستقيم — الديدان البرقان

(عمل التنفس)

١٣٥ الزكام الانفي — التهاب الخجولة — التهاب الشعب الرئوية (أمراض الدماغ والمعصب وبعض الحواس الخصوصية)

١٤٢ تشنجات الاطفال — خوف الليل — الارق — وجع الرأس — خوريا او رقص مارانتونيوس — خوريا العادة — الفالج — الهديرسفليس — البلاحة البكم والصمم

(أمراض العين والاذن)

١٥٢ الرمد التعقيبي — الرمد البسيط — الجاجل — التهاب الاذن (أمراض العظم والمفصل والجلد والغضاريف)

١٥٦ تشوه الرأس — تشوه الاصابع — اعوجاج القدم — تقوس الظهر — تفرج السرة — تزيف السرة — التايل — تفاظ الحر — الاكزما — الشري — تسليخ الجلد



- ٢٦٨ -

تشقق وخثونة الجلد - القشب - نفاط السنين - الحكة البسيطة - الحرب  
الدمامل - قوبا الحمى - قشرة الرأس - القرع - الحزازة  
( الامراض المفنية )

١٦٨ الحمى التيفويدية - الحمى القرمزية - الحصبة - الحصبة الجرمانية -  
جدري الماء او الدجاج - الجدري الاصلي - جدري التعليم -  
الحمراء - الحنف « الدقيقيرا » - الشهقة - أبو كليب  
( امراض وعادات مختلفة )

١٩٥ الکساحه - الروماتيزم - التهاب الغدد - ضمور الاطفال - التهاب الندي -  
الفواق او الحازوفة - الحمى - الاستسقاء - برودة الاطراف - حصر  
البول • البول في النوم • الالم عند البول • تضيق الفلفة وأنكماسها •  
ازراق الخلفي • التنفس من الفم • مص الاصبع • عض الاظافر •  
العتمة والبلجاجة

( الآفات الجراحية )

٢١١ الجروح القطعية • الجروح الرضية والمزقية • الجروح الوخزية • الجروح  
السمومة • عضة الكلب • دفع الحياة • لسع المقرب والاهوام • الرضوض •  
الخلع والكسر • الحرق والسلق • حرق الشمس • الشلنج • الاجسام  
الغريبة في العين • جروح العين • الاسمام الغريبة في الاذن • بلع  
الاجسام الغريبة • نزيف انفي • الغرق • الاحتناق • الس้ม ومضاداته  
( الملحق ويقسم الى أربعة اقسام )

٢٢٨ القسم الاول في التغذية  
٢٣٨ القسم الثاني في العلاجات الطارحية وفيه انواع الحمامات في المرض وكيفية  
استعمالها • والاصنف واللبخ اخراجها وابتهاهم  
٢٤٨ القسم الثالث في المراثم والمرؤفات  
٢٥٨ القسم الرابع في تحديد حرج الادوية حسب الاعمار وامور اخرى مفيدة  
( ملحق ١٠٩ و ١١٠ )




رس و لایل

کیمیتی که می خواهد بخوبی از آن  
که این دو ایشان را با خود  
که این دو ایشان را با خود  
که این دو ایشان را با خود

(آنچه نداشت)

بجز این دو ایشان را با خود  
که این دو ایشان را با خود  
که این دو ایشان را با خود  
که این دو ایشان را با خود



م.ک.م.ش.ا  
اسکن شد  
تاریخ: ۱۳۸۵ / ۱ / ۲۴

